

عنوان الكتاب : زراعة قصب السكر

المؤلف : عبد الفتاح المتولى نور بك

سنة النشر : ١٩٣٨

رقم العهدة : هـ ٣١

الـ ACC : ٢٩٦٩٨

عدد الصفحات : ٦٤٥

رقم الفيلم : ١٨

A.C. ٢٩٦٩٨

وزارة الزراعة



قسم الزراعة الفنية والاكتثار

٦٢٢, ٦

الرسالة رقم ٢٥

عن زراعة قصب السكر



بفلم

حضرة صاحب العزة عبد الفتاح المتولى نوزاد بك

( مدير قسم الزراعة الفنية والاكتثار سابقا وسكرتير عام وزارة الزراعة حالا )

٥/٥

القاهرة

طبعت بالطابع الأميرية ببولاق

١٩٣٨



## قصب السكر

### مقدمة

قصب السكر من النباتات الآسيوية وهو ينمو بریا في بعض الجزر الموجودة بجنوب المحيط الهادى ويرجح أن زراعته كمحصول كانت أولا في شمال الهند .

وقد انتقل قصب السكر من الهند إلى بلاد العرب في أوائل التاريخ المسيحى ومن هناك انتقل إلى بلاد الحبشة ودهر وعندما فتحت العرب مصر عام ٦٤١ ميلادية أدخلت إليها قصب السكر إلا أنه لم يعتبر في زمنهم محصولا رئيسيا من محاصيل القطن وظل كذلك حتى حكم المغفور له محمد على باشا الكبير ثم انتعشت زراعته في عهد المغفور له الخديوى اسماعيل باشا حيث استجضر أنواعا جديدة من جزر الهند الشرقية وأمر بزراعتها في مساحات واسعة بالوجه القبلى بعد أن أقام المصانع اللازمة لعصر القصب وصناعة السكر واستمر الحال كذلك إلى عام ١٨٦٨ حيث باعت الحكومة مصانعها إلى شركة السكر الحالية فأصبحت بذلك صناعة السكر شبه احتكار لهذه الشركة فلم يكن في استطاعة من يزرع القصب بيع محصوله لغيرها فنتج من ذلك أن هبطت أسعار القصب نظرا إلى الأسباب الآتية :

١ — انخفاض سعر السكر الأجنبي ومزاحمته للسكر المصرى .

٢ — رغبة الشركة في زيادة الأرباح لمصلحة المساهمين .

وإزاء هذين العاملين اضطرت الشركة إلى عرض أثمان قليلة للقصب لخدا ذلك بالزراع إلى الشكوى وأقلع الكثير منهم عن زراعة القصب فساءت الحال . ولأهمية زراعة القصب بالوجه القبلى من الوجهة الزراعية والاقتصادية فكرت الحكومة إزاء الحالة المتقدمة في عقد اتفاق خاص مع الشركة يلزمها بشراء القصب من الزراع بالسعر الذى تحدده الحكومة بشروط خاصة على أن تتمتع الشركة بحماية الحكومة لها من مزاحمة السكر الأجنبي وقد تم ذلك بالفعل . ولا غرو أن زراع القصب والشركة استفادا معا من هذا النظام ويرجى التدرج به إلى ما يجعد عنه ما قد يلعب إليه من المآخذ .

وقد أصبح القصب الآن من أهم المحاصيل المصرية بالقطن المصرى وهو المحصول الرئيسى بمناطق مصر العليا في كوم امبو والمطاعنة وإرمنت والضبعة كما أنه يعتبر محصولا مربحا في نجع حمادى وفى بعض مناطق مصر الوسطى .

وبما أن القصب يكاد يكون أكثر المحاصيل تأثرا بالخدمة الزراعية لدرجة أن محصوله ينقص كمية ونوعا لأى خطأ يقع في العمليات الزراعية خصوصا عمليات العزق والرى ، والتسميد ، لذلك تجب العناية به عناية ناجمة وستة اول في هذه الرسالة زراعته بشيء من التفصيل الكافى .

٢ - تؤخذ التقاوى من حقول لا يكون القصب راقدًا فيها لأن رقود القصب يسبب تلف وضعف البراعم فتنتج قصبا ضعيفا إذا زدرت .

٣ - يحسن أن تكون التقاوى من القصب الغرس لأن نباتاته أقوى من القصب الخلفة .

٤ - تستبعد العيدان النافقة وغير السليمة في أثناء الزراعة ويفضل حزم التقاوى المطلوبة من قصب المالك لأن ذلك سهلا للتقاوى علاوة على سهولة نقلها مما يساعد على الزراعة المبكرة وقلة نفقات النقل .

أما عن تجهيز التقاوى فبعد نقلها إلى الحقل المطلوب زراعته يراعى الآتى :

١ - تقشير القصب وتظيفته تماما لأن وجود أوراق على الأضرار يسبب تعفنًا أو بقاء نموها .

٢ - تقطيع العيدان إلى عقل تحتوى كل منها على ٣ "فكوك" كاملة الأضرار وطولها من ٤٠ إلى ٥٠ سنتيمترا .

٣ - إزالة الأجزاء الخضراء بالعيدان لأن نمو أضرارها غير تام .

#### مقدار التقاوى

يلزم لزراعة الفسدان الواحد من ١٠٠ إلى ١١٠ قاطير وذلك تبعاً لتخطيط الأرض وطريقة الزراعة وجودة التقاوى .

#### مواعيد الزراعة

إن التيسير بزراعة القصب مهم جدا لكي يستكمل نموه ونضجه تماما قبل كسره وتوريده إلى معاصر القصب التي تحدد مواعيد توريد القصب ولا يخفى ما فى ذلك من الربح ويمكن زراعته فى المناطق العليا من ٢٥ يناير إلى آخر فبراير وأما فى مصر الوسطى حتى تجمع حادى فتكون زراعته من أوائل فبراير إلى منتصف مارس وما يزرع بعد ذلك يعتبر متأخرا .

#### أنواع القصب

قد كانت الأنواع التي تزرع بمصر لغاية سنة ١٩٠٢ هى أنواع الجاميك الأحمر والمخطط والأبيض وكانت تعرف بروى أحمر ومخطط وأبيض كذلك النوع الأبيض المعروف بالبلىدى وكانت أنواع الجاميك الثلاثة تستعمل لصناعة السكر أو لعمل العسل الأسود وأما النوع البلىدى فكان يستعمل للص .

#### الدورة الزراعية

تتبع فى زراعة القصب دورة رباعية أو سداسية : ففي الأول يزرع القصب عامين متتاليين "غرس وخلفة" وبعد قطع الخلفة الأولى تترك الأرض بورا حتى موعد المحصول النيل ثم تزرع شتويا وبعد الشتوى محصولا بقوليا ثم قصباً بعد ذلك .

أما فى الدورة السداسية التي تتبع بعض الأحيان فيزرع القصب ثلاثة أعوام متوالية "غرس . خلفة أولى . خلفة ثانية" ثم تترك الأرض بورا مدة الزراعة التالية ، وبعد ذلك تزرع بالشتوى ثم النيل .

ولا تحسن زراعة القصب ثلاثة أعوام متوالية إلا فى الأراضي الشديدة الحصب . وتفضل زراعة القصب بعد بور أو محصول مثل القول والعدس والبرسيم والجلبان لأنها تزيد فى خصب الأرض .

#### الأرض الصالحة للزراعة

القصب من المحاصيل المجهدة للأرض ولذا تتطلب زراعته أرضا شديدة الخصب غنية بعناصر الغذاء النباتى وعلى العموم فإن زراعته توجد بالأراضي الطينية الخفيفة الجيدة الخواص الطبيعية الخالية من الأملاح ولا تحسن زراعته بالأراضي الضعيفة حيث يقل المحصول فلا يأتى برح .

#### تجهيز الأرض للزراعة

تحرث لأرض حر عذيقا " نحو ٣٠ سنتيمترا " مرتين أو ثلاث مرات وتترك مدة كافية بين كل حرثة وأخرى لكي تتعرض للهواء والعوامل الطبيعية الأخرى وترحف الأرض عقب كل حرثة بالحراطة اليدوية أو تستعمل المهراسة عقب الحرث لتنعيم التربة فى حالة تماسكها حتى تصبح تربة ريمعة صالحة للزراعة ثم يحجر تخطيط الأرض بمعدل تسعة أو عشرة خطوط فى الفصتين إذ ثبت من التجارب أن تلك أفضل مسافة لتخطيط ثم تقسم الأرض بعد التخطيط إلى أقسام متساوية على وجه التقريب بواسطة مراو متوالية يبعد بعضها عن بعض حوالى ست قصبات يتوسطها متون تقوى فيما بعد لتنظيم الروى وتسهيله .

#### الانتخاب وتجهيز التقاوى

يجب انتقاء التقاوى الجيدة مع مراعاة ما يأتى :

١ - تؤخذ التقاوى من حقول سليمة خالية من الآفات والحشرات وتكون العيدان ذات "فكوك" وافية طويلة وليس بينها عقل قصيرة .



ويختلف محصول أنواع الجامبكا من ٦٠٠ إلى ٨٠٠ قطار عل الأكثر للقدان وهذا محصول قليل بطبيعة الحال ، وأما نسبة السكر فيها فكانت تختلف من ١٤٪ إلى ١٦٪. وهناك وصفا مختصرا لكل منها .

الروى الأبيض أصله من جامبكا ويعرف باسم الجامبكا الأبيض ولونه أبيض يضرب إلى الصفرة قليلا .

الروى الأحمر ولون ساقه بنفسجي محمر وهو يحتوى على نسبة كبيرة من السكر يتحمل البرد والصقيع ويعرف بالجامبكا الأحمر .

الروى الأحمر المخطط ويعرف بلونه الأحمر المخطط بخطوط مصفرة أو مخضرة نوعا وهو يقل عن الأبيض في مكانه حتى يتضج ويعرف باسم الجامبكا المخطط .

وفي عام ١٩٠٢ استحصل جناب هنرى نوس بك مدير عام شركة السكر صنف ١٠٥ وأدخله في القطر المصرى فنجحت زراعته نجاحا كبيرا وبذلك قدم أجل خدمة للبلاد لأن محصول هذا الصنف يتراوح حول الألف قطار للقدان ولو أن النسبة المئوية للسكر به أقل من الأصناف الأخرى إذ يتراوح بين ١٢٪ و ١٤٪ .

وعا أن هذا النوع أكثر الأنواع إنتاجا في مصر لذلك سأذكر وصفا مختصرا له مع بعض مميزاتة :

العود متوسط السك طوليل فقد يصل طوله إلى أربعة أمتار ، لونه أبيض مخضر ، وهو أكثر الأصناف خلفا . والأوراق طويلة متوسطة العرض مسحوقة ، وعرضها أقل من عرض أوراق الأصناف الأخرى وتجه في نحوها إلى أعلى مكونة زاوية حادة مع الساق وعروقها الوسطية عليها بقع حمراء .

ويمتاز صنف ١٠٥ بما يأتي :

١ - أنه أوفى بغراض المعاصر من الأصناف الأخرى التي تزرع بمصر على الرغم من أنه أقل منها في نسبة السكر .

٢ - نباتاته سريعة النمو بعد أن يجتاز طورها الأول وتستمر كذلك حتى عام النمو .

٣ - هو أكثر مقاومة لمرض "الموزايك" من الأصناف الأخرى التي تزرع بمصر .

وهناك أصناف أخرى (مثل ٢٨٧٨) كان محتملا أن تحمل محل ١٠٥ ولكن التجارب التي عملت عليها بكون أمير ونجع حادى لا تبرر الآن أفضليتها على ١٠٥ للأسباب الآتية :

١ - محصولها لا يزيد عن ١٠٥ بل في الغالب ينقص عنه قليلا .

٢ - نسبة السكر تزيد عما في صنف ١٠٥ من نصف إلى واحد في المائة وهي زيادة طفيفة لا تبرر أحلاله محل صنف ١٠٥ .

٣ - صنف ٢٨٧٨ يلى النمو الذيقى نصيرا إلى آخريوليه ثم نمو بسرعة في أغسطس وهذه الخاصية تجعله أقل ملائمة للجو .

٤ - صنف ٩٧٩ لم يصلح لعدم إنتاجه محصولا جيدا .

٥ - صنف ١٠٣٠ وهو المعروف بمجد الجليل ويزرع في مساحات محدودة لغرض المص وذلك نظرا إلى ارتفاع نسبة السكر فيه فقد تبلغ لغاية ١٨٪ .

٦ - أصناف (P ٠٠٠ J. 63 - P ٠٠٠ J. 63 M - C ٠٠٠ 182) تقرب أكثر من سواها من صنف ١٠٥ في ناتج السكر .

### طريقة الزراعة

تختلف طرق الزراعة باختلاف المناطق كما تختلف في منطقة واحدة ويمكن حصر طرق الزراعة في الآتى :

١ - الطريقة الجافة :

تفتح الخبوط جيدا بحيث تصل إلى نهاية الخدمة وتوضع العقل مزدوجة أى في صفين متباعين ثم تغطى العقل بالتراب بحيث يعلوها بمقدار كاف يجب أن يكون حوالى ٨ - ١٠ سنتيمترات مع بذل عناية كبيرة كي لا تترك عقل مكشوفة وأن تكون العيون في الجوانب (أى لا تكون في الجهة العليا ولا السفلى حتى لا تتلف) وبعد الانتهاء من ذلك تروى الأرض ربا غزيرا " كافيا " ويجب ألا يتأخر الرى عقب الزراعة عن ٣٤ ساعة لكيلا تجف العقل وتتلف العيون .

٢ - الطريقة المبتلة :

تروى الأرض ربا غزيرا ثم توضع عقل القصب وتداس بالأرجل في ميل المساطب وتبع هذه الطريقة في المساحات الصغيرة ولكن هذه الطريقة ليست طريقة آمنة لجودة الإنبات إذ يحتمل عدم غرز عقل القصب تماما فتبقى العيون معرضة للجفاف والتلف .



## الترقيع

يجب سرعة ترقيع قصب الخلفة بمجرد ظهور الإنبات حيث تروى الأماكن الخالية من النباتات وتماد زراعتها ، ويجب أن يكون قصب الترقيع كقصب التفاوى منتجا من حقول سليمة خالية من الآفات والحشرات وذلك إن كانت الحاجة ماسة للترقيع مع العلم بأن الترقيع غير مستحب في الأحوال العادية .

## الخدمة بعد الزراعة

### العرق :

القصب من المحاصيل التي تحتاج إلى عرق جيد معنى به في مواعيده المناسبة ففي الأيام الأولى يعرق القصب بعد جفاف الأرض الجفاف الكافي - أي بعد رية الزرعة "البوغة" - عرقا خفيفا "خريشة" لتكثير الشقوق وتغطية ما عسى أن يكون غاريا من العقل . وعملية الخريشة هامة جدا لتقليل البحر وحفظ رطوبة الأرض لأطول مدة ممكنة . وبعد ذلك يعرق القصب ثلاث عراقات الأولى بعد الري الثانية بخوانى أسبوع تبعا لظروف الجوبة وفي هذه العرقة يحول جزء من تراب كل مسطحة نحو نباتات القصب وتجري العرقة الثانية بعد الري الثالثة بوقت مناسب وفيها تحوط المساطب تحوطا كافيا حول نباتات القصب حتى تصبح في وسط المساطب بعد هذه العرقة وبذلك تتمكن جذور النباتات من الأرض ولا ترفد في المستقبل إذا ما هبت رياح وهذه العرقة في القصب الخلفة تعمل بواسطة الحراقات أو المحاريث البلدية لصعوبة العرق بالعمل بسبب نمو القصب نموا غزيرا في هذا الوقت . ومع كل فيجب استئصال الحشيش الذي يوجد بعد الحرت بواسطة العمال .

## حرت أرض الخلفة بعد قطع القصب

يجب عدم تأخير حرت أرض الخلفة إلى ما بعد عرقها مرتين لأن ذلك ضار بالمحصول ويجب أن يبدأ الحرت بعد رية الأولى بخوانى عشرة أيام بحسب حالة الأرض ثم لا يبدأ بالعرق إلا بعد الري الثانية كما سبق أن أوضحنا ثم يعرق الخلفة بعد ذلك ثلاث مرات ولا بأس من الحرت مرة أخرى إذ دعت الضرورة .

## التربيط

واضح أن الري الكافي يجب عمل أربطة قوية على كل خمسة خطوط أو أكثر بحسب استواء الأرض ويجب أن تكون تلك الأربطة قوية ومرنعة عن الخطوط لضمان حجز مياه الري الكافية وهذه العملية من أهم العمليات الزراعية في خدمة القصب .

## الري

يروى القصب عقب زراعته مباشرة وتسمى هذه الري "رية البوغة" ويجب ألا تتأخر عن ٢٤ ساعة بعد وضع العقل لسبب تجنب العفل ويضعف الإنبات ثم تعطى رية الحباة بعد حوالى ٢٥ يوما من "رية البوغة" ويسمر الري كل أسبوعين مرة إلى أن يأتى وقت الصيف فتقل فترات الري إلى عشرة أيام وعند حلول الفيضان يراد إشباع المحصول بمياه النيل الجراء وذلك في شهرى أغسطس وسبتمبر وعلى العموم يعطى القصب حوالى ١٦ رية بمصر الوسطى ومن ٢٠ إلى ٢٤ رية بمصر العليا ماعدا كوم أمبو فيعطى فيها من ٢٨ إلى ٣٠ رية وذلك لاختلاف حرارة الجوب بالمناطق المذكورة .

ومناسبة ري القصب يجب ملاحظة أن عدم انتظام الري ينتج عيانا قصيرة جافة الأطراف غير متجانسة العقل حيث تقصر هذه العقل في فترات العطش وتناظم وتطول ثانية عند انتظام الري . ويجب ألا يروى القصب قبل كمره بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما كي يساعد ذلك في نضج القصب وارتفاع نسبة السكر ونسبة النقاوة ، وفي ذلك ربح كبير للزارع لأنه في هذه الحالة تقل أو تنعدم نسبة الاستقطاع الكمواى بخلاف ما يعتقد بعض الزارعين من أن الري قبل الكمر بمدة قليلة يزيد في المحصول دون مراعاة أن هذه الزيادة المزعومة لا تنوزل الاستقطاع المسدود نظير نقص النقاوة ونسبة السكر .

وقد اتضح جليا أن غزارة الري المتوالى في الفترة الأخيرة من نضج القصب تقلل من ناتج السكر كثيرا كما تقلل من نقاوته .

## التسميد

النصب محصول منهك للأرض يحتاج لمقدار كبير من العناصر الغذائية ورغم فائدة الأسمدة البلدية سواء للقصب أو المحاصيل الأخرى فإنها لا تستعمل كثيرا في تسميد النصب والدوب في ذات أن خدمة القصب تجرى بالمحاريث البخارية وهذا من شأنه أن ينال عدد المواشى بمناطق القصب قبل الهاد البلدى .

ويحسن عند توافر الأسمدة البلدية وضمها في أثناء الخدمة أى قبل الحرة الأخيرة وقبل التخطيط .

وللسبب المتقدم تستعمل الأسمدة الآزوتية في تسميد القصب ويعتقد بعض الزارع خطأ أن زيادة التسميد الآزوتى يزيد في كمية المحصول مع عدم مراعاة الحد الأدنى للتسميد (ومع أخذ الأفضى للتسميد هو أكبر مقدار من الأسمدة يحسن استعماله بحيث إذا زاد عنه نقص المحصول كمية ونوعا)

## قطع المحصول وتصديره

يمكنك القصب في الأرض حوالى العام تقريبا ويبدأ موعد الكسر والتوريد إلى المعاصر من أواخر ديسمبر ويستمر لغاية منتصف أبريل أو آخره .

وتجرى هذه العملية بواسطة العمال الذين يستعملون فؤوسا صغيرة حادة وعادة تعطى محبة فقطع المحصول بالمقاولة أو بواسطة عمال على حساب الزارع وتكون الأجور زهيدة عند كسر القصب الخلفة لتوافر الأيدي العاملة حتى إنه في بعض الأحيان يعطى العمال "كالوج أو زعزوع القصب" كاجر لهم يساعدهم كثيرا في تنفيذ مواشيهم . وأما في كسر القصب البكر فنقل الأيدي العاملة بمناسبة البدء في حصاد المحاصيل الشتوية وتزداد الأجور .

ويجب ملاحظة الآتي عند قطع المحصول :

أولا : أن يكون الكسر في جهة واحدة لسهولة النقل والمراقبة .

ثانيا : أن يكون كسر القصب بمساواة سطح الأرض ( أى بين الترابين ) مع عدم ترك جزء من سيقانه فوق سطح الأرض لأن في ذلك ضياع جزء من المحصول وضرا للخلفة الجديدة .

ثالثا : ألا يترك عند تقشير القصب وقطع "الكالوج أو الزعزوع" جزء غير واضح بطرف العود لأن ذلك يقلل نسبة السكر كما أن المعمل يستعده من الوزن .

رابعا : ألا يقطع جزء كبير من العود بدون ضرورة عند أخذ "زعزوع" القصب حتى لا ينقل المحصول الناتج ويلاحظ ذلك بوجه خاص عند كسر القصب بدون أجور مقابل استيلاء العمال على "الزعزوع" .

خامسا : تنظيف القصب من أجزاء التربة العالقة به وكذلك الأوراق الخلفة والخضراء والجذريات لكيلا تزداد نسبة استقطاع الوساخة .

سادسا : عند تصدير القصب بعربات السكة الحديدية يعاد تنظيفه "بالوحسة" قبل تعبئته بالعربات ويوضع في العربات لكيلا تنقل حولة العربات عن المخصص لها .

سابعا : توضع أجزاء عيدان القصب المتخافة والعقل المكسورة أو ما يسمونه "بالبول" في عربة خاصة تخطط المعصرة عنها ليؤخذ استقطاع منفصل لها لأن في تعبئة مثل هذا القصب ضمن المحصول التنظيف يزيد في نسبة الوساخة به .

وقد أثبتت التجارب أنه يجب ألا يزيد مقدار الأزوت في السباد المستعمل للتسميد فدان القصب كحد أقصى عن ٨٠ وحدة آزوتية وهو المقدار الموجود في ثلاثة أجولة من سماد تروسلفات النواشدر أو حوالى خمسة أجولة من تترات الجير . وينقص هذا المقدار إلى ٤٥ وحدة آزوتية تبعا لمختلف الأراضي من وجهة القصب .

ويستحسن أن يعطى مقدار السباد على دفعتين أو ثلاث دفعات على أن تكون الدفعة الثالثة أقل من الدفعتين السابقتين أى أن الدفعة الثالثة تكون تقريبا للأمكنة الضعيفة أو التي لم ينظم وضع السباد بها في الدفعتين السابقتين .

ويعطى ثلث مقدار السباد المقرر للقصب الفرس في أول دفعة ونصف المقدار في الدفعة الثانية والسادس الباقي في الدفعة الثالثة وذلك لعدم حاجة النبات إلى مقدار كبير في مبدأ حياته لعدم تكامل نمو جذوره . وأما الخلفة فتعطى نصف السباد المقرر لها في أول دفعة والثلث في الدفعة الثانية والسادس في الدفعة الثالثة وذلك لأن الخلفة تكون في حاجة كبيرة للتغذية في بادئ الأمر .

ويجب زيادة السباد المقرر للخلفة الأولى أو الثانية عن السباد المقرر للقصب الفرس بحوالى ٣٠٪ أو ٥٠٪ تبعا لدرجة خصب الأرض .

ويجب ملاحظة عدم التأخير في وضع سماد الدفعة الثالثة عن نصف شهر وإليه لأن التسميد المتأخر يزيد نمو الخضري ويؤخر نضج القصب فيقل ناتج السكر ونقاوته .

ويمكن الصبح بالتتابع برنامج التسميد لآتي على أساس مقادير الأزوت السابق تقديرها وهى من ٤٥ إلى ٨٠ وحدة آزوتية .

الحصول	الأرض	مقدار الأزوت	الدفعة الأولى		الدفعة الثانية		الدفعة الثالثة	
			المقدار	الموعد	المقدار	الموعد	المقدار	الموعد
عرس	خصبة	٤٥	١٥	قبل الأزوت	٢٠	قبل الأزوت	٧٥	—
خلفة أول وثانية	»	٦٠	٣٠	»	٢٠	»	١٠	—
عرس	متوسطة	٦٠	٢٠	»	٣٠	»	١٠	قبل الأزوت السابعة
خلفة أول وثانية	»	٨٠	٤٠	»	٢٠	»	١٣	»

## تقدير الاستقطاعات

وفي مدة العصر تقوم الحكومة بإيفاد مندوبين من قبل وزارة المالية لمراقبة عملية الاستقطاع والبحث في شكوى الزارع الناشئة عنها ويمكن فيما يلي إيضاح عملية الاستقطاع .

تؤخذ عينة أو أكثر تمثل القصب المورد من الزارع من وسط إحدى العرابت وجوانبها أو تختار بالارتفاع عربة كاملة من كل ٣٠ أو ٥٠ أو ١٠٠ عربة . وهذه العينة تؤخذ إلى غرفة أو عمل خاص تسمى غرفة المعدلات وتوزن بحالتها وزنا دقيقا ويسجل وزنها الصافي ثم تسلم إلى أولاد يقومون بتنظيفها تحت المراقبة نظيفا تاما من القشر الناشف والأخضر والجزء الميت إذا كان قد ترك بقعة العود في أثناء عملية التقشير بالخجل وكذلك الكعوب الخضراء الغير التامة النضج إن تركت وتفرز منها العيدان الميتة أو التي بها ضرر وتعرف باسم ( البوال ) ثم تفصل العيدان السليمة النظيفة الناتجة بعد كل هذا وتنشف تماما ويماد وزنها والفرق بين الوزن الأول والثاني هو مقدار الرطوبة في العينة ثم تعمل نسبة الرطوبة وتستنقطع هذه النسبة من جملة المواد تحت الاسم الماخوذة منه ويعبر عن هذا الاستقطاع ( باستقطاع الرطوبة ) .

عاشرا : يجب أن يذلل الزارع أقصى جهده لتسليم محصوله في خلال ٢٤ ساعة من وقت قطعة وألا يؤخر التسليم أكثر من ٤٨ ساعة مطلقا لأن التأخير يسبب جفاف القصب وضرره وفي ذلك خسارة كبيرة على الزارع . هذا علاوة على ما تفقده معامل السكر في حالة القصب الذي يتأخر توريده بسبب تخمر السكر كما يعوق تبلور العصير .

ہیکلو حرام

١٠٠٠	.....	بعد الكسر
٩٧٠	.....	بعد يوم واحد
٩٥٠	.....	يومين
٩٢٠	.....	ثلاثة أيام
٩٠٠	.....	أربعة
٨٨٠	.....	خمسة
٨٤٠	.....	سنة
٨٢٠	.....	سبعة
٨٠٠	.....	ثمانية

الاستقطاع الكيميائي

ولا يخفى أن هذا القص الكبير يضيع ما ينتظره الزارع من الأرباح بل ربما يضيع عليه جزءا كبيرا من نفقات الإنتاج .

## مصروفات وإيرادات فدان قصب

يحتاج القصب إلى مصاريف كثيرة وعلى الرغم من ذلك فهو محصول مربح إذا اعتنى بخدمته كما سبق بيانه واهتم بقطف المحصول وتوريده إلى المصارى بعناية وسرعة وتختلف زيادة النفقات أو قلتها تبعا لمختلف المناطق والظروف وفيما يلي نبين مصروفات وإيرادات فدان قصب بمزرعة وزارة الزراعة بالمطاعة .

المصاريف	القصب الغرس	المصاريف	القصب الخلفة
طسب	طسب	طسب	طسب
٥٠٠	حرت دفعتين وتخطيط وترحيف	١٥٠	حرت دفعة واحدة
٢٠	تقطيع مراو	١٠٠	لج خطوط
١٠٠	تحويض	١٠٠	تحويض وعمل مراو
٣٥٠	قطع ونقل تقاو	٧٢٥	تم سجاد وتروسلقات النواشدر ( ثلاثة أجولة ونصف جوال)
٣٠٠	ثمن تقاوى (١٠٠ قنطار سعر ٣٣ ملجا)	٤٠٠	كسر قصب
٤٠٠	زراعة عقل	٥٠٠	نقل قصب بالجمال
٨٠٠	أجرة عمال الري (٣٤ رية ١٦ عاملا ٢٥ × ٢٥)	٤٠٠	تحميل القصب بالعربات
٥٠٠	عزق ثلاث مرات	٦٠٠	مصاريف إدارية
١٠٠	تسميد ونقل سجاد	١٥٠	عزق
٣٧٥	تم سجاد وتروسلقات (حوالان نصف جوال)	٨٠٠	أجرة عمال الري
٥٠٠	كسر قصب	١٧	إسار الأرض وثمن مياه
٥٠٠	نقل قصب بالجمال		
٤٠٠	تحميل عربات السكة الحديدية	٢٤٩٢٥	جملة المصروفات
٥٠٠	مصاريف إدارية "خفر وخلافه"	٢٨٠٥٠	جملة الإيراد (٨٠٠ قنطار سعر ٣٣ ملجا)
١٧	إسار الأرض وثمن مياه		
٢٨٣٤٥	جملة المصروفات	٣١٢٥	صافي الأرباح في القصب الخلفة
٢٩٧٠٠	جملة الإيراد (٩٠٠ قنطار سعر ٣٣ ملجا)		
١٣٥٥	صافي الأرباح في القصب الغرس		

١. ربح الدامين ١٣٥٥ = ٣١٢٥ - ٤ جنيهات ٤٨٠ ملجا

فيكون متوسط الربح (عن الدامين) جنيهان و ٢٤٠ ملجا في العام .

## السكر الناتج

دلت التجارب الكيميائية الخاصة بنسبة السكر وقاونه بالقصب على أن ٨٠٪ من السكر الموجود بالمحصول هو الناتج والصالح نهائيا بعد عملية العصر .

ولاستخراج مقدار السكر بالمحصول يمكن ضرب هذه النسبة (٨٠٪) في النسبة المئوية للسكر بالمحصول في مقدار المحصول فيكون الناتج هو مقدار السكر الناتج من محصول القصب أي إذا كان محصول الفدان ١٠٠٠ قنطار ونسبة السكر ١٣٪ فيكون السكر الناتج ١٣٠٠ × ٨٠٪ = ١٠٤ قنطير .

## حشرات القصب

١ - ثاقبة الساق الكبيرة وهي المسماة علميا بـ *Sesamia cretica* وهي تسبب ثقوبا وتجاويف في عيدان القصب فتقلل المحصول كما تقلل ناتج السكر ودرجة قساوته وأحيانا تسبب موت الطرف النامي للقصب ولا يوجد علاج نافع تماما لهذه الحشرة وإنما يتبع الآتي :

( أولا ) قطع العيدان المصابة وحرقها بالنار .

( ثانيا ) زراعة ذرة شامية أو رفيعة في حقول القصب أي زرع خط في كل عشرين خطا من القصب وعند إصابتها تقلع وتدمر وبذلك تقل إصابة القصب .

( ثالثا ) إبادة الحشائش من القصب لأنها مأوى لجميع الحشرات .

٢ - ثاقبة الساق الصغيرة وهي المسماة علميا بـ *Chilo simplex* وهي أشد فتكا بالقصب البالغ ولا تصيب القصب الصغير إلا نادرا وتحدث ثقوبا في عيدان القصب والكوب في نصف دائرة ولذلك يسمىها العامة ( بالدورة ) .

وتقاوم هذه الآفة كدودة الساق الكبيرة مع إعدام أطراف العيدان المصابة بما فيها من اليرقات بمجرد ظهورها .

٣ - بق القصب الدقيق والمسماة علميا بـ *Pseudococcus sacchari* وكان أول ظهورها عام ١٩١٢ وهي تمتص العصارة من العود وتترك فوقه مادة عسكية لزجة يغطيها فطر العفن الأسود . هذا وإصابة البق الدقيق تقلل المحصول وتضعف من قوة التبلور في السكر عند عصره كما تسبب صعوبة تنظيف القصب عند تصديره .

وليس هناك علاج للبق خلاف إعدام العيدان المصابة به .

## وزارة الزراعة

### قسم تربية النباتات

# النشرة الفنية

رقم ١٦١



تربية قصب السكر في مصر

تقرير عن تقدمها



المستتر آرثر . ه . روزنفلد

خبر قصب السكر وزارة الزراعة

ترجمت عن الإنجليزية بقسم الارشاد لزرعي

طبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة ، سنة ١٩٣٦

تباع مطبوعات الحكومة بصالة البيع بوزارة المالية . أما المكاتبات  
الخامسة بهذه المطبوعات فترسل رأساً الى قسم النشر بالمطبعة الأميرية

الثمن ٣٠ ملياً

١٤

وعلاوة على الحشرات السابق ذكرها هناك أعداء أخرى للقصب كالخشبش النامي بالحقول الذي  
يسبب النباتات معظم الغذاء فتجب إزالته أولاً بأول بالفرق الجيد .

## الأمراض

تراجع النشرة الفنية رقم ١٤٦

### مرض الموزاييك أو التبقع أو الخطوط الصفراء

يصاب القصب في كافة البلاد التي يزرع فيها بمرض ضار معد قد يسبب خسائر كبيرة وقلة  
في المحصول .

ونجم هذا المرض عن فعل كائنات من الفيروس وهي أحياء دقيقة جداً لا ترى حتى بأعظم  
الميكروسكوبات .

وأعراضه تظهر بخطوط صفراء فاقعة يغلغلها بقع تميل إلى البياض وأكثر ما تكون بالقرب من  
قواعد الأوراق الوسطى .

ويقل هذا المرض من نبات إلى آخر بواسطة حشرة المن .

ويقاوم باستئصال النباتات المصابة وباستعمال نقاو جديدة سليمة .

### الفيروس

من أهم أعداء القصب إذ تنتشر أحياناً في مزروعة وتسبب تلفاً كبيراً وليس هناك وسيلة للعلاج  
سوى المصايد أو وضع الطعم السام في مجرى الفيروس .

# تربية قصب السكر في مصر

تقرير عن تقدمها

عبد

المستر آرثر "هـ" رزفند

مدير مكتب الحكومة المصرية

إن غاية ما ترمى إليه جميع الأبحاث أصراً ، زيادة طاقة المجموع أو الفرد على الإنتاج والقيام بما يستوجب تنظيم العمل، حل الوجه الأكل — لامتداد المجموع بئىء يعود عليه بالمنفعة — من قول كليمانس F.O. Clements

## الوضع النباتى لقصب السكر

قصب السكر حشيش معمر طويل ينتمى إلى العائلة المعروفة باسم النجيلية "Graminaceae" (جراميناسيا) وإلى الفصيلة "Andropogoneae" (أندروپوجونيا) وقد أطلق عليها لينوس Linnaeus زعيم مصطلحات العلوم البيولوجية في سنة ١٧٥٣ (١) 4 باسمها الجنس والنوعى (سكرام أوفديتارم) Saccharum Officinarium فى الطبعة الأولى من كتابه (Species plantarum) آتى لينوس بنوعين تحت الجنس Saccharum أوفديتارم N. Officinarium وهو الذى يشمل الآن كل ما يعرف بالقصب الممتاز (Noble Cane) وثانيها N. Spicatum الذى استبعد منذ ذلك الوقت من الجنس ، وقد أكثر البعث الذين أتوا بعد ذلك عدد الأنواع بسرعة فذكر "ويلدناو" "Wild-now" (٢) أحد عشر نوعاً ( فى الطبعة الثالثة من كتاب Species Plantarum فى سنة ١٧٩٧ ، وذكر كونه Kunth (٣) فى كتاب "Enumeratio Plantarum" فى سنة ١٨٨٣ اثنين وعشرين نوعاً وسلالات أخرى عديدة . وأحصى روكسبورج "Ruxburgh" (٤) فى كتاب (Flora of India) فى سنة ١٨٣٢ أحد عشر نوعاً فى الهند وحدها وهذه الأنواع كلها حديثة فيما عدا ثلاثة منها .

\* الأرقام الموضوعة بين أقواس هي أرقام كتف المصادر التى فى نهاية المقال .

وقد اعتبر يعقوب دى كورديموى "Jacob de Cordemoy" (٥) أن جميع الأصناف المزروعة تنتمي إلى ثلاثة أنواع وهي S. Officinatum بما فيه القصب المتنازل Noble (٦) أو قصب المطقة الحارة S. Violaceum وهو القصب ذو الأوراق البنفسجية الذى ينمو أكثره في هاواى ونيجي وأستراليا وقصب "S. Sincense" أو قصب روكسبورج الصينى "Roxburgh's Chinese". ويميز بنام "Bentham" وهو كوك "Hooker" (٦) في سنة ١٨٣٣ اثني عشر نوعا في العالم بأسمه كما ميزها كل "Haeckel" اثني عشر نوعا في نتيجته للعثالث في كتاب "أنجلر" "Engler" وبرايتل "Prantl" المسمى "العائلات النباتية" "Pflanzen Familien" (٧) وهو المرجع العام للعثالث في سنة ١٨٨٧ ولكنه وضع اثنين منها فقط في قسمه الذى سماه "Eusaccharum" أو قصب السكر الحقيقى وهما "S. Officinatum L." "S. Spontaneum L." النوع البرى الذى ينمو في الهند وجزر المحيط الهندى. واختصر هو كوك "Hooker" (٨) الأنواع في ذلك الاقليم إلى خمسة كما ورد في كتابه المسمى "Flora of British India" الذى طبع في سنة ١٨٩٧.

وقد توسع المؤسسون الحديثون في اتباع تقسيم (هاكل) مع أنه ثبت كما أوضح إيرل "Earle" (٩) أنه من الصعب محاولة تقسيم جميع أصناف القصب إلى مجموعتين رئيسيتين. بذلت الجهود للوصول إلى تقسيم أصوب. وقد ظهر من بحث باربر (١٠) وهو أحد نمرة البارزين الملمين بموضوع القصب الهندى أن صنف القصب البرى المسمى S. Spontaneum الذى ينبت في الهند متغير لدرجة كبيرة. وساعدت فيما بعد دراسات مانير "Banner" (١١) ٤ برير "Bremer" (١٢ - ١٣) جزويت "Jesweit" (١٤ - ١٥) عن نباتات تغير صفات القصب البرى في الأقاليم المختلفة كما هو الحال في بورنيو الهندية وجاوه والفلبين.

وأشهر حجة معترف بها اليوم في تقسيم جنس "Saccharum" هو الدكتور "Jacob Jesweit" بجامعة واجنتجن "Wageningen" هولاندا وهو مستنبط قصب جاوه العجيب "Java's Wonder" P.O.J 2878. وقد بدأ يقسم من جديد مجموعة القصب في محطة قصب السكر بياسوريان "Paseroean" بجاوه في سنة ١٩١٢ ونشر

كثيرا من المعلومات النفيسة في تقسيم ووصف المجموعة الأصلية ذات المسجون صفحا إلى وجدها في جاوه وعدد كبير من الأصناف التى أضافها إلى المجموعة في خلال الخمس عشرة سنة التالية (١٦ - ١٧) وفي سنة ١٩٢٥ نشر جزويت "Jesweit" الترتيب الجديد الذى وضعه لمجلس "Saccharum" (١٨) وقد استبعد منه الأجناس الثانوية "Leptosaccharum" "Eriochrysis" "Sclerostachya" إذ اعتبر أنها وضعت هناك خطأ بواسطة "Haeckel" كذلك استبعد من الجنس الثانوى "Eusaccharum" مجموعة الأصناف التى لا تتصف أفرادها بوجود السنابل الدقيقة عديمة السداة. ويرى كذلك أن كثيرا من المؤلفين قد أدخلوا عددا من الأصناف ضمن S. Officinatum التى لا تبرز خواصها هذا التقسيم إذ تختلف إلى حد كبير من الوجهة المورفولوجية حتى أنه جعلها أنواعا مستقلة. وقد ثبتت فكرة جزويت في هذا الصدد شيونا جليا بواسطة أبحاث برير (١٩ - ٢٠) في علم الخللايا وهى الأبحاث التى روعيت فيها العناية والدقة كما أبدتها أيضا التوزيع الجغرافى للأنواع الأربعة التى اختزلت إليها الأجناس بمعرفه جزويت. وفي المقدمة الآتية المترجمة عن مؤلف جزويت الأصل (٢٤) نجد الصفات التى بنى عليها تقسيم الأنواع.

### أنواع القصب (Saccharum)

(١) محور الأزهار الرئيسى ومحور اللثة (اجتماع البراعم) بهما شعرات طويلة. والفصاح (Glumes) (انظر الشكل) في العادة عبارة عن أربع الفلبسات (Lodicules) مهلبة أو غير مهلبة وإذا لم تزهر سبيلات الزوج الواحد في وقت واحد فإن السبيلة ذات النوى تنبأ في الأزهار دائما أولا والسبقان خضراء أو خضراء داكنة. أو نحاسية مائلة إلى الخضرة أو في لون العاج أو بيضاء.

١ - الفلبسات مهلبة ويوجد مداد طويل تحت الأرض ينمو بريرا "Saccharum Spontaneum. L."

٢ - الفصاح ليست مهلبة. المداد الذى يظهر تحت الأرض قصير - نباتات زراعية متجة للسكر.



(١) عرض الأوراق بصل (٥٠ م.م) أقصاب طويلة عقدها كلها مغزلية (ضيقة الطرفين مثلثة في الوسط) برتزية اللون مائلة الى الخضرة (يوجد ضمن البعض الآخر

فصص *Saccharum Sinense Roxb. amend. Jesweit* (nba)

(ب) الأوراق ضيقة . أقصاب قصيرة يتعدّر تمييزها . والعقد في العادة اسطوانية رمادية دكاء أو بيضاء أو في لون العاج . وتكاد تكون قاصرة على الهند البريطانية (بين الأنواع الأخرى فصص *Chunnee Saccharum Carberi Jesweit* ) .

(ب) المحور الرئيسي للأزهار ليس بذى شعيرات طويلة قط . وهو أملس عادة . وعقد العمود الشوكى ملساء أو قليلة الشعيرات للغاية . ويبلغ عدد القناب على العمود ثلاثة وأحياناً أربعة والفليسات ليست مهسدة . وإذا أزهرت السنبيلات الزوجية في أوقات مختلفة فإن السنبلة اللاصقة بساق النبات تبدأ في الأزهار ويختلف لون السبقان من شاحب إلى أخضر داكن أو أصفر داكن أو أحمر داكن أو سمجى مخطط دائماً . نبات زراعى *Saccharum Officinatum L.*

١ - له قنبعة ربعية . نباتات قوية النمو ذات نسبة منخفضة من السكر والأعماط من بينها *Green Coerman (Carven) Duitsch, Ardjoens, Fidji, New Guinea* .

٢ - يوجد بدون قنبعة زاعة . نباتاته ذات نسبة سكرية مرتفعة على العموم . الأعماط من بينها *Bandjermasin, Borneo, Cheribon, Praanger* .

وقد أصاف جزويب نتيجة لرحلته مع براندز في بابو (Papua) (٢١) نوعاً خامساً من القصب النمو على الأحر وجد في تلك الجزيرة وأطلق عليه اسم *S. Robustum* (٢٢) .

ويرى إيرل *Earl* وغيره من النفاة مثل ارتشويجر (*Artschwager*) وبراندرس (*Brandes*) ٢٤ أن القصب الذى اتخذ جزويت انقسم أنواعه مقبولة ولكن كان من رأى إيرل أنه لم يمت حد في موضوع أجناس قصب السكر وتسميتها وظن أنه ستظهر في المستقبل أنواع جديدة من قصب السكر عدا الخمسة المعروفة .

## انتساج أنواع جديدة من قصب السكر

كان الجزء الأكبر من السكر حتى نهاية القرن الماضى عدا بعض أنواع من الفصيلة المعروفة في الهند باسم "Barberi" والنوع المسمى "nba" من فصيلة "Sinense" في النال وبعض الأقايم الأخرى يصنع من بعض أنواع أصيلة من القصب المسمى "Noble" وأكثره من النوع المسمى "S. Officinatum" وقد كان أشهرهم نوع من الـ "Cheribon" أو الـ "Praanger" الموجود في جاوة (ويشبان للقصب البلدى في مصر والقصب الأبيض الشفاف "White transparent" الموجود في جزر الهند الغربية والنوع الشهير "Cristalina" بكوبا وكذلك نوع "Rose Bambon" في هاواي وغيرها) والـ "Bourbon" الذى يزرع بكثرة في بيرو والـ "Cavangerie" أو الأعماط "Tanna" وما إليها . وفي ذلك الوقت كانت غارات المرض والحشرات وحالات التربة المتغيرة تتأب هذه الأنواع فأحدثت أضرارا تدريجية أو سريعة في كثير من الأقطار الشهيرة بإنتاج السكر وقد كان الشائع منذ قرون أنه نظرا لانتشار بذرة قصب السكر الأصلية بالمثل فقط لا جنسيا منذ أجيال بعيدة فانها فقدت قوة إخصابها . ولما تبين خطأ هذا الاعتقاد اتسع المجال لاحتالات كثيرة لتربية أنواع جديدة بواسطة تهجينات جنسية مخلوطة . ولم يعد هناك مجال للشك في أن استمرار وجود أكثر صناعات قصب السكر الهامة يرجع الى كشف قوة إخصاب بذرته من جديد في الثمانى السنوات (١٨٩١ - ١٨٩٩) الأخيرة من القرن الماضى . ومن الغريب جدا أن هذا الاكتشاف حدث مستقلا في نفس الوقت بواسطة علماء التناسليات في شطرى الكرة الأرضية وهم هاريسون "Harrison" وبوفل "Bovell" في باربادوس "Barbados" بجزر الهند الغربية وصونولويل (Solow del) في جاوة وجزر الهند الشرقية الهولندية .

وبعد هذا الكشف التاريخى بعدة سنوات (٣٢) أمكن تربية القصب من بذرة لم يعرف لها إلا أصل واحد - بواسطة التلقيح المكشوف - (\*) ولكن في الفترة بين

\* يقصد بالتلقيح المكشوف البت المعروف أنه فقط والذى بأنه القح بواسطة التزاح أو الحشرات من

أى نوع من أنواع الزرع .

(١٨٩١ - ١٨٩٩) نهض كوبس "Kobus" في جاوة بغن التجهيز الصناعي والآلات تعتبر أغلبية الأنواع الجديدة التي ربيت هي التي توفرت فيها الخواص الآتية :

القوة المضطربة ، محتويات السكر ، نوع النمو ( قائم ، راقد ، قائم الخ ) أوات الضجج ، مقاومة المرض ، مقاومة تحول السكر ، مقاومة البرودة ، مقاومة جذب أو عدم موافقة ظروف التربة . فمثلا رأى الدكتور يعقوب جزويت منتج قصب يافا العجيب " P.o.j 2878 - J. Wonder " عند بدء أعمال التربة في جاوة نفس نوع القصب الذي كان مطلوباً منه حيثئذ صنف فوق جميع الأصناف الأخرى التي كانت تزرع إذ ذاك في تلك الجزيرة واستطاع في خلال عشر سنوات بعد دراسة دقيقة للأبناء التي نجحت من تهجيت مختلفة للأبناء التي تحتوي على دماء نوعين أو ثلاثة من الـ " Saccharum " أن ينتج في فترة دراسة عشر سنوات مثل ذلك الصنف الذي تخيله عند بدء عمله ونتيجة لهذا العمل ارتفعت نسبة إنتاج السكر في جاوة في الفدان بمقدار ٢٥٪ زيادة عن الأنواع البذرية التي تحسنت إذ ذاك تحسناً كبيراً والتي استعاض بها الفتيون في جاوة عن الأصناف التي كانت تزرع قبل ذلك وبالمثل فإن محطة تجارب زراعت قصب السكر في هاواي استطاعت بعد إنتاج صنف " H. 100 " وهو الذي يرجح أن يكون هجيناً بين النوعين الأوليين الهاميين " Lathama " و " Rose-Bombay " أن تزيد محصول السكر في الفدان في زراعتها التي تروى ربيعاً بعامين بمبلغ نحو ٥٠٪ . وهذا هو النوع الذي لا يزال محفوظاً بأكثر نسبة للإنتاج في الفدان فأفضل الواحد الذي تبلغ مساحته حوالي ٢٠ فداناً قد أنتج منذ بضع سنين حوالي ١٧,٩ طناً من السكر للفدان وهي كمية تكاد لا تصدق بلينا نجد الإنتاج في مساحات أقل من ذلك تتجاوز العشرين طناً من السكر للفدان . وفي ثمانين سنين بين سنتي ١٩٢٣ - ١٩٣١ ارتفع مجموع إنتاج السكر في جزيرة بورتوريكو الصغيرة من ٤٥٠,٠٠٠ طناً إلى ضعف هذا المقدار تماماً كنتيجة لادخال وتربية زراعة نوعين من بار بادوس " B.H. 10 (12) " و " S. 12 (4) " ودون أي زيادة محسوسة إذ هي محدودة جداً في الجزيرة المسماة " Isle of Enchantment " .

وفي مصر زاد إنتاج الفدان من السكر بنسبة ٣٠٪ بعد أن أدخل هنري نوس بك المدير العام لشركة السكر في مصر الآن النوع " P.o.j 105 " من جاوة منذ ثلاثين سنة

إذا أخذ يتأقلم بالتدرج مع حقول القصب المصرية وحتى بعد محاولات حضرات : نوس بك ، ر . روبنسن مدير مصنع السكر بجمع حمادى واستيرادهما عدة مئات من الأنواع منذ ذلك الوقت فإن هذا القصب لا يزال أحسن نوع مطلوب في مصر بوجه عام فهو يجمع تكييفاً في الأراضي الضعيفة حيث نشأت زراعة القصب البلدى . وفي الأراضي الصالحة كانت نسبة المحصول أحسن بكثير من محاصيل الأنواع الأخرى وهو يقاوم مرض النخبط (Streaks) (\*) والفنفساء (Mosaic) وتبقي الأوراق وغيرها من الأمراض النباتية مقاومة كبيرة . كما يقاوم عدم صلاحية التربة وأحوال الصرف السيئة ، وأهم عيب فيه هو انخفاض نسبة في النقاوة بالنسبة لمجموع ما يحتوي عليه من السكر والجيد وهذا يدل على زيادة نسبة الشوائب التي يظهر أثرها في صعوبة العصير مما يقلل إنتاج المصنع نوعاً ما ومع ذلك وفي رأي صراحة أن أي نوع من القصب يثبت أنه أعلى مثلاً من النوع " P.o.j 105 " الذي ربي منذ زمن بعيد وبقيت زراعته سيكون من شأنه أن يمتاز بخصائص استثنائية مثل القوة المضطربة وقوة مقاومة المرض وارتفاع نسبة السكر وغيرها . وقد كرسنا علمنا في التربية لتتمام المحصول على نوع أو أكثر منصف بمثل هذه المعايير . وإلى هذا الحد يبدو أن عدد قليل من أشهر أنواع القصب في البلاد الأخرى مما لم يزرع قبلاً في مصر قد استورد واختبر أراء " P.o.j 105 " للقارنة فإن القسط الأكبر من جهودنا موجه لتنمية الأنواع البذرية المعروفة الأصل بحيث نستخدم في التربية سلالات تأتي بأحسن النتائج التي ترجى منها بالنسبة لظروفنا . وبهذه الكيفية وإلى جانب ميزة القدرة على الاشتغال في عدد كبير من الأنواع والمجتمعات فإن خطر دخول أمراض القصب المألوفة من الخارج وهي أخطر ما يكون ، والتي تعتبر مصر لحسن الحظ بمنجاة منها ، يكاد يكون مستبعداً بالمرّة كما أن الفرص التي تسمح للمحصول على أنواع مستكملة لصفات الهجين المطلوبة تكون بنوع أخف عظمية الأثر .

### خلاصة موجزة عن تربية القصب في مصر

نظراً إلى أن قصب السكر لا ينتج بذرة خصبة تحت ظروف مصر الجوية القارية من ظروف المنطقة الحارة فإن الفرع الجديد لأبحاث قصب السكر كان لابد أن يستعين بعلوم

\* النخبط (الاستريك) مرض فطري يحدث خطوطاً صفراء على الأوراق .

ومما يستحق الذكر نأتى فيما يلى بالخصائص البارزة لعدة أنواع من قصب هاواى بقصد افادة المربين الآخرين :

( ١ ) كانت نباتات الأبناء متباينة الشكل نوعا ولو أنها ناتجة من بكرة منفعة ذاتية . كذلك يجب أن نذكر أن الأب كان منفعا تلقيا ذاتيا أيضا .

بيد أن الأغلبية الكبرى للبادات كانت رفيعة خضراء اللون مع قابليتها الشديدة لتساقط طوليا . وكان ضمن هذه المجموعة كميات من الأنواع الخافتة نوعا ما وألوانها متفاوتة من الأخضر المشوب باصفرار الى الوردى والأدكن الى الأرجوانى . وبين أن ٧٣ % من البادات يصاب بعدوى تخطط الأوراق الأصفر اصابة شديدة ويتوقع قلة السكر فى هذه على العموم بسبب وجود دم من نوع " Kassoo " به .

( ٢ ) ثبت متفوقا وأعطى سلسلة من القصب الرفيع الرائد ولونه أخضر مائل الى الاصفرار وله ميل شديد بوجه عام لتكون جذور عرضية وافرغ مبكرة النضج قبل أوانها وقد أصيب ٧١ % منها بشدة بمرض تخطط الأوراق الأصفر .

( ٣ ) أحدث نباتا متفوقا وحوالى ٢٥ % من قصبه مشابه من جميع الوجوه لقصب المجموعة رقم ٢ المذكورة سابقا والباقي عيادته غليظة قصيرة ما بين العقل وضعيفة النضج وله ما للنوع السابق من الميل لتكون أفرخ هوائية (Lilius) وجذور عرضية . وكلها أصيبت بشدة بمرض تخطط الأوراق الأصفر وهو الذى يتعمل حدوثه بسبب النمو الضعيف بوجه عام .

( ٤ ) كان فى نباته أحسن من المجموعتين السالفتين وشكل البادات فيه كثير الشبه بتلك التى فى المجموعة رقم ٣ المبينة أعلاه . وظهرت الاصابة بالتخطيط بشكل واضح فى ٩٠ % منها .

( ٥ ) نظرا لوجود دم الـ Kassoo من كلا الأبوين فإنه ينتظر انتاج قصب قيمة السكر فىه منخفضة وتلك هى الحالة التى انتهت اليها . أما الانبات فكان مشابها لما فى المجموعة رقم ٤ . ومعظم البادات كان أخضر اللون مصفرا رفيعا قصيرا ما بين العقل مع ميله لتكون

الورانة ومررى النبات الذين يعملون فى مختلف محطات تجارب قصب السكر فى المناطق الحارة تلك المحطات الموزعة فى سائر انحاء العالم . وقام هؤلاء العلماء بما فطروا عليه من حب معاونة الغير ، بعمل الهجن المطلوبة فى معاهدهم وارسلوا البنا الرغب المهجنة لانتباتها كما أرسلوا الملاحظات وطرق التجارب التى توافق حالات التربة والمناخ عندها .

وقد حصلنا على بادراتنا الأولى من هجن تفضل بعملها عالم الورانة " Mangelsdory " بمحطة تجارب زراع السكر بهاواى وذلك بناء على طلب المستر " P. Neuville " مفتش شركة السكر العمومية بمصر . وزيادة على الهجن المكون من ( H 109 X Kohala 202 ) ( نموذج بزرى ) الذى لم يثبت أجريت تجربة زراعة الهجن الآتية فى عدة سنين :

رقم المجموعة	الأب	المصنف
١	1 مطح (معدن) ( W.S. 600 )	CA Self Kassoo Seedling
٢	P.O. j 2723	Mares 314 (Noble Blood)
٣	28 4868	260 370 ( .. .. )
٤	28 530	Manor 307 ( .. .. )
٥	P.O. j 2723	W.S. 600 (Noble Blood)
٦	28 4122	Ewa 624 ( .. .. )

ولم يبق من أنواع القصب المذكورة خلاف نوع واحد من السلسلة الأولى وهو من النوع المنفح نقيع ذاتيا المسمى (W.S. 600) واستبعد الباقي وذلك إما نظرا لضعف صفات نموه وسرعة اصابة الباقي بالمرض أو لانخفاض مقدار ما يحتوى عليه من السكر . ونجرب الآن تجربة نوع الموحود فى جهة تقع حمادى بزراعته مع أصناف أخرى قليلة من التى حصل عليها أخيرا واتى يؤمل لها الخير . وذلك بمعاونة المستر روش R. Roche ويزرع الفرع (P.O. j 105) الذى يعتبر معيارا لقصب السكر المصرى للقارنة وقد رمز له برقم مصر 8 (Egypt) ولونه ضارب الى السمرة ويتورد بتعرضه للشمس ونموه قائم تماما وهو متوسط الحجم وعقله طويله ونفريعه كثير . وإذا يصاب بمرض تخطط الأوراق الأصفر فإنه على ما يظهر يتعمله تماما وهذا على عكس معظم اخوته من أنواع القصب .

أفرخ هواثية (Ladas) وجذور عرضية . ولكن حوالى ٢٠ ٪ تماما كانت مشابهة في الشكل لال Kassoer وظهرت الإصابة بمرض تحطط الأوراق الأصفر بشدة في ٤٠ ٪ منه .

(٦) كان الاثبات في هذه المجموعة متفرقا أكثر منه في المجموعتين السالفتين وأنتج في الغالب قصبا أصفر وأخضر وسنمكه جيد ولكن عقده الداخلي (ما بين العقل) قصيرة وهو متقابل في العادة وعلى العموم يبسل إلى الرقاد على الأرض بالرغم من أن أكثره يدل على عوق في النمو مما قد يعزى إلى شدة إصابته بالتحطط بنسبة ١٠٠ ٪ وقد كانت الأفوخ الهوائية كثيرة في هذه المجموعة .

#### بإدرات جزيرة ماوريشس (Mauritius Seedlings)

هذه الأنواع البزيرية التي تبشر بمستقبل حسن إن هي إلا سلالة تجربتنا ناتج مخلوط رقم ٧ وهو محين بين (P.O. j 2878 و Uba Marot) وقد حضره لنا المستر لويس بايساك (M. Louis Baissac) الخبير الفني بمصلحة الزراعة بجزيرة ماوريشس (Mauritius) في شهر أغسطس سنة ١٩٣٢ وقد استغرق وصول البذرة سنة أسابيع في الطريق وقد يعزى الاثبات القليل الذي حصل عليه إلى ذلك . ومن وقت الاثبات أظهرت هذه البادرات قوة في النمو وتساويا في الحجم . واحتفظت هذه النحوص في الحقل في كلا محصولي السنتين الأولى والثانية . وقد امتاز بعض المجموعة الجذرية وبكال نمو القمة والاثبات في هذه المجموعات شبه بالنباتات النوع (P.O. j 2725) فإن الأفوخ تنب من الأرض على زاوية تبلغ حوالى ٥٤ درجة وتعطى النبات شكل القصب الرافد على الأرض رقادا شديدا ولكن بعد أربعة شهور أو خمسة تستقيم العبدان وتصبح عمودية جدا ومعظم القصب يقارب في لونه لون أصل الأمم فينبغي فيه الانتباه (الخوثر المسع) وقد يظهر في البعض منها تنوعات طويلة جدا رفيعة على شكل ثمن . واعتز حوالى نصف البادرات فيه بخصائص الاعتماد الورقية الشائكة التي تظهر في النوع (P.O. j. 2878) ولم يستبعد منها خلاف صنف واحد وذلك نظرا إلى قابليته لمرض تحطط الأوراق الأصفر الذي يتفشى كثيرا في النوع (P.O. j 2878) في مصر .

وقد اختصرت هذه المجموعة بالانتخاب حتى بلغت ثمانية أنواع (B-9) إلى (B-16) وهي فضلا عن إنتاجها المرضي وصفات نموها الحسنة ومقاومتها للأمراض وغيرها فقد بلغ

متوسط المواد الصلبة لخمسة اختبارات بواسطة الجهاز اليدوي لقياس المواد الصلبة فوق ١٦ ٪ ثلاثة اختبارات منها كانت على قصب أول سنة ، واثنان على قصب السنة الثانية (الحلقة الأولى) . وفي شهر مارس أرسلت كميات كافية من القصب البذرة لكل من هذه الأنواع إلى المستر "Rochu" ببيع حمادي للاختبار التجاري .

#### بإدرات بورتو ريكو سنة ١٩٣٣ Puerto Rico Seedlings

في أول يناير سنة ١٩٣٣ أرسل اليانا عالم الوراثة ت. برجر Thos Berger محطة التجارب الجزائرية ببورتو ريكو خمسة أنواع من الأزهارات المخصصة من كل من الهجن الأتية :

رقم المختبر	الأق	الأصل	العلامة
٨	P.O. J. 2364	—	S.C. 12 (4)
٩	2725	—	"
١٠	2878	—	ملقحة بغير مكشوف
١١	Columbore 281	—	"

واستطنا بواسطة ترتيبات المراسلات الجيدة أن نزرع البذرة بعد غسها بشهر واحد . وأمكننا الحصول على ثبات ممتاز من صناديق مخلوط رقم ٨ بنحو ثلاثة أضعاف البادرات التي نتجت من رقم ٩ . أما المجموعة رقم ٨ فكانت أقوى في ظاهرها من رقم ٩ المشار إليه هنا . وقد نبتت بذرة النوع P.O. j 2878 الملقحة تلقيا مكشوفًا متباعدة تباعدا كبيرا وكان مظهر البادرات غاية في الضعف وقد نمت كلها بسطه . بيد أن بذرة النوع Co 281 الملقح تلقيا مكشوفًا لم تنتج إلا بادرة واحدة حسنة قريبة الشبه من الأصل .

وقد تبين من قصب المجموعة رقم ٨ حال وجودها في الحقل أنها مجموعة متباينة من وجهة النمو ومن وجهة نسب احتوائها على السكر ولكنها تتفق كلها في لونها الأخضر الخفيف وحوالى ٢٥ ٪ منها يشبه تمام الشبه النوع P.O. j 2725 وقليل منها يشبه الأصل المذكور . وقد عددها في زراعات سنة ١٩٣٥ حيث انتخب منها ما لا يكاد يبلغ مائة صنف .

## بإدرات سنة ١٩٣٤

بملاحظة نمو عدد محدود من الهجن والأصول في ظروف البيئة المصرية استطعنا بعد تجربة عامين أن نتوسع في العمل بشكل واضح في سنة ١٩٣٤ وأن نطلب من زملائنا هجنا أكثر شهرة ولما لم يكن هنالك وقت كاف لإجراء ملاحظات تفصيلية في الحقل عن تلك البادرات فإن معظم المعلومات المحدودة الآتية تتصل بالانبات وشكل البادرات الصغيرة في الصناديق والأصص .

### بإدرات داميريرا Damerera Seedlings

تجارب الهجن رقم ١٦ و ١٧ تمثل في سلالة من الأزهارات الملقحة تلقى ذاتيا من صنف دياموند ١٠ (Diamond 10) ودياموند ٦٢٥ (Diamond 625) والتي تفضل بارسالما الينا جناب المستر (Sidney) Dash مدير الزراعة في غيانا البريطانية فوصلت الينا في مستهل العام بعد أن استغرقت في الانتقالات ستة أسابيع. وقد أنبتت بذرة دياموند نباتا قويا جدا فاستطعنا أن نزرع منها في الأصص ألف بادرة . ولكنها لما كانت بإدرات دياموند ١٠ الملقحة تلقى ذاتيا في غيانا البريطانية فإنه ثبت أنها ضعيفة النمو بدرجة يئس لها حتى أنه مات منها ٧١,٥٪ في نهاية شهر أبريل وما تبقى من البادرات كان مظهريه في منتهى الضعف أما المائة والثلاثين بادرة التي أمكن زرعها في الحقل فقد نمت في الأرض نموًا بطيئا حتى أننا لم نستطع زرعها إلا في نهاية شهر يونيه. والقليل من بادرات (D ٦٢٥) التي زرعت في الحقل في النهاية ساء نموها جدا ولن يستمر في تجربتها .

### بإدرات باربادوس (Barbados Seedlings)

هذه الهجن قد عني بإجرائها المستر ماكنتوش (Mr. McIntosh) الاختصاصي في علم الوراثة بمصلحة الزراعة بباربادوس ووصلتنا على جناح السرعة في منتصف شهر يناير إذا أنها لم تستغرق أكثر من ستة وعشرين يوما . وفي أعداد الهجن العديم الانبات المسمى (B.A. 11569 - 13218) فقد وردت الينا الهجن الآتية :

وكذلك كان قصب المجموعة رقم ٩ ذا لون أخضر خفيف فيما عدا نوع واحد لا يرجى منه وهو رفيع وردى اللون ويحتوى على نسبة منخفضة من السكر . ونسبة كبيرة من هذه السلالات أقرب في الشبه إلى الأب الذكر عن الأب الأنثى وقد احتفظ لزراعة سنة ١٩٣٥ بثلاثة وعشرين نوعا من البادرات فقط وقصب المجموعة رقم ١٠ فيما عدا صنف واحد أخضر مشوب باصفرار . له اللون الرمادى الأخضر الذى هو من مميزات النوع (4) S.C 12 واحد عشر منها اعتبرت صالحة للاختبار لسنة ١٩٣٥

### بإدرات هاواي سنة ١٩٣٣ Hawaiian Seedlings

نمت هذه البذرة في اليوم العاشر من فبراير سنة ١٩٣٣ ووصلت الينا بعد هذا التاريخ بشهرين وترتب على ذلك المخطاط الانبات الى حد بعيد جدا وفيما عدا المحلول (H. 109 x P.O. 2878) الذى لم ينبت قط أرسلت الينا الهجن الآتية :

رقم تجريب	الأب	الأب	الذكر
١٣	62 C 148	—	Molokai 1604 (1/2 S. robustum blood)
٣	Mol 1604	—	27 C 445 (x 1 Caladonia x H 109)
١٤	28 1981	—	32-7665 (1/2 Robustum blood)
١٥	28 1739	—	32-9099 (1/2 Robustum blood)

وقد كان من الغسل البين أن حصلنا على بادرات قليلة من هذه الهجن المسماة (S. robustum) بين أن تلك الأنواع التي بقيت لم يكن ظاهرها مما يلفت الأنظار ولم تكن محتوية على نسبة جيدة من السكر . وفي سنة ١٩٣٥ ربيت بادرة واحدة فقط من كل من المجموعتين رقم ١٢ و ١٤ وكان الأول أرجوانى الشكل سميكًا ذا عقل طويلة ولكنه كان ضعيفا في ظاهره من حيث التفريع في حين أن الثاني كان رفيعا نحري اللون أو بالأحرى شبيها بالنوع (Co. ٣٨١) .

رقم المخلوط	الأق	الأصل	مصدر
٢٧	H.Q. 400	---	S. L. 12 (4)
٢٨	(بأخرة من Cherbon 251 N. 28)	---	Q. 13
٢٩	N. G. 16	---	P. 3 2940

بينما كان الانبات غزيراً جداً في صناديق المخلوط رقم ٢٨ في مدى ستة أيام ومعتدلاً في صناديق المخلوط رقم ٢٧ وبتفرقا للغاية خفيفاً في صناديق المخلوط رقم ٢٩ فإن جميع هذه البادرات كانت شاذة ولا سيما في المخلوط رقم ٢٨ . فبعد ابتداء الانبات كانت الصناديق غير مستوية بمحالة غير عادية وكانت الأشطاء بارزة من التربة شائكة قليلاً صفراء اللون وبها تنوعات مبيضة ولم يتم واحد من النباتات نموا عادياً وكانت الأوراق الصغيرة المنساقطة ذات بقع حمراء أفضحت فيما بعد سوداء عند ما أصيبت البادرات الضعيفة بالموت . ولم يتم إلا بأربعين بادرة من هذه المجموعة وجدت جذيرة بجذورها في الحقل .

### بادرات بورتوريكو :

قد وصل زغب هذه المجموعة إلى الجليظة في منتصف شهر فبراير بعد أن استغرق في الطريق ستة أسابيع وقد احتوت على الهجن الآتية :

رقم المخلوط	الأق	الأصل	مصدر
٣٠	Po. J 2304	E.K. 28	(عدد من نفس الأصل من 2571 و P.o. J 2304)
٣١	M (ayaguez) 28	لقتت تفجياً مكشوف	---
٣٢	P.o. J 2040	»	---
٣٣	P.R. 803	»	(حسب التواجد البر 2578 و P.o. J 2040)

رقم المخلوط	الأق	الأصل	المصدر
١٨	B. 11569	---	B. H. 10 (12)
١٩	"	---	B. 417
٢٠	"	---	S.C. 12 (4)
٢١	"	---	D. 1135
٢٢	"	---	B. 3265
٢٣	B. 3172	---	D. 391
٢٤	B. 3238	---	B. 391
٢٥	M. D. 11	---	B. H. 10 (12)
٢٦	Tobacco	---	S.C. 12 (4)

وقد حصنا على ثبت متميز من المجموعات كلها فيما عدا رقم ١٩ ( بادرتان فقط شتلتا في الأصل من صندوق هذا الرقم ولم تنمو فقط النمو الكافي الذي يبرر نقلهما إلى الحقل ) ورقم ٢٥ ورقم ٢٦ . ومع ذلك فإن المخلوطين الأخيرين أنتجا إلى حد بعيد أحسن البادرات قوة وانتظاماً في النمو وهي الناتجة من مجموعة المخلوط رقم ٢٥ وذلك لكونها بارزة في هذا الصدد وقد كانت أول المجموعات التي زرعت في شهر أيار . أما بادرات رقم ١٨ و ٢٣ فقد ظهر أن بادراتها ضعيفة وبطيئة النمو ومائلتها في صفاتها تماماً المجموعة الناجمة من المخلوط رقم ٢٤ . وكانت المجموعات ٢٠ و ٢١ أحسن نمواً من غير شك أما مجموعة المخلوط رقم ٢٢ فكانت أقل نمواً من المجموعتين رقم ٢٠ و ٢١ .

### البادرات الأولى من كوينزلاند (Queensland Seedlings)

كان الغرض الأول من الحصول على هذه المجموعة ملاحظة انبات وحالة بذور الهجن التي جهزت قبل أن تزرعها في الجليظة ( في منتصف فبراير ) بمدة سبعة شهور . وإليك بيان هذه الهجن :

انبت القطع كلها انباتا متفرقا بعد ستة أيام ولكنه كان قويا . وأما الخلووط رقم ٣٠ فقد أعطى على الأخص مجموعة من البادرات المتساوية الحجم الجميلة المنظر ومثلها الخلووط رقم ٣١ و ٣٢ و ٣٣ مع فرق طفيف بينها .

#### بادرات هاواي :

أرسل اليها هذه البذرة المستر (O. G. Lennox) الأخصائي المساعد في علم الوراثة بمحطة التجارب في هاواي في السابع من شهر مارس فوصلتنا في ٤ أبريل وهو أقصر وقت استغرقته ثخن هاواي . قسمنا المحجن الآتية وهي من أصول مركبة ومن الصعب الوصول إلى أصلها وذلك بخلاف المحجين (20-6258 × D.625) الذي لم ينبت وكتب اليها المستر ليؤكد بقول أنه لا ينتظر منه إلا نبت قليل أو منعدم . وقد أرسل اليها المستر لينوكس تقديرا لعند النبت الذي ينتظر من كل مجموعة من البذرة الطازجة لو أنها نبتت في هاواي . ويسرنا أن نسجل هنا أن الانبات في الجزيرة قد تتبع بالضبط تلك التقديرات النظرية :

رقم المحصول	أصل	الذكر
٣٤	31-429	29-4650 (W.S. 996) (H.56)
٣٥	P.O. J. 2878	32-7403 (D. 1135 + Molokai 1042)
٣٦	P.O. J. 2878	29-4650
٣٧	H. 999	P.O. J. 2878 (لم ينبت في سنة ١٩٣٣)

ابتداً لانيات مد خمسة أيام تماماً وكان حسنا بوجه خاص في الخلووط رقم ٣٤ وتبعها الخلووط رقم ٣٦ الذي ولو أنه لم يعط انباتا الا بنسبة الثلث المتبعة انباتا حسنا فهو الذي أنتج أكثر البادرات قوة في تلك المجموعة مع سرعة في النمو . ومن ناحية أخرى فان بادرات

الخلووط رقم ٣٤ مع كونها كثيرة العدد كانت الى حد بعيد أبطأ الأنواع في النمو . وكان انبات الخلووط رقم ٣٥ متفرقا جدا بيد أن الخلووط رقم ٣٧ لم ينتج سوى عشر نباتات لزراعتها في الحقل .

#### بادرات كونيزلاند الثانية :

أرسل اليها المررب النباتي ادوين . ج . بارك (Edwin J. Barke) بمكتب محطات تجارب السكر بكونيزلاند هذه الرغبة المهجنة الطازجة في العاشر من شهر يوليو ووصلت الى الجزيرة وزرعت في الرابع من شهر سبتمبر وكانت المحجن كما يأتي :

رقم الخلووط	الأني	الأصل	الذكر	الاناث
٣٨	P.O. J. 2725	—	S.C. 12 (4)	حسن
٣٩	»	—	C. 32	ضعيف
٤٠	P.O. J. 2728	—	P.O. J. 2940	حسن
٤١	P.O. J. 2728	—	S.W. 499	»
٤٢	C. 290	—	C. 1098	متوسط
٤٣	S.C. 4	—	C. 290	حسن جدا

بدأ الخلووط رقم ٤١ بنبت نباتا قويا بعد أربعة أيام فقط أما الخلووطات رقم ٣٨ و ٤٠ و ٣٩ فانها استغرقت في الانبات خمسة أيام والباقي بعد أربعة أيام كذلك ولكن كان نباتها متفرقا أكثر من نبت التجربة رقم ٤١ . وكان الخلووطان رقم ٤١ و ٤٠ أحسن الأنواع نموا بعد ثلاثة أسابيع وتبعهما في ذلك الخلووط رقم ٣٨ وكانت نباتات الخلووط رقم ٤٢ ضعيفة في ظاهرها بطيئة في نموها بيد أن النباتات رقم ٤٣ كانت أكثرها انباتا وأظهرت ضعفا في نموها مشابهة في مظهرها للنمو المبكر الذي حدث في الخلووط رقم ٣٨ وقد تحول لون البادرات الصغيرة في الوسط الى اللون الأرجواني وكانت تموت تدريجيا في أغلب الحالات وقد استوصلت أشد

نباتا جيدا بدرجة واضحة بينما كان نبات التجربة رقم ٧ ضعيفا وكان متفرقا والمخلوط رقم ٤ و ٩٩ وبلغ تفوق النباتات غايته في المخلوط رقم ٨ وكانت أوراق نباتات المخلوط رقم ٥ رفيعة تشبه الريش بينما كانت أوراق التجربة رقم ٦ أعرض وأقرب شيئا بالذكر كما كان الحال في البادرات القليلة الناتجة من التجربة رقم ٩٩

ولقد مكثنا حتى اليوم ندرس السلالات الناتجة في تجارب تهجين يكاد يبلغ عددها خمسين تجربة والتي تمثل جميع الأصناف المشهورة من قصب السكر التجارى تقريبا وكذلك الخمسة الأنواع المعروفة من جنس (Saccharum) وطبيعى أن معظم هذا العمل مبدئى للغاية إذ يجب علينا أن نركز مجهوداتنا في تلك الهجن التي يربى منها خير كثير في ظروفنا . وقد كانت الفترة التي أجريت فيها هذه الأبحاث كافية لتكوين نتائج أولية للهجن التي سيجرى عليها البحث طويلا . ومع ذلك فانا نستطعن أن نستبعد بعض الهجن نباتا لزم سياسة الغرض منها مضاعفة إنتاجنا في الأنواع الأخرى حيث أننا لو استطعنا أن نحفظ بمعاونة غيرنا ممن يشتغلون بتربية النباتات فإن نتائج السنوات القليلة المقبلة ستوفقنا على كثير من المعلومات الغزيرة الدقيقة وبعبارة أخرى كان أقصى ما يراود بعملنا حتى اليوم وضع أسس وطيدة نستطيع أن نشيد عليها بناء البحث الاقتصادى العظيم .

البادرات إصابة لإفصاح مجال النمو للقوى منها . وقد زرع منها في النهاية حوالى المائة في أخص في الشهر الأخير من أكتوبر .

وفي منتصف الشتاء كانت نباتات المخلوط رقم ٤١ أحسنها مظهرا وأكثرها انتظاما وشدة في النمو وتبعها مباشرة المخلوط رقم ٤٢ . وكانت المجموعات الأخرى كلها بطيئة النمو وقد زرعت شتلات كويتلاند هذه في ٢٠ مارس سنة ١٩٣٥


### بادرات سنة ١٩٣٥

تسلمنا في شهر يناير ست مجموعات من الهجن الواردة من بورتوريكو وكانت أعدت أثناء زيارتي لتلك الجهة في أكتوبر الماضى . والمجموعات الأربع الأولى تفضل بإرسالها اليها الدكتور هو لجر جوهانسن (Dr. Holger Johansen) من أصناف إسبانين مصلحة الزراعة بالولايات المتحدة (والجمعية الدولية للأخصائين في قصب السكر) على مقربة من غواياما (Guayama) وأما المجموعتان الباقيتان فقد أرسلهما اليها قبلد سبت ما ككوني (Field Supt. Mc Connie) من محطة التجارب التي تديرها شركة سكر فاجاردو (Fajardo Sugar Co) بالساحل الشرقى المطر . وفيما بل بيان بالهجن التي حصلنا عليها :

رقم محصور	أصل	المذكر
٤٤	Po. j 279	Uba Marot (مشتبة بالبادرات - ورشيس التي الهجن)
٤٥	Co. 281	U. S 1694
٤٦	Co. 281	C.P. 1105
٤٧	Po. j 2725	Po. j 234
٤٨	P.R. 897	E.C. 966
٤٩	Po. j 2725	E.C. 916

وقد كانت الانبات في صناديق المخلوط رقم ٥٥ أ كفف ما رأينا من قبل إذ كانت الصناديق في حوالى عشرة أيام كأنها مزروعة بحشائش الجويدار . وكذلك أعطى المخلوط رقم ٤٦





ثمرة بادرات قصب البذرة




قطع التجربة الشطرنجية لاختبار الأصناف

الطبعة الأولى: ١٩٣٥-١٩٣٦



قصيب غير مرغوب فيه لشكل أزراره ( عيونته ) الناتجة السهلة الكسر



قصب البذرة E- 8

وزارة الزراعة

قسم تربية النباتات

# النشرة الفنية

رقم ١٦١

تربية قصب السكر في مصر  
تقرير عن تقدمها

بسم

المستر آرثر . ه . روزنفلد

مدير قصب السكر بوزارة الزراعة

ترجمت عن الانجليزية بقسم الارشاد الزراعي

طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة ، سنة ١٩٣٦

تباع مطبوعات الحكومة بصالة البيع بوزارة المالية . أما الكتابات  
الخاصة بهذه المطبوعات فترسل رأساً الى فلم النشر بالمطبعة الأميرية

الترن ٣٠ ملجا



## تربية قصب السكر في مصر

تقرير عن تقدمها

المستزر  
المستزر أرتز "هـ" وزغند  
خبر قصب السكر بالحكومة المصرية

إن غاية ما ترمى إليه جميع الأبحاث أمران ، زيادة طاقة المجموع أو الفرد على الانتاج والقيام بما يستوجبه تنظيم العمل على الوجه الأكمل — لامتداد المجموع بشئ . يعود عليه بالمنفعة — من قول كليمانس F.O. Clements

### الوضع التباقي لقصب السكر

قصب السكر حشيش معمر طويل ينتمى إلى العائلة المعروفة باسم النجيلية "Graminaeae" (جرامينايا) وإلى الفصيلة "Andropogoneae" (أندروپوجونيا) وقد أطلق عليها لينوس Linnaeus زعيم مصطلحات العلوم البيولوجية في سنة ١٧٥٣ (١)† اسمها الجنس والنوعى (سكرام أوفسينارم) Saccharum Officinarium فى الطبعة الأولى من كتابه (Species plantarum) آتى لينوس بنوعين تحت الجنس Saccharum أولهما S. Officinarium وهو الذى يشمل الآن كل ما يعرف بالقصب الممتاز (Noble Cane) وثانيها S. Spicatum الذى استبعد منذ ذلك الوقت من الجنس . وقد أكثر البعث الذين أتوا بعد ذلك عدد الأنواع بسرعة فذكر "ويلدنو" "Willdenow" (٢) أحد عشر نوعاً في الطبعة الثالثة من كتاب Species Plantarum في سنة ١٧٩٧ . وذكر كونث Kunth (٣) في كتاب "Enumeratio Plantarum" في سنة ١٨٨٣ اثنين وعشرين نوعاً وسلالات أخرى عديدة . وأحصى روكسبورج "Ruxburgh" (٤) في كتاب (Flora of India) في سنة ١٨٣٢ أحد عشر نوعاً في الهند وحدها وهذه الأنواع كلها حديثة فيما عدا ثلاثة منها .

† الأرقام الموضوعة بين أقواس هي أرقام كتف المصادر المين في نهاية المقال .

وقد اعتبر يعقوب دى كوردنوى "Jacob de Cordenoij" (٥) أن جميع الأصناف المزروعة تنتمي إلى ثلاثة أنواع وهي S. Officinatum بمساقه القصب المختار "Noble C." أو قصب المنطقة الحارة S. Violaceum وهو القصب ذو الأوراق البفسجية الذى يؤكل أكثره في هاواي وفيجي وإستربال وقصب "S. Sinense" أوقصب روكسبورج الصينى "Roxburgh's Chinese". وميز بنام "Bentham" وهو كز "Hooker" (٦) في سنة ١٨٣٣ اثني عشر نوعا في العالم بأسره كما ميزها كل "Haeckel" اثني عشر نوعا في تنفيذه للحنائش في كتاب "الجمل" "Engler" وبرايتل "Prantl" المسمى "العائلات النباتية" "Pflanzen Familien" (٧) وهو المرجع العام للحنائش في سنة ١٨٨٧ ولكنه وضع اثنين منها فقط في قسمه الذى سماه "Eusaccharum" أو قصب السكر الحقيقى وهما "S. Officinatum, L." "S. Spontaneum, L." التسوع البرى الذى ينمو في الهند وجزر المحيط الهندى . واختصر هو كز "Hooker" (٨) الأنواع في ذلك الاقليم الى خمسة كما ورد في كتابه المسمى "Flora of British India" الذى طبع في سنة ١٨٩٧ .

وقد توسع المؤلفون الحديثون في اتباع تقسيم (هاكل) مع أنه ثبت كما أوضح إيرل "Earle" (٩) أنه من الصعب محاولة تقسيم جميع أصناف القصب الى مجموعتين رئيسيتين وبذلك الجهود للوصول الى تقسيم أصوب . وقد ظهر من بحث باربر (١٠) وهو أحد نقباء البارزين الملمين بموضوع القصب الهندى أن صنف القصب البرى المسمى S. Spontaneum الذى ثبت في الهند متغير لدرجة كبيرة . وساعدت فيما بعد دراسات بانير "Bannier" (١١) ٤ برير "Bremer" (١٢ - ١٣) جزويت "Jesweit" (١٤ - ١٥) على إثبات تغيير صفات القصب البرى في الأقاليم المختلفة كما هو الحال في بورنيو الهندية وجاوه والفلبين .

وأشهر حجة معترف بها اليوم في تقسيم جنس "Saccharum" هو الدكتور "Jacob Jesweit" بجامعة واجنجن "Wageningen" هولاندا وهو مستنبط قصب جاوه العجيب "Java's Wonder" P.O.j 2878 . وقد بدأ يقسم من جديد مجموعة القصب في محطة قصب السكر بباسور يان "Paseroean" بجاوة في سنة ١٩١٢ ونشر

كثيرا من المعلومات النفيسة في تقسيم ووصف المجموعة الأصلية ذات السمين صفا إلى وجدها في جاوة وعدد كبير من الأصناف التى أضافها الى المجموعة في خلال الخمس عشرة سنة التالية (١٦ - ١٧) وفي سنة ١٩٢٥ نشر جزويت "Jesweit" الترتيب الجديد الذى وضعه للجنس "Saccharum" (١٨) وقد استبعد منه الأجناس الشاذة "Leptosaccharum" "Erischrysis" "Sclerostachya" إذ اعتبر أنها وضعت هناك خطأ بواسطة "Haeckel" كذلك استبعد من الجنس الثانوى "Eusaccharum" مجموعة الأصناف التى لا تتصف أفرادها بوجود السائل الدقيقة عديمة السقاء . ويرى كذلك أن كثيرا من المؤلفين قد أدخلوا عددا من الأصناف ضمن S. Officinatum التى لا تبرز خواصها هذا التقسيم إذ تختلف إلى حد كبير من الوجهة المورفولوجية حتى أنه جعلها أنواعا مستقلة . وقد ثبت فكرة جزويت في هذا الصدد ثبوتا جليا بواسطة أبحاث برير (١٩ - ٢٠) في علم الخلايا وهى الأبحاث التى روعيت فيها العناية والدقة كما أيدها أيضا التوزيع الجغرافى للأنواع الأربعة التى اخترلت اليها الأجناس بمعرفة جزويت . وفي المقدمة الآتية المترجمة عن مؤلف جزويت الأصل (٢٤) نجد الصفات التى بنى عليها تقسيم الأنواع .

### أنواع القصب (Saccharum)

(١) محور الأزهار الرئيسى ومحور الة (اجتماع البراعم) بهما شعرات طويلة . والقنايع (Glumes) (انظر الشكل) في العادة عبارة عن أربع والفليسات (Lodicules) مهدبة أو غير مهدبة وإذا لم تزهز سنبيلات الزوج الواحد في وقت واحد فإن السنبيلة ذات العنق تبدأ في الازهار دائما أولا والسيفان خضراء أو خضراء داكنة . أو نحاسية مائلة الى الخضرة أو في لون العاج أو بيضاء .

١ — الفليسات مهدبة ويوجد مداد طويل تحت الأرض ينمو بريا "Saccharum Spontaneum, L."

٢ — القنايع ليست مهدبة . المداد الذى يظهر تحت الأرض قصير — نباتات زراعية متجهة للسكر .

## انتاج أنواع جديدة من قصب السكر

كان الجزء الأكبر من السكر حتى نهاية القرن الماضي عدا بعض أنواع من الفصيلة المعروفة في الهند باسم "Barberi" والنوع المسى "uba" من فصيلة "Sinense" في التال و بعض الأقاليم الأخرى يصنع من بعض أنواع أصيلة من القصب المسى نوبل "Noble"، وأكثره من النوع المسى "S. Officinarum"، وقد كان أشهرهم نوع من الـ "Cheribon" أو الـ "Preanger" الموجود في جاوة ( ويتسبان للقصب البلدى في مصر والقصب الأبيض الشفاف "White transparent" الموجود في جزر الهند الغربية والنوع الشهير "Cristalina" بكوبا وكذلك نوع "Rose Bamboo" في هاواي وغيرها ) والـ "Bourbon" الذى يزرع بكثرة في يرو والـ "Cavangerie" أو أنماط "Tanna"، وما إليها . وفى ذلك الوقت كانت غارات المرض والحشرات وحالات التربة المتغيرة تناب هذه الأنواع فأحدثت أضرارا تدريجية أو سريعة فى كثير من الأقطار الشهيرة بإنتاج السكر وقد كان الشائع منذ قرون أنه نظرا لانتشار بذرة قصب السكر الأصلية بالمقل فقط لا جنسيا منذ أجيال بعيدة فانها فقدت قوة إخصابها . ولما تبين خطأ هذا الاعتقاد اتسع المجال لاختلاطات كثيرة لتربية أنواع جديدة بواسطة تهجينات جنسية مخلوطة . ولم يعد هناك مجال للشك فى أن استمرار وجود أكثر صناعات قصب السكر الهامة يرجع الى كشف قوة إخصاب بذرة من جديد فى الثمانى السنوات ( ١٨٩١ - ١٨٩٩ ) الأخيرة من القرن الماضى . ومن الغريب جدا أن هذا الاكتشاف حدث مستقلا فى نفس الوقت بواسطة علماء التناسليات فى شطرى الكرة الأرضية وهم هاريسون "Harrison" وبوفل "Bovell" فى باربادوس "Barbados" بجزر الهند الغربية وصولتو ديل (Soltwedel) فى جاوة وجزر الهند الشرقية الهولندية.

وبعد هذا الكشف التاريخى بعدة سنوات (٣٢) أمكن تربية القصب من بذرة لم يعرف لها إلا أصل واحد — بواسطة التلقيح المكشوف — (\*) ولكن فى الفترة بين

\* يقصد بالتلقيح المكشوف النبات المعروف أنه فقط والذي يأتيه اللقاح بواسطة الريح أو الحشرات من أى نوع من أنواع الزرع .

(١) عرض الأوراق يصل (٥٠ م.م) أقصاب طويلة عقدها كلها معزولة (ضيقة الطرفين بمثلثة فى الوسط) برتزية اللون مائلة الى الخضرة (يوجد ضمن البعض الآخر

قصب Saccharum Sinense Roxb amend jesweit uba)

(ب) الأوراق ضيقة . أقصاب قصيرة يتعذر تمييزها . والعقد فى العادة اسطوانية رمادية ذكاء أو بيضاء أو فى لون العاج . وتكاد تكون قاصرة على الهند البريطانية (من الأنواع الأخرى قصب Chunnee Saccharum Carberi Jesweit) .

(ب) المحور الرئيسى للأزهار ليس بذى شغرات طويلة قط . وهو أملس عادة . وعقد العمود الشوكى ملساء أو قليلة الشعيرات للغاية . ويبلغ عدد القناج على العمود ثلاثة وأحيانا أربعة والقليبات ليست مهدبة . وإذا أزهرت السنبيلات الزوجية فى أوقات مختلفة فإن السنبيلة اللاصقة بساق النبات تبدأ فى الإزهار ويختلف لون السيقان من شاحب إلى أخضر داكن أو أصفر داكن أو أخضر داكن أو بنسجى مخطط دائما . نبات زراعى Saccharum Officinarum L .

١ — له قنبعة رابعة . نباتات قوية النمو ذات نسبة منخفضة من السكر والأنماط من بينها Green Coerman (Carven Duitsch), Ardjoens, Fidji, New Guinea

٢ — يوجد بدون قنبعة رابعة . نباتاته ذات نسبة سكرية مرتفعة على العموم . الأنماط من بينها Bandjermasin, Borneo, Cheribon, Preanger

وقد أصاف جزويب نتيجة لرحلته مع براندز فى بابوا (Papua) (٢١) نوعا خامسا من القصب "صويل" الأحمر وجنده فى تلك الجزيرة وأطلق عليه اسم S. Robustum (٢٢) .

ويرى إيرل "Earle" وغيره من الثقات مثل ارتشواجر (Artschwager) وبراندرس (Brandes) أن الخصائص التى تغذيها جزويت تنقسم أنواعه مقبولة ولكن كان من رأى إيرل أنه لم يبت بعد فى موضوع أجناس قصب السكر وتسميتها ووطن أنه ستظهر المستقبل أنواع جديدة من قصب السكر عدا الحمسة المعروفة .

(١٨٩١ - ١٨٩٩) نهض كوبس "Kobus" في جاوة بفن التهجين الصناعي والآن تعتبر أغلبية الأنواع الجديدة التي تربت هي التي توفرت فيها الخواص الآتية :

القوة الخضرية ، محتويات السكر ، نوع النمو ( قائم ، راقد ، نائى الخ ) أوقات النضج ، مقاومة المرض ، مقاومة تحول السكر ، مقاومة البرودة ، مقاومة جذب أو عدم موافقة ظروف التربة . فثلا رأى الدكتور يعقوب جزويت منتج قصب بإف العجيب "J. Wonder" P.o.j 2878 عند بدء أعمال التربة في جاوة نفس نوع القصب الذى كان مطلوباً منه حيث شد صنف يفوق جميع الأصناف الأخرى التي كانت تزرع إذ ذاك في تلك الجزيرة واستطاع في خلال عشر سنوات بعد دراسة دقيقة للأنشاء التي نجحت من تهجينات مختلفة للآباء التي تحتوي على دماء نوعين أو ثلاثة من الـ "Saccharum" أن ينجح في فترة دراسة عشر سنوات مثل ذلك الصنف الذى تخيله عند بدء عمله ونتيجة لهذا العمل ارتفعت نسبة إنتاج السكر في جاوة في الفدان بمقدار ٢٥٪/ زيادة عن الأنواع البذرية التي تحسنت إذ ذاك تحسناً كبيراً والتي استعاض بها الفنيون في جاوة عن الأصناف التي كانت تزرع قبل ذلك وبالمثل فإن محطة تجارب زراعت قصب السكر في هاواي استطاعت بعد إنتاج صنف "H. 109" وهو الذى يرجع أن يكون هجيناً بين النوعين الأولين الهاميين "Lachama" و "Rose Bombou" أن تزيد محصول السكر في الفدان في زراعتها التي تروى رياً عادياً بما يبلغ نحو ٥٠٪/ . وهذا هو النوع الذى لا يزال محتفظاً بأكبر نسبة للإنتاج في الفدان فأخلف الواحد الذى تبلغ مساحته حوالى ٢٠ فداناً قد أنتج منذ بضع سنين حوالى ١٧,٩ طناً من السكر للفدان وهي كمية تكاد لا تصدق . بينما نجد الانتاج في مساحات أقل من ذلك تتجاوز العشرين طناً من السكر للفدان . وفي ثمانى سنين بين سنتي ١٩٢٣ - ١٩٣١ ارتفع مجموع إنتاج السكر في جزيرة بورنوريكو الصغيرة من ٤٥٠,٠٠٠ طناً إلى ضعف هذا المقدار تماماً كنتيجة لإدخال وتربية زراعة نوعين من باربادوس "B.H. 10 (12)" S.C 12 (4) ودون أى زيادة محسوسة إذ هي محدودة جداً في الجزيرة المسماة "Isle of Enchantment" .

وفي مصر زاد انتاج الفدان من السكر بنسبة ٣٠٪/ بعد أن أدخل هنرى نوس بك المدير العام لشركة السكر في مصر الآن النوع "P.o.j 105" من جاوة منذ ثلاثين سنة

إذا أخذ يتألفم بالتدرج مع حقول القصب المصرية وحتى بعد محاولات حضرات : نوس بك ، ر . روبنسن مدير مصنع السكر بجمع حمادى واستادهما عدة مئات من الأنواع منذ ذلك الوقت فإن هذا القصب لا يزال أحسن نوع مطلوب في مصر بوجه عام فهو ينجح نسبياً في الأراضي الضعيفة حيث فشلت زراعة القصب البلدى . وفي الأراضي الصالحة كانت نسبة المحصول أحسن بكثير من محاصيل الأنواع الأخرى وهو يقاوم مرض الخبط (Streaks) (\*) والفسفساء (Mosaic) وثيق الورق وغيرها من الأمراض النباتية مقاومة كبيرة . كما يقاوم عدم صلاحية التربة وأحوال الصرف السيئة ، وأهم عيب فيه هو انخفاض نسبة النسبة في النقاوة بالنسبة لمجموع ما يحتوي عليه من السكر الجيد وهذا يدل على زيادة نسبة الشوائب التي يظهر أثرها في صعوبة المعسير مما يقلل انتاج المصنع نوعاً ما ومع ذلك وفي رأى صراحة أن أى نوع من القصب ثبت أنه أعل منزلة من النوع P.o.j 105 الذى ربي منذ زمن بعيد وتأملت زراعته سيكون من شأنه أن يمتاز بخصائص استثنائية مثل القوة الخضرية وقوة مقاومة المرض وارتفاع نسبة السكر وغيرها . وقد كرستنا عناية في التربية تمام المحصول على نوع أو أكثر منتصف يمثل هذه المماسن . وإلى هذا الحد بينما نجد أن عدد قليل من أشهر أنواع القصب في البلاد الأخرى مما لم يزرع قبلاً في مصر قد استورد واختبر أراء P.o.j 105 للمقارنة فإن القسط الأكبر من جهودنا موجه لتنمية الأنواع البذرية المعروفة الأصل بحيث تستخدم في التربية سلالات تأتي بأحسن النتائج التي ترجى منها بالنسبة لظروفنا . وبهذه الكيفية وإلى جانب ميزة القدرة على الاشتغال في عدد كبير من الأنواع والهجن فإن خطر دخول أمراض القصب الحلوبة من الخارج وهي أخطر ما يكون ، والتي تعتبر مصر لحسن الحظ بمنجاة منها ، يكاد يكون مستبعداً المرة كما أن الفرص التي تسنح للمصنوع على أنواع مستقلة لصفات الهجن المطلوبة تكون بنوع أخص عظيمة الأثر .

### خلاصة موجزة عن تربية القصب في مصر

نظراً إلى أن قصب السكر لا ينتج بذرة خصبة تحت ظروف مصر الجوية القارية من ظروف المنطقة الحارة فإن الفرع الجديد لإبحاث قصب السكر كان لابد أن يستعين بعلماء

\* الخبط (الاستريك) مرض فطري يحدث خطوطاً صفراء على الأوراق .



الوراثية ومربي النبات الذين يعملون في مختلف محطات تجارب قصب السكر في المناطق الحارة تلك المحطات الموزعة في سائر أنحاء العالم . وقام هؤلاء العلماء بما فطروا عليه من حب معاونة الغير ، بعمل الهجين المطلوبة في معاهدهم وأرسلوا البنا الرغب المهجنة لانتباتها كما أرسلوا الملاحظات وطرق التجارب التي توافقت حالات التربة والمناخ عندنا .

وقد حصلنا على إدارتنا الأولى من هجين تفضل بعملها عالم الوراثة " Mangelsdorf " بمحطة تجارب زراعت السكر بهاواي وذلك بناء على طلب المستر " P. Neuville " مفتش شركة السكر العمومية بمصر . وزيادة على الهجين المذكور من (II 109 X Kohala 202) (نموذج برزى) الذي لم ينتج أجريت تجربة زراعة الهجين الآتية في عدة سنين :

رقم التجربة	الوصف	المساحة
١	(مساحة تقعد ذاتية) W.S. 606	(A Self Kassoor Seedling)
٢	P.O. j 2725	Manoa 315 (Noble Blood)
٣	28 1868	26C. 370 ( " " " )
٤	28 756	Manoa 307 ( " " " )
٥	P.O. j 2725	W.S. 606 (Noble Blood)
٦	28 1122	Ewa 628 ( " " " )

ولم يبق من أنواع القصب المذكورة خلاف نوع واحد من السلالة الأولى وهو من النوع المتفتح تقيح ذاتي المسمى (W.S. 606) واستبعد الباقي وذلك إما نظرا لضعف صفات نموه وبمره صابة البقي بمرض أو لاختطاط مقدار ما يحتوي عليه من السكر. ونجرب الآن تجربة نوع الموجود في جهة نزع حمادى بزراعته مع أصناف أخرى قليلة من التي حصل عليها أخيرا . حتى يؤمن لها خبر . وذلك بمعاونة المستر روش R. Roche ويزرع الفرع (P.O. j 105) الذي يعتبر معيار القصب السكر المصرى للمقارنة وقد رمز له برقم مصر ٨ (Egypt 8) ولونه ضارب في السمرة ويتورده بتعرضه للشمس ونموه قائم تماما وهو متوسط الحجم وعقله طويله ونفريه كثير . وإذا يصاب بمرض تخطط الأوراق الأصفر فإنه على ما يظهر يتحملة تماما وهذا على عكس معظم أخوته من أنواع القصب .

وما يستحق الذكر نأى على بالخصائص البارزة لعدة أنواع من قصب هاواي بقصد افادة المربين الآخرين :

( ١ ) كانت نباتات الأبناء متباينة الشكل نوعا ولو أنها ناتجة من بكرة ملقحة ذاتيا . كذلك يجب أن نذكر أن الأب كان ملقحا تلقيا ذاتيا أيضا .

بيد أن الأغلبية الكبرى للبادرات كانت رفيعة خضراء اللون مع قابليتها الشديدة للتشقق طوليا . وكان ضمن هذه المجموعة كميات من الأنواع الجافة نوعا ما والوانها متفارقة من الأخضر المشوب بالصفر إلى الوردى والأزرق إلى الأرجواني . وتبين أن ٧٣ ٪ من البادرات يصاب بعدوى تخطط الأوراق الأصفر أصابة شديدة ويتوقع قلة السكر في هذه العموم بسبب وجود دم من نوع " Kassoor " به .

( ٢ ) نبت متفرقا وأعطى سلسلة من القصب الرفيع الرائد ولونه أخضر مائل إلى الأصفر وله ميل شديد بوجه عام لتكون جذور عرضية وافرغ مبكرة النضج قبل أوانها وقد أصيب ٧١ ٪ منها بشدة بمرض تخطط الأوراق الأصفر .

( ٣ ) أحدث نباتا متفرقا وحوال ٢٥ ٪ من قصبه مشابه من جميع الوجوه لقصب المجموعة رقم ٢ المذكورة سابقا والباقي عيادته غليظة فصيصة ما بين العقل وضعيفة التفريع وله ما للنوع السابق من الميل لتكون أفرع هوائية (Lalas) وجذور عرضية . وكماها أصيبت بشدة بمرض تخطط الأوراق الأصفر وهو الذي يحتمل حدوثه بسبب الدم الضعيف بوجه عام .

( ٤ ) كان في أبنائه أحسن من المجموعتين السالنتين وشكل البادرات فيه كثير الشبه بتلك التي في المجموعة رقم ٣ المبينة أعلاه . وظهرت الإصابة بالتخطط بشكل واضح في ٩٠ ٪ منها .

( ٥ ) نظرا لوجود دم الـ Kassoor من كلا الأبوين فإنه ينتظر إنتاج قصب قيمة السكر في منخفضة وتلك هي الحالة التي انتهينا إليها . أما الأبنات فكان مشابها لما في المجموعة رقم ٤ . ومعظم البادرات كان أخضر اللون مصفرا رفيعا قصيرا ما بين العقل مع ميله لتكون

أفوخ هوائية (Lulas) وجذور عرضية . ولكن حوالى ٢٠٪ تماما كانت مشابهة في الشكل لـ Kasser وظهرت الاصابة بمرض تخطط الأوراق الأصفر بشدة في ٤٠٪ منه .

(٦) كان الانبات في هذه المجموعة متفرقا أكثر منه في المجموعتين السالفتين وأنتج في الغالب قصبا أصفر وأخضر وسنكه جيد ولكن عقده الداخلي (ماين العقل) قصيرة وهو متمايل في العادة وعلى العموم يميل الى الرقاد على الأرض بالرغم من أن أكثره يدل على عوق في النمو فقد يعزى الى شدة اصابته بالتخطط بنسبة ١٠٠٪ وقد كانت الأفوخ الهوائية كثيرة في هذه المجموعة .

#### بإدارات جزيره ماوريشس (Mauritius Seedlings)

هذه الأنواع البزرية التي تبشر بمستقبل حسن إن هي إلا سلالة نتجنا فالح خلوط رقم ٧ وهو هجين بين (Uba Marot و P.o. j 2878) وقد حضره لنا المستر لويس بايسال (M. Louis Baissac) الخبير الفني بمصلحة الزراعة بجزيرة ماوريشس (Mauritius) في شهر أغسطس سنة ١٩٣٢ وقد استغرق وصول البذرة ستة أسابيع في الطريق وقد يعزى الانبات القليل الذي حصل عليه الى ذلك . ومن وقت الانبات أظهرت هذه البادرات قوة في النمو وتساوى في الحجم . واحتفظت بهذه الخواص في الحقل في كلا محصول السنتين الأولى والثانية . وقد امتاز بعنق المجموعة الجذرية وبكامل نمو القمة والانبات في هذه المجموعات شبيه بأنبات النوع (P.o.j 2725) فإن الأفوخ تسبب من الأرض على زاوية تبلغ حوالى ٤٥ درجة وتعطى البات شكل القصب الرافد على الأرض رقادا شديدا ولكن بعد أربعة شهور أو خمسة تستقيم العيدان وتصبح عمودية جدا ومعظم القصب يقارب في لونه لون أصل الأم فيتجى فيه القوط (المحور المتسع) وقد يظهر في البعض منها تنوعات طويلة جدا رفيعة على شكل السنان . وامتاز حوالى نصف البادرات فيه بخصائص الاغمد الورقية الشائكة التي تظهر في النوع (P.o.j. 2878) ولم يستبعد منها خلاف صنف واحد وذلك نظرا الى قابليته لمراض تخطط الأوراق الأصفر الذي يتفشى كثيرا في النوع (P.o. j 2878) في مصر .

وقد اختصرت هذه المجموعة بالاختبار حتى بلغت ثمانية أنواع (B-9) إلى (B-16) وهي فضلا عن نتائجها المرضي وصفات نموها الحسنة ومقاومتها للأمراض وغيرها فقد بلغ

متوسط المواد الصلبة لخمس اختبارات بواسطة الجهاز اليدوي لقياس المواد الصلبة فوق ١٦٪ ثلاثة اختبارات منها كانت على قصب أول سنة ، واثنان على قصب السنة الثانية (الخامسة الأولى) . وفي شهر مارس أرسلت كميات كافية من القصب البذرة لكل من هذه الأنواع الى المستر "Roche" بجمع حمادى للاختبار التجارى .

#### بإدارات پورتو ريكو سنة ١٩٣٣ Puerto Rico Seedlings

في أول يناير سنة ١٩٣٣ أرسل البنا عالم الوراثة ت . برجر Thos Berger بمحطة التجارب الجزائرية بيورتو ريكو خمسة أنواع من الازهارات المخصصة من كل من الهجين الأتية :

رقم المحطوط	الأنى	الأصل	الذكر
٨	P.o. j. 2304	—	S.C. 12 (4)
٩	2725	—	٥
١٠	2878	—	المقعة تلقيجا مكشوف
١١	Coinlatore 281	—	٦

واستعملنا بواسطة ترتيبات المراسلات الجيدة أن نزرع البذرة بعد ثمنها بشهر واحد . وأمكنا الحصول على نبت ثمننا من صناديق خلوط رقم ٨ بنحو ثلاثة أضعاف البادرات التي نتجت من رقم ٩ . أما المجموعة رقم ٨ فكانت أقوى في طاهرها من رقم ٩ المشار اليه هنا . وقد نبتت بذرة النوع P.o.j 2878 الملقحة تلقيجا مكشوف متباعدة تباعدا كبيرا وكان مظهر البادرات غاية في الضعف وقد نمت كلها ببسطة بيد أن بذرة النوع Co 281 الملقح تلقيجا مكشوف لم تنتج إلا بإدارة واحدة حسنة قريبة الشبه من الأصل .

وقد تبين من قصب المجموعة رقم ٨ حال وجودها في الحقل أنها مجموعة متباينة من وجهة النمو ومن وجهة نسب احتوائها على السكر ولكنها تتفق كلها في لونها الأخضر الخفيف وحوالى ٢٥٪ منها يشبه تمام الشبه النوع P.o.j 2725 وقليل منها يشبه الأصل الذكر . وقل عددها في زراعات سنة ١٩٣٥ حيث اتخبط منها ما لا يكاد يبلغ مائة صنف .

## بادات سنة ١٩٣٤

بملاحظة نمو عدد محدود من الهجن والأصول في ظروف البيئة المصرية استطعنا بعد تجربة عامين أن نتوسع في العمل بشكل واضح في سنة ١٩٣٤ وأن نطلب من زملائنا ههنا أكثر شهرة ولما لم يكن هناك وقت كاف لإجراء ملاحظات تفصيلية في الحقل عن تلك البادات فإن معظم المعلومات المحدودة الآتية تتصل بالانبات وشكل البادات الصغيرة في الصناديق والأصص .

### بادات داميرا (Damerera Seedlings)

تجارب الهجن رقم ١٦ و ١٧ تتخذ في سلالة من الازهارات الملقحة تلقيا ذاتيا من صنف دياموند ١٠ (Diamond 10) ودياموند ٦٣٥ (Diamond 625) والتي تفضل بارسالها اليها جناب المستر (Sidney) Dash مدير الزراعة في غيانا البريطانية فوصلت اليها في مستهل العام بعد أن استغرقت في الانتقالات ستة أسابيع. وقد أنتجت بذرة دياموند نباتا قويا جدا فاستطعنا أن نزرع منها في الأصص ألف بادرة . ولكنها لما كانت كبادات دياموند ١٠ الملقحة تلقيا ذاتيا في غيانا البريطانية فانه ثبت أنها ضعيفة النمو بدرجة يرقى لها حتى أنه مات منها ٧١.٥٪ في نهاية شهر أبريل وما تبقى من البادات كان مظهره في مستوى الضعف أما المائة والثلاثين بادرة التي أمكن زرعها في الحقل فقد نمت في الأرض نموا بطيئا حتى أننا لم نستطع زرعها إلا في نهاية شهر يونيه. والقليل من بادرات (١٠٢٠) التي زرعت في الحقل في النهاية ساء نموها جدا ولن يستمر في تجربتها .

### بادات باربادوس (Barbados Seedlings)

هذه الهجن قد عني باجرائها المستر ماكشوش (Mc. Intosh) الاختصاصي في علم الوراثة بمصلحة الزراعة بباربادوس ووصلتنا على جناح السرعة في منتصف شهر يناير إذا أنها لم تستغرق أكثر من ستة وعشرين يوما . وفي أبعاد الهجن القديم الانبات المسمى (B.A 11569 = 13218) فقد وردت اليها الهجن الآتية :

وكذلك كان قصب المجموعة رقم ٩ ذا لون أخضر خفيف فيما عدا نوع واحد لا يربى منه وهو رفيع وردى اللون ويحتوى على نسبة منخفضة من السكر . ولنسبة كبيرة من هذه السلالات أقرب في الشبه الى الأب الذكر عن الأب الأنثى وقد احتفظ لزراعة سنة ١٩٣٥ بثلاثة وعشرين نوعا من البادات فقط وقصب المجموعة رقم ١٠ فيما عدا صنف واحد أخضر مشوب بأصفر ، له اللون الرمادى الأخضر الذى هو من مميزات النوع (4) S.C 12 واحد عشر منها اعتبرت صالحة للاختبار لسنة ١٩٣٥

### بادات هاواي سنة ١٩٣٣ - Hawaiian Seedlings

نحتت هذه البذرة في اليوم العاشر من فبراير سنة ١٩٣٣ ووصلت اليها بعد هذا التاريخ شهرين ورتب على ذلك المخطاط الانبات الى حد بعيد جدا وفيما عدا المحلول (H. 109 x P.O. j 2878) الذى لم ينبت فط أرسلت اليها الهجن الآتية :

رقم المحلول	الأنثى	الأصل	الذكر
١٢	62 C. 148	---	Molokai 1091 (1/2 S. robustum blood)
١٣	Mol. 1694	---	27 C. 445 (yel Caledonia x H. 109)
١٤	28-1681	---	32-7005 (1/2 Robustum blood)
١٥	28-1730	---	32-9099 (1/2 Robustum blood)

وقد كان من الفشل البين أن نحصلنا على بادرات قليلة من هذه الهجن المسماة (S. robustum) بينا أن تلك الأنواع التي بقيت لم يكن ظاهرها مما يلتفت الأنظار ولم تكن محتوية على نسبة جيدة من السكر . وفي سنة ١٩٣٥ ربيت بادرة واحدة فقط من كل من المجموعتين رقم ١٢ و ١٤ وكان الأول أرجوانى الشكل سميكا ذا عقل طويلة ولكنه كان ضعيفا في ظاهره من حيث التفريع في حين أن الثانى كان رفيقا نحى اللون أو بالأحرى شبيها بالأنوع (C.O. ٢٨١) .

رقم المخلوط	الأنى	الأصل	المذكر
٢٧	H.Q. 400	—	S. C. 12 (4)
٢٨	(بادرة من 251 x Chenbon N. 28)	—	Q. C. 3
٢٩	N. G. 10	—	P. G. J 2040

بينما كان الانبات غزيراً جداً في صناديق المخلوط رقم ٢٨ في مدى ستة أيام ومعتدلاً في صناديق المخلوط رقم ٢٧ ومتفرقاً للغاية خفيفاً في صناديق المخلوط رقم ٢٩ فإن جميع هذه البادرات كانت شاذة ولا سيما في المخلوط رقم ٢٨ . عند ابتداء الانبات كانت الصناديق غير مستوية بحالة غير عادية وكانت الأنشطة بارزة من التربة شائكة قليلاً صفراء اللون وبها نتوءات مبيضة ولم ينم واحد من النباتات نمواً عادياً وكانت الأوراق الصغيرة المتساقطة ذات بقع حمراء اصفحت فيما بعد سوداء عند ما أصيبت البادرات الضعيفة بالموت . ولم يتم إلا بأربعين بادرة من هذه المجموعة وجدت جذيرة بجذرتها في الحقل .

### بادرات بورتوريكو :

قد وصل زغب هذه المجموعة الى الجزيرة في منتصف شهر فبراير بعد أن استغرق في الطريق ستة أسابيع وقد احتوت على الهجن الآتية :

رقم المخلوط	الأنى	الأصل	المذكر
٣٠	P.o. J 2364	E.K. 28	( هذه من نفس الأصل مثل ( P.o. J 2878 ) )
٣١	M (nyaguez) 28	لقت تلفيحاً مكشوفاً	—
٣٢	P.o. J 2040	»	—
٣٣	P.R. 803	»	( حسب اتجاه الرياح 2878 P.o. J )

رقم المخلوط	الأنى	الأصل	المذكر
١٨	Ba 11509	—	B. H. 10 (12)
١٩	"	—	B. 417
٢٠	"	—	S.C. 12 (4)
٢١	"	—	D. 1136
٢٢	"	—	B. 3265
٢٣	B 3172	—	B. 301
٢٤	B 3238	—	B. 301
٢٥	M. D. 11	—	B. H. 10 (12)
٢٦	Tobago	—	S.C. 12 (4)

وقد حصلنا على ثبوت متميز من المجموعات كلها فيما عدا رقم ١٩ ( بادرتان فقط شتلنا في الأصص من صندوق هذا الرقم ولم تنمو قط النمو الكافي الذي يبرر نقلهما إلى الحقل ) ورقم ٢٥ ورقم ٣٦ . ومع ذلك فإن المخلوطين الأخيرين أنتجا إلى حد بعيد أحسن البادرات قوة وانتظاماً في النمو وهي الناتجة من مجموعة المخلوط رقم ٣٥ وذلك لكونها بارزة في هذا الصدد وقد كانت أول المجموعات التي زرعت في شهر أ. يل . أما بادرات رقم ١٨ و ٢٣ فقد ظهر أن بادراتها ضعيفة وبطيئة النمو ومائلاتها في صفاتها تماماً المجموعة الناتجة من المخلوط رقم ٢٤ . وكانت المجموعات ٣٠ و ٣١ أحسن نمواً من غير شك أما بمجموعة المخلوط رقم ٣٣ فكانت أقل نمواً من المجموعتين رقم ٢٠ و ٢١ .

### البادرات الأولى من كوينزلاند (Queensland Seedlings)

كان الغرض الأول من الحصول على هذه المجموعة ملاحظة انبات وحالة بذور الهجن التي جهزت قبل أن تزرعها في الجزيرة ( في منتصف فبراير ) لمدة سبعة شهور . وإليك بيان هذه الهجن :

المخلوط رقم ٣٤ مع كونها كثيرة العدد كانت الى حد بعيد ابطأ الأنواع في النمو . وكان انبات المخلوط رقم ٣٥ متفرقا جدا بيد أن المخلوط رقم ٣٧ لم ينتج سوى عشر نباتات لزراعتها في الحقل .

### بادرات كونيولاند الثانية :

أرسل اليها المرءى النباتى ادوين . ج . بارك (Edwin J. Barke) بمكتب محطات تجارب السكر بكونيولاند هذه الزغب المهجنة الطازجة في العاشر من شهر يولييه ووصلت الى الجينة وزرعت في الرابع من شهر سبتمبر وكانت الهجين كما يأتى :

رقم المخلوط	الأب	الأصل	التذكر	الأم
٣٨	P.O. J 2725	—	S.C. 12 (4)	حسن
٣٩	"	—	C. 52	ضعيف
٤٠	P.O. J 2728	—	P.O. J 2910	حسن
٤١	P.O. J 2728	—	S.W. 498	"
٤٢	G. 200	—	Q. 1098	متوسط
٤٣	S.J. 4	—	C.O. 200	حسن جدا

بدأ المخلوط رقم ٤١ بنبت قويا بعد أربعة أيام فقط أما المخلوطات رقم ٣٨ و ٤٠ و ٣٩ فانها استغرقت في الانبات خمسة أيام والباقي بعد أربعة أيام كذلك ولكن كان بينها متفرقا أكثر من نبت التجربة رقم ٤١ . وكان المخلوطان رقم ٤١ و ٤٠ أحسن الأنواع نموا بعد ثلاثة أسابيع وتبعهما في ذلك المخلوط رقم ٣٨ وكانت نباتات المخلوط رقم ٤٢ ضعيفة في ظاهرها بطيئة في نموها بيد أن النباتات رقم ٤٣ كانت أكفها نباتا وأظهرت ضعفا في نموها مشابهة في مظهرها للنمو المبكر الذى حدث في المخلوط رقم ٣٨ وقد تحول لون البادرات الصغيرة في الوسط الى اللون الأرجوانى وكانت تموت تدريجيا في أغلب الحالات وقد استئصلت أشد

انبت القطع كلها انباتا متفرقا بعد ستة أيام ولكنه كان قويا . وأما المخلوط رقم ٣٠ فقد أعطى على الأخص مجموعة من البادرات المتساوية الحجم الجميلة المنظر ومثلها المخلوط رقم ٣١ و ٣٢ و ٣٣ مع فرق طفيف بينها .

### بادرات هاواى :

أرسل اليها هذه البذرة المستر (C. G. Lemox) الأخصائى المساعد في علم الوراثة بمحطة التجارب في هاواى في السابع من شهر مارس فوصلتنا في ٤ أبريل وهو أقصر وقت استغرقه شحن هاواى . فقسامنا الهجين الآتية وهى من أصول مركبة ومن الصعب الوصول إلى أصلها وذلك بخلاف الهجين (D. 625 x 0258) الذى لم ينبت وكتب اليها ليموكس يقول أنه لا ينتظر منه إلا نبت قليل أو معدوم . وقد أرسل اليها المستر لينوكس تقديرا لعدد النبت الذى ينتظر من كل مجموعة من البذرة الطازجة أو أنها نبتت في هاواى . ويسرنا أن نسجل هنا أن الانبات في الجينة قد تتبع بالضبط تلك التقديرات النظرية :

رقم البذرة	الأب	الأصل	التذكر
٣٤	31 429	—	29 4050 (W.S. 990 - H. 156)
٣٥	P.O. J 2878	—	32 7403 (D. 1135 - Mohakar 1042)
٣٦	P.O. J 2878	—	29 4650
٣٧	H. 106	—	P.O. J 2878 (منبت في سنة ١٩٣٣)

ابتدأ الانبات بعد خمسة أيام تماما . وكان حسنا بوجه خاص في المخلوط رقم ٣٤ وتبعها المخلوط رقم ٣٦ الذى ولو أنه لم يعط انباتا الا بنسبة الثلث المتبعة انباتا حسنا فهو الذى أنتج أكثر البادرات قوة في تلك المجموعة مع سرعة في النمو . ومن ناحية أخرى فان بادرات

البادرات إصابة لإفساح مجال النمو للقوى منها . وقد زرع منها في النهاية حوالى المسائة في أصص في الشهر الأخير من أكتوبر .

وفي منتصف الشتاء كانت نباتات المخلوط رقم ٤١ أحسنها مظهرًا وأكثرها انتظامًا وشدة في النمو وتبعها مباشرة المخلوط رقم ٤٢ . وكانت المجموعات الأخرى كلها بطيئة النمو وقد زرعت شتلات كويتلاند هذه في ٢٠ مارس سنة ١٩٣٥

### بادرات سنة ١٩٣٥


تسلمنا في شهر يناير ست مجموعات من الهجن الواردة من بورتوريكو وكانت أعدت أثناء زيارتي لتلك الجهة في أكتوبر الماضي . والمجموعات الأربع الأولى تفضل بإرسالها اليينا الدكتور هو لجر جوهانسن (Dr. Holger Johansen) من أصناف بساين مصلحة الزراعة بالولايات المتحدة (والجمعية الدولية للاخصائين في قصب السكر) على مقربة من غواياما (Guayama) وأما المجموعتان الباقيتان فقد أرسلهما اليينا فيلده ست ما كوني (Field Supt. Mr. Connie) من محطة التجارب التي تديرها شركة سكر فاجاردو (Fajardo Sugar Co) بالساحل الشرقى المطر . وفيما يلي بيان بالهجن التي حصلنا عليها :

رقم المجموعة	تأخرى	الأصل	الدكر
٤٤	P.O. J 979	( متاهة للبادرات موريشس التي لدينا )	Uba Marot
٤٥	P.O. 281	—	U. S 1694
٤٦	P.O. 281	—	C.P 1165
٤٧	P.O. J 2725	—	P.O. J 234
٤٨	P.R. 897	—	E.C. 966
٤٩	P.O. J 2725	—	EC. 916

وقد كانت اللاتبات في صناديق المخلوط رقم ٤٥ اكتف ما رأينا من قبل إذ كانت الصناديق في حوالى عشرة أيام كأنها مزروعة بمحاشيش الجويدار . وكذلك أعطى المخلوط رقم ٤٦

نباتًا جيدًا بدرجة واضحة بينما كان نبت التجربة رقم ٤٧ ضعيفًا وكان متفرقًا في المخلوط رقم ٤٤ و ٤٩ وبلغ تفوق النباتات غايته في المخلوط رقم ٤٨ وكانت أوراق نباتات المخلوط رقم ٤٥ رفيعة تشبه الريش بينما كانت أوراق التجربة رقم ٤٦ أعرض وأقرب شها بالذكر كما كان الحال في البادرات القليلة الناتجة من التجربة رقم ٤٩

ولقد مكثنا حتى اليوم ندرس السلالات الناتجة في تجارب تهجين يكاد يبلغ عددها خمسين تجربة والتي تمثل جميع الأصناف المشهورة من قصب السكر التجارى تقريبًا وكذلك الخمسة الأنواع المعروفة من جلس (Saccharum) وطيبى أن معظم هذا العمل مبدئى للغاية إذ يجب علينا أن نركز جهودنا في تلك الهجن التي يرجى منها خير كثير في ظروفنا . وقد كانت الفترة التي أجريت فيها هذه الأبحاث كافية لتكوين نتائج أولية للهجن التي سيجرى عليها البحث طويلا . ومع ذلك فالتا استطعنا أن نستبعد بعض الهجن بتانا لنرم سياسة الغرض منها مضاعفة أبحاثنا في الأنواع الأخرى حيث أننا لو استطعنا أن نحفظ بمعاونة غيرنا ممن يشتغلون بتربية النباتات فان نتائج السنوات القليلة المقبلة ستوفقنا على كثير من المعلومات الغزيرة الدقيقة وبعبارة أخرى كان أقصى ما يرام بعملنا حتى اليوم وضع أسس وطيدة نستطيع أن نشيد عليها بناء البحث الاقتصادى العظيم .



نمو بادرات قصب البذرة

١٩٥٠ - ١٩٥١



قطع التجربة الشطرنجية لاختبار الأصناف

١٩٥٠ - ١٩٥١

المعهد القومي للبحوث الزراعية  
١٩٥٠ - ١٩٥١ - ١٩٥٢




قصب غير مرغوب فيه لشكل أزراره ( عيونه ) النابتة المبهمة الكمر





قصب البذرة E-8



وزارة الزراعة

قسم تربية النباتات

# النشرة الفنية

رقم ١٦٤

مسافات زرع القصب في مصر والأقطار الأخرى

تأليف

المستر آرثر . ه . روزنفيلد

المدير الفني في القصب

ترجمها عن الانجليزية

عبد الرؤف محمد طنطاوى افندى

المترجم بقسم الارشاد الزراعى

طُبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة ، سنة ١٩٣٦

تباع مطبوعات الحكومة بصاله البيع بوزارة المالية . أما استكاثات  
الخاصة بهذه المطبوعات فيرسل رأسا الى قسم النشر بالمطبعة الأميرية .

الثمن ٥٠ مليا

## المهرس

رقم الصفحة

١	مقدمة
٢	الزراعة المتأخرة وفلة السكر
٥	نظرية "الضوء والهواء" في المسافات
١٠	تجارب بغير السكر
١٢	تجارب مسافات القصب في الأقطار الأخرى
١٧	تقنية الحشائش وعرق الأرض
٢٢	ازدحام السكان وخص الأيدي العاملة
٢٥	تجارب المسافات في مصر
٢٦	تجارب المطاوعة واملوى
٣١	تجارب كرم امير
٤٣	النهاية
٤٣	الملحمة
٤٥	المصادر

## مسافات زرع القصب في مصر والأقطار الأخرى

لابد وأن يكون لكل نوع من النباتات ولكل معدنة من التربة حد أقصى ، للغة الزراعة التي يحتمل الحصول عليها وذلك من الوجهة النظرية وبعبارة أخرى لكل نوع من الأرض تحت الظروف الجوية المختلفة طاقة خاصة على إنتاج حد أقصى من قصب السكر الجليد مثلا ، وهذا الحد لا يمكن الحصول عليه إلا إذا توافرت الظروف المثل من وجهة الغذاء والرطوبة والأمصال الجوية والزراعة الصحيحة . ومن الغايبي أيضا الاتباع الحد الأقصى المذكور إلا باتباع الطرق المثل في تحديد المسافات التي تزرع عليها النباتات لكي يتمكن كل عود من بلوغ غايته من النمو ولكي تفسح المجال لكل وحدة من الأرض لأن تنتج أقصى عدد ممكن من القصب الجليد النحر . ولهذا كان من البديهي أن الضيق الشديد في المسافات التي يزرع عليها القصب عندئذ لابد وأن ينجم عنه وجود عدد كبير من العبدان الغير الطبيعية النمو في حين أن الإفراط في توسيع المسافات يربح معه إنتاج عبدان من القصب المتأخر ولكنها تكون قليلة العدد مما لا يتأى معه إنتاج المقطوعة التي تنتج من النباتات ذات النمو الطبيعي والتي تزرع بالطريقة المثل من حيث عددها من الوجهة النظرية . ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن ذلك مما يساءر على زيادة نمو الأفراخ باضطراب لدرجة كبيرة وينجم عن ذلك صعوبة في حصاد القصب إذا ما بلغ نضجا متوسطا .

وفي رسالة أصدرها المؤلف ( ٩٢ ) منذ عشر سنوات بعنوان غريب نوعا " ما حصر القصب ذى العشرة الشهور ؟ " أيد فيها أن حصاد جزء كبير من الأفراخ المتأخرة في المناطق المعتدلة مهما كانت جيدة النمو من الوجهة الطبيعية ، فإن الحصاد فيها من حيث تأخره في معدل السكر الموجود في القصب وفي الفقاوة تعادل ما يحدث عند ما يزرع القصب المتأخر في غير أوانه . وقد وضع هذا الأمر الأخير في رسالة حديثه للأولف عنوانها " أوفق المواعيد لزراعة القصب في مصر ص ( ١٠١ ) " .

ومن الضروري جدا ، في الأقطار المعتدلة كصربولو وريانا وتوكومان ، حيث لا يزيد موسم الزرع على ثمانية أو تسعة أشهر ، أن يتم نضج معظم المحصول المحصود تمامًا كما لو أتيج له فصل نمو يكفى له النضج نضجا تاما . ولهذا السبب كانت الأصناف المبرقة الانبات الكثيرة التفريخ ضرورية وذلك مثل القصب المزروع من البزرة والذي يعلو الجذور بين

## الجدول رقم ١

### إحصاءات الإنبات

La. Striped.	P.O.J. 234	التاريخ
٦٦	١٩٦	١٨ سبتمبر
١٥٠	٣٣١	٢٥ »
١٨٦	٤٣٤	٢ أكتوبر
٢١٠	٤٩٦	٩ »
٢٢٤	٥٤٣	١٦ »
٢٧٠	٦١٨	٢٣ »
٣٠٤	٧٠١	٣٠ »
٣١٢	٨٥٦	٦ نوفمبر
٥٦٤	١٣١٥	محصول ٦ سبتمبر
٤٤	٣٥	قصب عمره أقل من ٨ شهور

ونظرا إلى أن شتاء ذلك العام الذي أخذت فيه هذه الإحصاءات كان شديداً على غير العادة فقد شوهد شيء من الإنبات والنمو في شهر أغسطس وهو ما لا يحدث في توكوماً ونظراً إلى أن النمو وقف فعلاً في أوائل يونيو ، ففى الإمكان القول بأن هذا القصب استغرق في نموه أطول مدة في توكوماً وهي ما تقرب من عشرة شهور ومع ذلك يتضح لنا من مقابلة أرقام المحاصيل بالإحصاء المدون في ٦ نوفمبر أن أكثر من ثلث القصب P.O.J. المقطوع يقل عمره عن ثمانية شهور من النمو الحقيقي ، في حين أن ما يتوفى من نصف القصب الذي قصب "لويزيانا المخطط" لم يكن قد بلغ طور النضج .

ومن المزايا الظاهرة لحقول القصب المزروع على مسافات ضيقة في بورتوريكو التي تتفوق بها على ما جاورها من حقول كوبا حيث يبلغ معدل المسافات فيها الضعف أو أكثر أن القصب يتضام سريعاً جداً وينتج عدداً وافراً من عيدان الخلفة ( الفسائل ) من محصول السنة الأولى ( البكر ) إلى أن تتحلل الخوط بالعيدان ويؤتى على أجيال الخلفة المطردة التي تخرجها دائماً العيدان القرية إذا كانت المسافات متسعة وهذه الميزة تزيد بطبيعة الحال ، من

الخطوط بسرعة وهو ما يسميه الأستاذ إيرل (Earle 33) الجزء الواقع تحت الشمس الذي يشغل زراعة قصب متساوى الطول ومبكر جداً في الموسم القصير نظراً إلى أن الأفراخ المتأخرة من القصب لا يمكن أن تصل محتويات السكر فيها أو النقاوة إلى الدرجة الصناعية المطلوبة وهي وإن أنها تزيد في الوزن ولكنها ذات تأثير ضار جداً على نقاوة محصول القصب عموماً في وقت الحصاد . ولا يشك المؤلف في أن العادة المتبعة في الأفطار المذكورة آتفا ، سواء بقصد أو بغير قصد ، من حيث جعل الزراعة فيها أكثر كثافة من المناطق المدارية ذات المواسم الزراعية الطبيعية قد نشأت عن ضرورة الحصول على الجزء الأكبر من القصب وقت الحصاد مثلاً يكون عند بلوغه الحد الأقصى من العمر بقدر المستطاع .

ولاشك أيضاً في أن نضج المحصول يتساوى في الأفطار المدارية ويصير مشابهاً تماماً المحصول كوبا أو بورتوريكو مثلاً الذي يقطع بعد ستة عشر أو ثمانية عشر شهراً وذلك بدلاً من الحصول على محاصيل تختلف أعمارها من العشرة والأشئ عشر والأربعة عشر شهراً ، وإن السكر الذي يحتوي عليه القصب إذ ذلك ودرجة نقاوته تكون غاية في الجودة لدرجة عظيمة .

### الزراعة المتأخرة وغلة السكر

في تجارب الأصناف على محصول القصب قد قام المؤلف بعمل تعدادات كثيرة للنباتات الناتجة من جملة أصناف في ستين عذة ، وإطالماً تأثر بما ينتج في المحصول من عيدان القصب التي لم يتم نضجها في بعض الأصناف وترسل مع المحصول إلى المصنع ، ما ينتج عنه بعض نقص في متوسط نسبة السكر المحتمل الحصول عليها من المحصول التام النضج .

ونظراً إلى أن الصنف الشائعة زراعته في مصر هو (P.O.J. 105) المعروف خطأ باسم "الأمريكي" فإن بعض الملاحظات التي أبداه المؤلف (٨٨) منذ بضع سنين على صف قريب منه يلاحظ عليه اسم (P.O.J. 234) عند مقارنته بالصنف الذي المخطط (قصب لويزيانا المخطط) بخطة تجارب السكر "توكوماً" بالجزيرية القضية قد يكون لها علاقة بفهم الموضوع وهذا القصب زرع في شهر يوليو مع العلم بأن الفصول في جنوب خط الاستواء على عكس فصولنا تماماً إذ أن شهر يوليو في الأرجنتين يوافق شهر يناير في مصر وبدئى حوالى منتصف سبتمبر أى بعد شهرين من الزراعة في أخذ إحصاء أسبوعي لعدد النباتات المختلفة التي ظهرت فوق سطح الأرض في خط واحد طوله مائة متر حتى حل موعد نكث الخلفة وأصبح الإحصاء معتدلاً . والجدول الآتى يبين نتائج هذه الإحصاءات في التواريخ المختلفة لظهور الخلفة فوق سطح الأرض في كل خط طوله مائة متر والمسافة بين الخطوط تبلغ مترين .

وإذا قارنا تحليلات القصب P.O.F. 234 المدينة بالجدول رقم ٢ بالأرقام الواردة بالجدول رقم ١ مع ذكر نسبة عيدات القصب المختلفة الأعمار المذكورة سابقا وهي التي توجد عادة في حقل من القصب ، لسجل علينا استعراض أثر نقص أو زيادة هذه الدبة ولا مشاحة أننا لو استطلعنا زيادة متوسط عمر القصب المقطوع من أى حقل بأية وسيلة كانت ، لحصلنا بذلك على زيادة في متوسط نسبة السكر ، وعلى العكس من ذلك إذا قل متوسط العمر هذا نتيجة لخلفة المتزايدة خلال الصيف فإننا لانتجد طريقة يجب اتباعها ، في الأفطار شبه الاستوائية ، لكي نلحق ما يوازي هذا الانخفاض في متوسط كمية السكر التي يحتوي عليها مثل هذا القصب .

### نظرية الضوء والهواء في المسافات

إن المدافعين عن فكرة توسيع مسافات القصب توسعوا كثيرا كما يتجلى في طريقة زاياس وأبرف Zays and Abrev في كوا حيث كان القصب يزرع في حفر تبعد عن بعضها البعض من تسعة إلى أثنى عشر قدما قد تسكرا بنظرية اعتماد القصب على قدر كبير من الضوء والهواء وهي نفس الفكرة التي دفعت نيولاندز (N1) على ما يظهر في سنة ١٨٦٩ إلى أن يكتب ما يأتي في رسالته المطبوعة التي وضعها إذ ذاك عن زراعة قصب السكر : — "إن عملية التقليم المستمر مهمة جدا إذ أنها توفر للنبات الضوء والهواء الكثيرين وهما مما لا غنى عنهما في إنتاج قصب ذي محصول وفير" .

وترك هذه العملية ، أى تقليم الأوراق السفلى للقصب المزروع تفلها متعاقبا وجودا كان شائعا في الأفطار التي تفوقت في إنتاج السكر كهاوى وبرتوريكو وكوبولاند ، مما يدل دلالة واضحة على إهمال التوصيات الخاصة بزراعة القصب على مسافات بعيدة . وقد أقامت إحدى محطات التجارب في تلك الأفطار الدليل على أن عدم فائدة هذه الطريقة ليست قاصرة على توفير الهواء والضوء للعيان والأوراق السفلى للنبات الذي ليس في حاجة إلى التقدير الكبير من هذين العنصرين بل ترجع إلى الأضرار الحقيقية التي تسببها هذه العملية فضلا عن الخسائر المالية التي تجرهما (١٠) .

ويجب ألا يغرب عن بالنا قط أن عيادات القصب ليست إلا مستودعات للنباتات حيث يخزن المحصول الذي تفرزه الأوراق بعيلاتها الكيميائية وليس ثمة أى تعريض لهذه

(١٠) نشر 11 "Bonnie" في سنة ١٨٨٨ بعضا من نتائج التجارب التي تدل على أنه كلما كان الجريد أصعب في قطع الأوراق الثقالة ثقلا عبقيا ، في أوربيس "Mauritius" زادت مخزونات السكر ما يقرب من درجة واحدة بيد أنه كان يلاحظ نقصا كبيرا في السكر أيضا الجيد إلى أدلة عدد كبير من الأوراق المخضرة وهو ما كان يحدث كثير إذا ما قورنت هذه بقطع التجارب التي لم تقم

نضج القصب أكثر مما لو وجدت أجيال عديدة من الخلفة تجمع مع القصب الناضج . ويمكن استنتاج ما لهذه الخلفة من تأثير ضار في المعصرة في نظر أهالي جزائر الهند الغربية من العبارة الآتية الحديثة المعهد جدا والتي أدلى بها س . ج سانت (S.J. Saint) الكيميائى الزراعى لمصلحة العلوم والزراعة بباربادوس :

"ظهرت أفرانخ قليلة في شهر أكتوبر عام ١٩٣٣ ويرجح أنها ساعدت على سرعة النضج وارتفاع كمية السكر في القصب الذى لوحظ في أثناء موسم المحصول" .

وقد أجرى كروس Cross تحليلات ذات أهمية لعيان من نفس الحقل على فترات أسبوعية ابتداء من الوقت الذى بلغ القصب فيه عمر القصب العقر ثمانية شهور تقريبا . ويتبين من ذلك أهمية هذه التحليلات بالنسبة للقصب في أعمارهم المختلفة فضلا عما يكون له من أثر لا يمكن تعويضه عند حصاد القصب في الأطوار المختلفة التي يكون فيها ناقص النضج . وقد انتخب المؤلف التحليلات التي كانت تعمل كل أسبوعين على صنف القصب المعروف باسم P.O.F. 23 وذلك في الأعمار المدينة بالجدول رقم ٢ ، من بين أرقام كروس الكثيرة .

### جدول رقم ٢

انضاج صنف P.O.F. 234 في توكومان . (الخلفة الثالثة)

#### تحليلات المعصرة

نسبة السكر	نسبة المواد الصلبة	السكروز	الجلوكوز	الفاوة
٨	١٧.٢٠	١٤.٩٠	٠.٥٧	٨٧.٣٣
٨.٥	١٨.٣٨	١٦.١١	٠.٤٥	٨٧.٦٤
٩	١٨.٣٨	١٦.٣٢	٠.٢٩	٨٨.٢٤
٩.٥	١٨.٢٧	١٦.٥٩	٠.١٣	٩٠.٨٠
١٠	١٨.٧٥	١٧.١٧	٠.١٣	٩١.٥٧

(١٠) تجارب تحديد عيب السكر - الحلة الزراعية بباربادوس ، مجلد ٤ ، جزء ١ ، صفحة ٣ سنة ١٩٣٥

المستودعات للضوء والهواء بغير من تركيب المحصول المخزن فيها . ومقدار الضوء والهواء ، الذى يصيب السطح المعرض لفدان من القصب ، لا يتغير سواء زرع القصب على خطوط تبعد عن بعضها بمقدار قدمين أو في حفر على بعد ١٢ قدما ونظرا إلى أن العمليات اللازمة لتحويل الغذاء النباتي المستمد من الهواء والثرية في الأوراق ، إلى السكر الذى نسي إلى جنبه إنما تحدث معظمها في الأوراق الحديثة التى تكون في أعلى النبات ، فإنه يظهر أن لا موجب مطلقا للفتحات التى يستلزمها توفر الضوء والهواء في تلك الأجزاء من النبات والتي لا تحتاجها بمثل هذه الكثرة كما أنه لا موجب لتلك الحسائر المفقودة التى كانت تسببها عمليات التقليم من جراء إزالة أوراق لا تزال تقوم بعملها النباتي (تكوين السكر) .

وفي ثلاث مجموعات من التجارب التى بت فيها نهائيا والتي عملت في محطة تجارب زراع القصب في هاواي بأن إكارت (Eckart 37) بوضوح العيب والخسارة المالية التى تتجهم عن تقليم القصب في هاواي ووجد أن النسبة المئوية للسكر كانت أعلى في العصاره المأخوذة من القصب الغير المقلم وهو الذى أعطى محصولا في الحقل أعلى بكثير من القصب المقلم كما وأنه وجد أن عيذان القصب الميتة كانت عند الحصاد أكثر في الثاني منها في الأول . وبعبارة أخرى لم يقف التقليم عند حد عدم إفادة القصب بل إنه على العكس يضر به ضررا يلغا ومنذ نشرت تجارب إيكارت أقمع الزراع فعلا عن تقليم القصب في هاواي .

وقد أجرى كراولى (Crawley 17) عددا من تجارب تقليم القصب في محطة التجارب الجواترية في بورتوريكو في المدة ما بين سقتي ١٩١٢ و ١٩١٤ واستنتج منها أن التقليم يسبب " ضياعا في الوقت والمال " وفي نفس الوقت أقام جواتيكا سنترال (Cuanica Central) عدة تجارب في سهل سان جرمان (San Germain) حيث كان المؤلف إذ ذاك تقليم جميع القصب وذلك لكي يصل إلى نتيجة التقليم من وجهة السكر ودرجة القنوة . فوجد في كل من هذه التجارب أن العصاره المأخوذة من القصب الغير المقلم كانت أغنى في السكر وأثني من عصاره القصب المقلم . وقد ذكر ما يأتي في خطاب أصدرته الإدارة :

" لا نعتقد أن هناك ما يمكن الحصول عليها من تقليم القصب ونحن موقنون بأن القصب قد يصيبه ضرر بليغ من جراء تجريدته تجريدا أعمى من الأوراق الخضراء والأوراق ذات الأجزاء الميتة " . ومنذ بضع سنوات أصدرنا أمرا نافذا بوقف هذا الاجراء في جميع ممتلكاتنا وإلى اعتقد أننا لم نخسر شيئا بهذا التصرف .

\* بفر ديم (Dorn 23) أن أول سبب محقق في هذه العملية هو أن تعريض القصب لتأثير الهواء والضوء يعمل النصح وهو ينتج ما يأتي :

" تأثير الضباب شليل والضرر الذى يسببه العمال بمردهم في الحقول يفوق كل فائدة مرجوة وخصوصا إذا كانت الأوراق التى لم تحت تماما فان ذلك قد يبيى الزراعة للأصابة بالحشرات الفطرية " .

وعلى العكس من ذلك فإننا قد اقتصدنا من الفتحات السنوية ما يساوى ٢ جنيهه في المتوسط لكل فدان وهو ما كان يصرف على هذا العمل وقد كان في مجموعه يفوق ال ٣٠٠٠٠ جنيهه في المساحة التى تزرعها هذه الشركة والتي تبلغ حوالى ١٥٠٠٠ فدان .

وهذا الخطاب يدل على أن عملية " توفير الضوء والهواء " بتقليم القصب أفلع عنها في بورتوريكو أفلاعا عاما .

وهناك ناحية أخرى شقية في هذا الموضوع وهى أن أول احتياج لزراع القصب في كوينزلاند الذى كان وجهها ضد التمرغيع المسمى " استراليا البيضاء " الذى بحث بحثا عميقا ، كان الباعث عليه أن الأهال البيض في استراليا كانوا عاجزين عن العمل الماضئ الذى لا غنى عنه في تقليم القصب . ومع ذلك فقد وجد أن الافلاخ عن هذه العملية لم يقتصر على عدم الافلال من غلة الفدان في القصب والسكر بل وفر على منتجى السكر مبلغا كبيرا من المال كان ينقح حتى ذلك الحين على طريقة عقيمة ، زخرفية للغاية .

ونظرا إلى أن التقليم والإفراط في توسيع المسافات ببناء على نفس النظرية الأساسية التى يتصدها زيادة الاستفادة من الضوء والهواء فالظاهر أن اثبات ما لا تقليم من فائدة عكسية أثبتت أيضا عيب الإفراط في توسيع مسافات القصب . وعلى الرغم من ذلك فإننا نجد في سنة ١٩٣٤ أى بعد نشر نتائج كراولى (Crawley) ، بعشر سنوات أن كالفيو (Calvino 15) في كوايا يحمذ طريقه أبرو (abreu) الخاصة بزراعة القصب في حفر تبعد عن بعضها البعض بأثنى عشر قدما كما وأن هند (Hind 48) في الفلين كتب ما يأتي :

" إن طريقة زرع القصب في حفر تبعد عن بعضها البعض بعشرة أقدام توفر لخانة الناتجة قدرا أكبر من الضوء والهواء ، وما لا شك فيه أن هذه الطريقة تؤثر في درجات القنوة تأثيرا مفيدا " .

ولم يأت المستر هند (Hind) بأية معلومات مبنية على تجاربه أو تجارب غيره الأمر الذى يدل على أن هذا التعبير ليس إلا رأيا فقط ومع ذلك فإن التجارب التى أجريت في الولاية بمعرفة الدكتور ستايز (Stubb) وفي كوايا بمعرفة إيرل (Earle) والتجارب التى أجراها الباحث النابهي في الأفطار الأخرى قد أثبتت اثباتا قاطعا أن المسافات البعيدة وتوفير " ضوء " والهواء للقصب لا يشترط فيها بأى حال من الأحوال تحسين درجات القنوة أو كمية السكر في العصاره . وسوف نبحث بعضا من هذه التجارب في الصفحات التالية . ويمكن القول إن طريقة أبرو (Abreu) لا تخرج عن كونها طريقة زاياس ("Zoyas") القديمة بدون زيادة أو نقصان وهذه الأخيرة هى التى أثبت الأستاذ ف. س. إيرل (F.S. Earle) ، منذ ثلاثين عاما ، أنها لم تكن منتجة تماما من الوجهة العملية في كوايا حيث كانت إذ ذاك مرغوبة جدا

## جدول رقم ٣

### مقارنة الغلات والمحورة في القصب المزروع في جور وعلى خطوط

الطريقة	البيدان		الأبنان من القصب في الجور الواحد	تجارب العصابة		المسكن المستخرج من الحفار والكافور جرام
	الوزن بالجرام	الارتفاع	بركس	سكرور	درجة الزاوية في المساحة	المسكن المستخرج من الحفار والكافور جرام

P.O.J. 36 - ١

الحفر ...	٧٢٦	٤٣٠	١٨٢٤	١٦٨٣	١٣٥٤	٨٠٢٤٥	١٢٢٢٢	١٥٦٠
الخطوط ...	١٤٥٣	٦٥٠	٥٥٩٤	١٧١٨٨	١٤٥٣	٨١٢٦	١٣١٩	٥١٦٥

P.O.J. 213 - ٢

الحفر ...	٧٠٦	٢٩٠	١٠٩٠	١٥٥٠	١٢٥٠	٧٧٤١	١٠٦٠	٨٠٨
الخطوط ...	١٨٨٩	٤٢٠	٤٢٢١	١٧١٢	١٣٧٧	٨٠٤٣	١٢٤٣	٣٦٧٣

٣ - متوسط الصنفين

الحفر ...	٧١٦	٣٦٠	١٤٥٧	١٦١٧	١٢٧٧	٧٨٩٣	١١٢١	١١٨٤
الخطوط ...	١٦٧١	٥٣٥	٢٩٠٨	١٧٦٠	١٤١٥	٨٠٩٥	١٢٨١	٤٤١٩

وهذه الأرقام تعبر عن نفسها تعبيرا دقيقا ولم يقتصر الأمر في القصب المزروع في الحفر على أن يعطى محصولا قدره ٤٣٪ من البيدان عند القطع في كل خط بل إن متوسط الوزن لم يزد على ثلثي ما أنتجه زراعة الخطوط العادية نظرا الى وجود الخلفة بنسبة كبيرة وكانت النتيجة أن البدان في زراعة الخطوط أعطى غلة جيدة من السكر تزيد على ثلاثة أضعاف بل ما يكاد يوازي أربعة أضعاف الغلة في زراعة الحفر ونظرة واحدة إلى التحليلات النسبية للعصابة لا تؤيد في الواقع النظرية القائلة بأن زيادة الضوء والهواء تجعل القصب غنيا في السكر أكثر مما يكون لذين العاميين من أثر في رفع مقدار السكر الذي يحتوي عليه خبز السكر إذ كما نستحكم على هذا الموضوع من البحث الحديث الذي قام به لندنر (Lindner 63) عن تأثير النباتات في غلة وتركيب هذا المحصول ذي الأهمية الثانية في استخراج السكر.

فضلا عما فيها من وجهين غير عمليين إذ أن طريقة زاياس كانت تقتصر في زراعة القصب في حفر تبلغ أبعادها ٩ × ١٢ قدما وحصد البيدان الناضجة فقط مع ترك الخلفة الناتجة لحصدها في المحصول التالي وطريقة الحصاد هذه ليست سهلة من الوجهة العملية نظرا إلى ظروف كوبا وقد لحصها المستر إيريل نفسه بقوله "إنها مقبولة من الوجهة النظرية ولكنها معقدة التنفيذ عمليا" وقد وجد المستر إيريل ، بعد محاولات دقيقة ، أن طريقة زاياس لا يتفق تأثيرها عند حد جعل المحصول أقل بكثير من حالة زرع القصب على أبعاد عادية ، بل إنها تحتاج إلى نفقات باهظة إذا أنه من الطبيعي أن القصب لا يتضام في مثل هذه المسافات ولا بد من أن يحتاج الأمر إلى استقرار العمليات الزراعية طول العام لاستئصال الحشائش والأششاب . ومع ذلك فأسوأ ما في هذه الطريقة ، بحسب رأى إيريل (Earle) أن القصب لم يستغل استغلالا كافيا وبعبارة أخرى يظهر أنه كانت تصاب بوفرة من "الضوء والهواء" ! ولقد كان القصب يتعرض للإصابة الشديدة بلفحة الشمس وعلى الأخص "في التراب الزراعية المجهدة" إذ كان لا يصلح للتقير الجيد لأن هذه الزراعات كانت تنمو مبكرة عن الزراعة في المسافات العادية وهذا اعتبار هام وهو الأساس الذي كانت تنحى عليه ملاحظات المؤلف أعني أن القاعدة العامة في القصب أنه ينمو في المسافات البعيدة أسرع بكثير عما في الزراعات ذات المسافات العادية وهذا برهان ثان على أن القصب نبات "اجتماعي" .

والعاملان الغير المجديان عمليا والمشار إليهما آنفا كميزين لطريقة إيروهما الزرع على مسافات أبعد مما تعده طريقة "زاياس" وإنبات البروز قبل الزرع والعامل الأخير يصفه الأستاذ "إيريل" بأنه ليس بخير من طريقة الزرع على مسافات بعيدة وما فيها من شك لا ريب فيه بل تزيد "ظاهرة عدية الفائدة من الوجهة العملية" (٣٣) .

وفيما يخص بالأقطار الشبه الاستوائية فإن كروس (١٩) (Cross) قد نشر حديثا بعض بيانات واضحة لدرجة ثقلت النظر وقد استقاهما من تجارب قارن فيها النتائج التي حصل عليها من زراعة القصب المعروف باسم (P.O.J.) في حفر وعلى خطوط وقد جعل كلا من الحفر والخطوط على أبعاد متساوية وهي تبلغ في الأرجنتين عادة (١٧٠ - ١٩٠ مترا) .

وقد دلت هذه النتائج المستمدة من تجارب زراعة القصب في حفر على أن الخسائر في المحصول تصبح جسيمة إذا ما عقر القصب للمرة الخامسة أو السادسة ولكن لما كان من البادر أن يعقر القصب في مصر أكثر من مرة فإنما تأت في الجدول رقم ٣ إلا بالنتائج التي حصل عليها كروس في السنة الأولى .



## تجارب بنجر السكر المائلة للقصب

أجريت تجارب المسافات في كلايتفالي في سنتين متواليتين على السلالة (E) المعروفة بوفرة الغلة والسلالة (ZZ) المعروفة بوفرة السكر وقد جعلت المسافات بحيث يعطى الهكتار الواحد ١٠٠,٠٠٠ ، ٨٠,٠٠٠ ، ٦٠,٠٠٠ نبات من نباتات البنجر وفي سنة ١٩٣٣ نأثر محصول البنجر ونسبة البلور و غلة السكر قليلا في السلالة (ZZ) نتيجة للمسافات بين السلالة (E) أعطت محصولا أقل في المسافات الواسعة وفي سنة ١٩٣٤ أعطت كلتا السلالتين غلة أوفر في المسافات الضيقة وفي كلتا السنتين كان نوع البنجر وقابليته للصناعة في كل من السلالتين غير ملائمين بسبب اتساع المسافات وقد انخفضت نسبة السكر ودرجة النقاوة وارتفعت نسبة الدبس والمزبات الآزوتية وقد دل ذلك على ازدياد مصاعب البلور ونقص مقطوعية المصنع ، ومن المفيد هنا ذكر الأرقام التي نشرها حديثا داهلبرج (21) (Dahlberg) لبيان عدد النباتات القائمة والغلات في حقول من البنجر تغذى انجي عشر مصنعا للسكر في السويد سنة ١٩٣٣ وهي كما يلي :

## جدول رقم ٤

عدد النباتات والغلات في بنجر السكر بالسويد

عدد النباتات في الحقول (بالآلاف)	الحصول	عدد الأعطان من البنجر في الفدان
في الفدان	الزيادة	
١٦	١٠,٧٩	—
٢٠	١٤,٣٦	٣,٥٧
٢٤	١٦,٥٨	٢,٢٢
٢٨	١٧,٩٧	١,٣٩
٣٢	١٨,٧٧	٠,٨٠
	٧,٩٨	

ويبلغ متوسط عدد نباتات البنجر بالسويد ٣٢,٠٠٠ نبات (٨,٠٠٠ في الهكتار) بمعدل زرع النباتات على أبعاد تنقص قليلا عن ١١ بوصة في كل الخطوط التي تبعد عن بعضها البعض بمقدار ١٨ بوصة ومما لا شك فيه أن المسافات الضيقة تنتج بنجرا أصغر حجما مما يزرع على مسافات واسعة ولكن زيادة الغلة الناتجة من الإكثار من عدد النباتات تعوض صغر الحجم المتوسط وتفوقه . ويظهر من الجدول الصغير تناسق معقول في اضطراب ازدياد الغلة كلما ضاقت المسافات الأمر الذي يمتشي صحيحا مع قانون تقصير المسافات وهو ما ينطبق على نتائج مجموعات التجارب التي نشرها (فان جينكين 4 Van Ginnekin) في هولنده منذ عهد قريب جدا .

## جدول رقم ٥

عدد النباتات والغلات في بنجر السكر الهولندي

عدد النباتات في الهكتار بالآلاف	عدد الفطائر التجارية الناتجة من الهكتار	السكر %
٤٠	٤٦١,٥	١٦,٥٤
٦٣	٥١٤,٣	١٧,٤٦
١٠٤	٥٢٤,٧	١٧,٤٨
١٦٠	٥٤١,٤	١٧,٥٤

وختم القول أن جنسن (٤٧) Jansen قد نشر نتائج مقدار المسافات في أفليم أوتاج (Uthah) بالولايات المتحدة وهي الواردة بالجدول رقم ٦ كما وأن بروبيكر Brewbaker يعطينا مثل هذه الأرقام من كلورادو .

## جدول رقم ٦

عدد النباتات والغلات في بنجر السكر بأمریکا

أبعاد الخطوط بالبوصة	البنجر الناتج من الفدان بالغلة
٣٩	٧,٠٦
٢٥	١١,٠١
٢٠	١٣,٧٣
١٧	١٤,٣٦
١٤	١٧,٢٨

ويتضح من التجارب في جميع أنحاء العالم ما يثبت النتيجة النهائية الواضحة وهي أن الحد الأقصى لغلة البنجر لا يمكن الحصول عليه بتوسيع المسافات وسولك (Soulk) أول من أثبت العلاقة الحسابية بين الغلة وكثافة النباتات في سنة ١٩٣٣ ومنذ ذلك الوقت تده زراع البنجر تنبها محسوسا إلى صحة هذه النظرية وتورطاتها الاقتصادية .

## تجارب مسافات القصب في الأقطار الأخرى

إن التجارب القيمة التي أجراها ستانز Stubs في لوزيانا على القصب الأرجواني والشريريون المخطط (وهو القصب المعروف عندنا باسم البلدي) دلت في سنة ١٨٨٨ ومن نتائج الجدول رقم ٧ التي أجريت على ١٨ محصولاً يتبين أن القصب المزروع على خطوط تبعد عن بعضها البعض بمقدار ٩٠ سنتيمتراً كان يعطي أحسن غلة وبالعكس ما زرع على مسافات بعيدة فقد أتى بأقل غلة - وبما يستحق الذكر أيضاً أن الأخير أنتج عصارات أقل ما تكون في مجموع المواد الصلبة والسكرز والبقاوة وأعلى ما تكون في نسبة السكر المحلول ونظراً إلى ما هو معروف من أن لوزيانا كانت في طلبه الأقطار التي تستعمل الآلات الميكانيكية في زراعة القصب أن الزراعات الخفيفة فيها كانت كبيرة وهي التي يتأخر تضام ما بين خطوطها فإن ستانز (stubs) استنتج النتيجة المعقولة التي تؤيدها هذه النتائج وهي جعل الزراعة على أضييق ما يمكن من المسافات بشرط أن يسمح بدخول الآلات الزراعية الملائمة بسهولة في المخطوط .

## جدول رقم ٧

النتائج المركبة للتجارب القديمة في لوزيانا

العدد النتائج	عدد العيانات في هكتار	المسافة بين الخطوط	القصب المزروع على خطوط تبعد عن بعضها بأقل	نسبة المواد الصلبة	النتائج الكيميائية للخصارة	النتائج في هكتار
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
١٤	٧٤٠٠	١٣٠٠	٨٥٠٠	١٤٠٢	١٠٠٧	١٥٣
١٤	٧٤٠٠	١٢٥٠	٦٩٠٣	١٣٠٩	١٠٠٤	١٦٢
١٨	٧٤٠٠	١٣٠٠	٨٢٠٥	١٤٠٠	١٠٠٦	١٥٤
١٢	٦٠٠٠	١٣٠٠	٨٢٠١	١٤٠٠	١٠٠٧	١٦٦
٦	٦٦٠٠	١٢٥٠	٨٢٠٤	١٤٠٣	١١٠٠	١٦٦
٦	٦٢٠٠	١٣٥٠	٧٨٠١	١٣٠٨	١٠٠٣	١٧٢

وكان معظم زراعت القصب في لوزيانا إلى الوقت الذي عملت فيه هذه التجارب يزرعون القصب في خطوط تبعد عن بعضها البعض بمقدار ستة أقدام ولكنهم بعد ظهور هذه النتائج وقيام ستانز بنشرها وتحليلها تراهم جعلوا هذه المسافة خمسة أقدام (١,٥٠ متر) .

والمنتظر بدلياً أنه كلما ضاقت المسافات وزاد عدد المخطوط ازداد عدد العيدان في الهكتار زيادة متوسطة مضطربة، وهذه المناسبة يذكر استايز ملاحظة مفيدة ومناسبة لتمام إذ وجد، بعد أن عد عيدان القصب في كل خط في وقت قلب الزبة (المخطوط) على القصب وعند آخر الزراعة وجمع المحصول أن كثيراً من العيدان يموت لضيق المسافة اللازمة للنمو . ولاحظ هذا ، على الأخص في القصب المقرضى المسافات الضيقة و يتبين من الإحصاءات أن ٥٠٪ من العيدان مات قبل النضج . وكثيراً من العيدان التي كان يبلغ طولها ثلاثة أقدام وجدت ميتة عند جمع المحصول لغير ما سبب خلاف ضيق المكان اللازم للنمو . وهذه الملاحظة توضح كيف أنه يقلب على زراعة القصب الضيقة أن تنتج عماراً جيداً للغاية خصوصاً في السلالات المعروفة بقوة نموها عند التعفير .

وقد ظهر من التجارب التي قام بها ر. ا. بلوين (R. E. Blouin) سنة ١٩٠١ في هاواي على القصب المعروف باسم "لاهاينا" (Lahaina) القصب الأبيض (Cana Blanca) الذي زرع في مسافات قدرها ٥ و ٦ و ٨ أقدام أن ١٠ أقدام زرع على خطوط تبعد بعضها ٨ أقدام (١,٥٠ متر) غل الهكتار الواحد منه قصباً أكثر مما زرع على ستة أقدام بمقدار ٦٠ طناً . ومع العلم بأن التجربة الأخيرة كانت الثانية من وجهة الأهمية فقد استنتج من ذلك أن زراع هاواي الذين كانوا يجمعون على اتباع مسافة ٥ أقدام بين المخطوط ليس لديهم ما يبرر ترك هذه القاعدة ، ويرى رينوزو (85 Reynoso) أن ١,٥ قدم هي أحسن مسافة لتكوي . واستنتج بونا (11 Boname) أن مسافة أر بعقون نصف قدم إلى ٨ أقدام أفضل ما يتبع في جواديلوب (Guadeloupe) + وقد أجريت تجارب واسعة في محطات ثانوية تحت إشراف المؤلف (٩١) في مقاطعة توكومان (Tuoman) بالأرجنتين على قصب شيريون المخطط والأرجواني واتبع فيها عمل المخطوط على مسافات قدرها ٥ و ٦ و ٨ أقدام فتبين منها أن أحسن النتائج كانت لحد كبير في المخطوط التي تبعد بعضها عن بعض بمقدار ٥ أقدام (١,٥ متر) وهي التي تفوق محصول الهكتار فيها بمقدار ٢٤ طناً عن زراعة الستة الأقدام واضطرب القصب في المحصول كما التهمت المسافات حتى إذا وصلنا إلى مسافة ٥ أقدام كان محصولها أقلها جميعاً . وقد عمل حساب الريح الذي تمتاز به تجارب الخمسة الأقدام على اثباته ، وهو أول الاعتبارات في التجارب الزراعية على أساس سعر القصب الذي كان يبيعه الزارع في ذلك الوقت (١٩١٣) فوجد أن زيادة الريح في الهكتار ١٠٠ بلغت ١٦٨ جنيه .

+ متوسط المسافة بين خطوط القصب في تاغال ١,٥٠ متر في بيرد (٦) ١,٣٥ متر في ترواد ١,٥٠ متر وحيداً قرافولي (40) Fowle بعد التجارب التي أجراها على كل من صنفي القصب P. O. J. 2878 و P. O. J. 2725 مستعملاً المسافات ١,٢٠ و ١,٥٠ و ١,٨٠ و ٢,١ متر أن "تجارب المسافات تثبت أنه كلما ضاقت المسافات بين المخطوط زاد المحصول" .

+ في سنة ١٩١٣ كانت الورقة النقدية (بيزو) في الأرجنتين تساوي ٥٠ قرش (٢,٥٠ متر أمريكي) (٣)

ومن المرجح كذلك أن يكون بقاء مسافة الـ ١٣٥٠ متر كقاعدة لزراعة القصب في كوينزلاند وأستراليا راجعا إلى تمسك الزراع بالزراعة الآلية رغم أن تجارب ثلاثين سنة في محطة تجارب السكر بماسكاي (Mackay) قد أظهرت الحديقة الآتية المتقولة عن كيوج (Keogh).

وقد بدأت أول تجربة في محطة ما كاي (Markay) في سنة ١٩٠٦. واستمرت حتى محصول السنة الرابعة بمسافات تختلف بين ١,٢٠ و ٢,١٠ متر ومن الغريب أن العدد ١,٢٠ متر لم يستعمل إلا في التجربة الأولى فقط أما التجارب الأخرى فقد جرت فيها المسافات ١,٥٠ - ٢,١٠ ، ١,٣٥ - ٢,١٠ متر وقد أدرج متوسط نتائج هذه التجارب في الجدول رقم ٩ :

(\*) يترك معمول القصب في الأرجنتين مدة يبالغ متوسطها ٦ - ٧ سنوات في الأرض .

جدول رقم ۸

من عام ۱۹۱۳ - ۱۹۱۷

عدد أطباء العصب	الملاحظات من الخطوط	
في الحكاير	قدم	متر
٥٥٣٧	٥	١٠٥٠
٤٢٨	٦	١٠٨٠

وقد بذلت تجارب محطة توكومان في سنة ١٩١٠ تحت إشراف ر. ب. بلوين R.E. Plouin واستمر فيها المؤلف حتى سنة ١٩١٦ ومنذ ذلك الوقت استمر الدكتور ب. ٠ كروس (١٩) الذي خلف كاتب هذه الرسالة في إدارة ذلك المعهد ، في إجراء التجارب حتى وقتنا هذا . وقد أجريت تجارب المجموعة الأولى على قصب السنة من نوع لوزيانا الأحمر (البلدي) واتباع فيها عمل الخطوط التي تبعد عن بعضها بمقدار ١,٣٠ • ١,٥٠ • ١,٨٠ • ٢,١٠ • ٢,٤٠ مترا . وأتبع الخطوط التي على أبعاد ١,٣٠ مترا أكبر محصول من القصب أما المسافات الكبيرة فكان محصولها أقل الجميع . وقد استنتج بلوين (١٠) من هذه التجارب أنه بمراعاة الموضوع الغام وهو عمليات الزراعة الميكانيكية الصحيحة ، فإن المسافة بين الخط والأخريج الأثقل في توكومان ، عن خمسة أقدام (١,٥٠ متر) ولا تزيد على ستة أقدام ، مع التوصية بزراعة الصنف (البلدي) الذي كان مستعملا إذ ذاك على مسافة قدرها ٥/٢ قدم (١,٦٥ متر) .

\* \* نتائج متوافقة مع تجارب المئات التي أجريت بهتريه ريجيل Dringhe SS في عدة تجارب الغوص كوكو (20) المبردة بدرجة رينولدز Bonding حيث سادت التآكل في ذلك مدى 13، 14، 15 من قبل الملائمة الفولاذية الساخنة 305، حيث فصل على زيادة في الغوص في 10 - .

من ذلك وهي ١٣، ١١ متر للارتفاع المسافة الخطية أساسا وهو ٣٥، ١٣ متر لخطي على زيادة في المحور وترتيب على ١٠.

## تنقية الحشائش وعزق الأرض

ويغلب جدا في عصرنا الحاضر ، عصر الزراعة الآلية ، تحكم الآلات في الزراعة الغربية (الأوروبية) مما يحتم عليه جعل المسافة بين الخطوط بحيث تكفل استهلاك الآلات الضرورية وتسييرها في الزراعة سواء أكانت تجر بمحروان أم بمحرك . وعند حساب الفوائد المادية التي تنجم عن تفضيل الزراعة الآلية عن الزراعة اليدوية ، كثيرا ما يغرب عن بال الفلاح في البلدان الغربية أنه ينبغي محصولا أقل بكثير من الحد الأقصى الذي يجنيه من الفدان لو أن الخطوط ضيقَت بما يسمح بتضام الفصص في وقت أسرع بكثير مما لو زرع على خطوط بعيدة الأمر الذي يوفر عليه كثيرا من العمليات الزراعية الآلية التي يضطر إليها في آخر الزراعة كما يوفر عليه عرقلة أو عزقتين . وقد كان شعار فرديريك الأكبر "مغتني الوقت مغتن كل شيء"

كما أن آجى (٣) يذكر في بحثه الفد المسمى "قيادة الزراعة" بعد أن اقتبس تعريف فون مولثا لكلمة القيادة وهو "فن الاستعانة بجميع المصادر الممكنة للوصول الى غاية معينة" أن أفضل ربح يمكن الحصول عليه من الفدان ، في حالتنا هذه هو بتابع ما يأتي :

"نحن نستأصل الحشائش لكي نخسو القصب ويدرك السكر وهذه عمليات لها نهايتها . فالقصب لما يصل الى سن معين ، يستمر القضاء على الحشائش بدون نفقات بسبب الظل الذي يجم عن القصب نفسه . ثم أن كلا من الري والتسميد وتنقية الحشائش تعتبر من العمليات الفنية التي تشبه العمليات الحشرية في إنتاج القصب وتمثل القيادة في الطريقة التي تختارها للوصول الى أفضل نمط يلائم ضم حشائشنا وتلطيف أثرها بحيث تنفيذ تلك الطريقة و يظهر مفعولها كعمل موحد للوصول الى غرضنا — ولاشك في أن أقوى ما يؤثر في شئون الانسان هو عمله السابق ألا وهو القيادة .

ومن الين أننا في تنقية الحشائش نقاوم عاملا معاديا . وليس من السهل تقرير أفضل طريقة اقتصادية لإزالتها . وهنا تظهر فوائد النفقات في الطرق المتعددة وأثرها وهي العمليات اليدوية ، والآلات و مواد الرش السامة .... حيث تتعدد أنواع الحشائش المختلفة . وكذا فوائد سلاسلات القصب المختلفة وخصائصها في مقاومة الحشائش ثم أهمية تفضيل الوسائل اليدوية في الوصول الى الحشائش الموجودة في خطوط القصب على إزالة الحشائش الموجودة بالطرق الآلية ، وكذا الفوائد التي ترتب على الوقت الذي يستغرق حتى موعد "النضام" .

وبناء على الرأي القائل بعدم حاجة الأرض الى العسق ( وهو رأى يستند إلى بيانات كثيرة تدعمه رغم وجود بعض معارضات قوية ) فإن تنقية الحشائش تحتل مكانا هاما . وإن استطعنا تمجيد القضاء السريع بواسطة القرش والتسميد المجسدي لتخلصنا عمليا من نفقات إزالة الحشائش ولحصلنا على قيمة كبيرة تعوض علينا ما أنفق في تسميد القصب ، وما هي الوسائل الموصية ( البيئية ) المختلفة التي تتطلبها هذه الخطوة الفنية ( الحشرية ) ويدخل تحت كلمة ( فن الخطط الحشرية ) بعض فوائد أولية وهي في الوقت نفسه ضرورية . صعبة المنال . ليس كل ما نبدأ به وينتهي اليه بذى قيم موضوعية للقطع الموضوعية على رقعة الشطرنج وجمعية العمل مبنيا على تلك القيم ( الموضوعية ) .

لقد اقتبسنا كثيرا من رسالة آجى المذيرة للتفكير ، لأن فلسفته لا تقف عند حد السهولة والشغف بل تذهب الى قبول التطبيق عمليا في جميع المسائل الزراعية نظرية وعملية . ويقول ذلك الفاد الشطرنجي إما نول لا سكر (Emmanuel Isker) "الباعث على الخطوة التقدير والباعث عن التقدير هي قيمته بالتالي" .

+ يختلف هذا التفسير اراهمين باختلاف المسافات (مذكورة المؤلف) .

وموضوع تقليم الجذور يتصل اتصالا قريبا بموضوع قلب الأرض تقليبا مستمرا . وكل من اشتغل بزراعة قصب السكر لاحظ أن القصب بعد أن يبلغ من العمر ستة شهور يظهر عليه من آن لآخر ، آثار واضحة تدل على أذى متسبب عن تقطيع الجذور الأمر الذي لا يفهم إلا عن العمليات الزراعية التي تجري فوق سطح الأرض . ( يقول العمال في الأرجنتين أن القصب يتأذى من الزراعة ) وبهذه المناسبة نرى من المفيد ذكر بعض الملاحظات التي أبدت بمعرفة آجى وناكوين Naquin<sup>(١)</sup> في هاواي وهي تلك الملاحظات التي تثبت امتداد النظام الجذري للقصب حتى العمق من وما يصيبه من أذى من جراء الإفراط في استعمال الآلات الزراعية .

وجاء في النشرة ١٢٧ لمحطة تجارب كنساس وصف لطريقة جديدة بقصد بها نبش النظم الجذرية للقصب السكر بشكل يحفظ المواقع الأصابع للجذور .

وعلى العكس مما هو معروف ، وجد أن جذور القصب الذي عمره أقل من ثلاثة شهور تتدخل في بعضها الى ما افة ٥٠ متر أفقيا وتتمتع الى نحو ٣٨ سنتيمترا في الأرض الزراعية وبعض الجذور تخفل التربة الى بعد قدره ٧٥ سنتيمترا ولم يظهر على نصف هذا العمق من التربة أى آثار لانتقيل الآلى وقد استنتج من هذه الملاحظات ما يأتي :

"يظهر من ذلك أن الآلات الزراعية لا يمكن الانتماع بها الى أقصى حد دون الإضرار بنمو الجذور كما توضح . ويكاد قلب سطح الأرض المزروعة فصلا لا يتألم من الاضرار بالجذور لحد ما ، وإذا كانت الفوائد التي تعود من وراء العزيق السطحي للأرض تفوق النقص الناجم عن إصابة الجذور فهذا حسن ومع ذلك يجب ألا يغرب عن البال أن العوامل المضادة تلعب دورها ولذا يجب بذل العناية اللازمة حتى لا يتوازن كل من فعل التأثيرات الضارة والنتائج المتوقعة .

وقد أيد هذه الملاحظات وانتهى الى نتائجها كثير من العلماء في معظم الأقطار المنتجة للسكر ووصلوا الى نتائج متشابهة ، منهم لي (59) (Lee) وولر (62) (Weller) في هاواي ، وجنسن (48) (Jensen) وجوز توليز (42) (Gonzalez) في كوبا وكنكارمان (Venkatraman) وتوماس (III) (Thomas) في الهند ، لي (61) (Modella) وبيستجر (8) (Bissinger) في الفلبين ، هاردى (Hardy) في ترينيداد وكولسكا (57) (Kulescha) في جاوه وغيرهم . — بالانتهاء الى طرق جديدة منطوية على الذكاء أو بتطبيق ابتكارات أخرى لزراعين سابقين . وكل هذه الوسائل تدل على أن الفرض الأساسي من عرق الأرض حول القصب المزروع إنما هو تنقية الحشائش التي تنافس القصب في غذائه قبل جعل الغذاء أكثر نهضة للنبات بتنمير أجزاء التربة التي تغلفها الجذور .

(\*) Hardy F توزيع جذور القصب في أراضي رنداد المختلفة — (Trop Agr. x, 1933) .

والأبحاث التي أجريت في زراعة الذرة ، عملية كانت أو علمية ، مما له ارتباط بزراعة القصب وفيما يتعلق بنفس النقط موضوع البحث ، تشير إلى نفس هذه النتائج العامة ، ومن الأبحاث المفيدة في هذا الشأن ذلك البحث الذي قام به جينس وكوكس Grates & Cox في موضوع "تأثير الحشائش في زراعة الحبوب" . وفي جوف هذا القرن بدأ هؤلاء البعث بعدد كبير من التجارب ، على نطاق واسع وفي أجواء متباينة ، بمد أن زججوا عنايتهم إلى دراسة نتائج بعض التجارب التي أقيمت في كثير من المحطات الزراعية والتي تدل على أن زراعة الذرة الشامية لا تكون مربحة ما لم تتضمن القضاء على الحشائش ، ومد أن عرفوا أن تنقية الحشائش أمر لا غنى عنه في جميع الدراسات الخاصة بفلسفة العزق ، بقصد التثبت ، لدرجة ما ، من حقيقة الغلة النسبية التي يمكن الحصول عليها من الذرة على فرض أن الزراعة أوفى ما يكون مع مقارنتها في حالة إزالة الحشائش . وفي كل من الحالتين اشتملت هذه التجارب على مجموعتين من القطع أحدهما عوملت معاملة بسيطة باجتثاث الحشائش فقط بعد الزراعة بفاس حاد مع ملاحظة استئصالها استئصالاً أرقياً من فوق سطح الأرض والعناية بعدم قفلة التربة أو تكون أي غطاء من التراب والأخرى عوملت معاملة الزراعة الجارية في نفس المنطقة (١) واستمر هذا العمل مدة ست سنوات بمعاونة الزراع ( كثير منهم من تربيى الكتلبات الزراعية ) ورجال الفن في محطة التجارب . ولم تقل التجارب التي حصدت ودرست نتائجها في تلك المدة عن ١٢٥ تجربة . وقد تبين من المتوسط العام لكل هذه التجارب أن القطع التي استؤصلت حشائشها فقط أتعب ٩٥ ٪ من علف الماشية ٩٩ ٪ من الحبوب بقدر ما أتعبت القطع المزروعة ( زرعاً عادياً ) . وهذا دليل قوى على أن تنقية الحشائش هي في الحقيقة أهم عامل في الزراعة واستنتاج البعث ما يأتي : هالك ميدانان من ميادين البحث ، حديثاً العهد جداً ، لا زالا مفتوحين وأهميتهما من الوجهتين العملية والاقتصادية لا جدال فيها أولها أنه إذا كانت لابد من وجود الحشائش في الزراعة فلأمر يحتاج توا إلى البحث عن وسائل التدمير المزرعى التي تعامل بها المزرعة لإزالة آفات الحشائش أو تقليلها إلى أدنى حد . والآلات الزراعية الحالية بقصد من تصميمها أولاً إيجاد غطاء للأرض وعزفها ، ثم يأتي بعد ذلك القضاء على الحشائش . ومن الممكن أن تقوم الآلات المصنوعة حديثاً بإبادة الحشائش بصفة خاصة بهذه العناية بنفقات قليلة جداً . ويرجح أن يكون للعزقة الآن أهمية أعظم مما كانت عليه في العهد الماضي .

" وقد قسر البحث هذه النتائج بقصد التعبير عن أن الحشائش هي العدو الأول الذي يعمل العمليات الزراعية واجبة وفي الاستطاعة مكافحة الحشائش بالمزقات المجهزة خصيصاً لقتل هذه الآفات بدلا من عزق ( تقليب ) الأرض وتنظيفها "

١٠٠٠ : أن المجموعة الأولى لتغير ليم آية عملية زراعية خلاف وضع البزرة واستئصال الحشائش بخلاف الثانية التي عوملت معاملة الزراعة العادية .

وقد أدلى إيكارت (38) Behart . دليلين من أوضح الأدلة على أن تنقية الحشائش ، وليس عزق الأرض ، هي الفرض الأول من معاملة القصب بالعمليات الزراعية التجارية ( بخلاف التحضير للزراعة ) كما وأنه لا لزوم للسافات الواسعة التي لا يقصد منها إلا عزفها بالآلات إذ أنه في أشاء مباشرته لزراعة أولا ( Olan ) في هاواي ، تخلص من العمليات الزراعية لدرجة كبيرة ، باختراعه مادة لرش الحشائش فوق الفرس المنسوب إليه . ثم اخترع ، آجى الذي خلف إيكارت في إدارة محطة التجارب المسماة H.S.P.A جهازا ذا زحافة يقصده به رش الحشائش النامية بين خطوط القصب بزربنيخ الصودا دون الإضرار بالقصب ، وبهذا أهملت العمليات الزراعية داخل الخطوط إهمالا كبيرا لأن القصب النامي بين ورق الفرس لم يستوجب تنقية الحشائش من خطوطه وبهذه الطريقة كان يتفق سنويا ما بين ٧٥٠,٠٠٠ و ١,٠٠٠,٠٠٠ جنيه " في هذه الحرب الضروس ضد الحشائش " في إقليم (Hilo) النزرير الأمطار عندما قبل إيكارت إدارة زراعة أولا (Olan) إذ من المعروف أنه كان يشعر بوجود الإضرار في اتخاذ خطوة حاسمة نحو الاقتصاد في هذا الفرع من فروع الأعمال الزراعية . وفي سنة ١٩١٣ التي سوزدرست (Sutherst 105) الخطبة الآتية في جمع من اقتصاد زراع القصب في هاواي ميديا ملاحظاته عن تنقية الحشائش بالطرق الكيميائية من حقول القصب .

" أن تفضيل الرش على العزق واضح وضوحا تاما إذ أن نفقات الأخير تبلغ أربعة أضعاف الأول على الأقل وقد أثبتت التجارب التي أجراها المؤلف أن المساحة المعالجة بالرش تخفى منها الحشائش مدة أطول مما لو عولجت بالعزق إذ أن الطريقة الأخيرة تخرج بزورا جديدة إلى سطح الأرض الأمر الوحيد الذي كانت تنفقر اليه للإنبات وعلى ذلك فمعالجة الحشائش بالرش مرة واحدة تعادل من الوجهة النظرية عزقتين أو حتى ثلاث عزقات . ثم أن العزق أو أى عملية من العمليات التي تقلقل سطح الأرض ، يؤدي إلى جرف التربة وهرس أجزائها المتماصة ( عندما تكون مروية ) . وقد يؤخذ على ترك التربة بدون عزق أو عمليات زراعية ، الإضرار بنمو القصب ، في حين أن هذه العمليات لا تأتي بخيرها إذ أن القصب لا يحتاج إلى أية عملية من العمليات الزراعية في الاثنى عشر أو الثمانية عشر شهرا الأخيرة التي يكون في خلالها مندفا إلى النمو . ومن الممكن أن يوفر الرش على الزراعة من ١٥ — ٣٠ ربالا سنويا في الفدان " .

وبعد أن اتبعت هذه الطريقة في تنقية الحشائش واضطرد استعمالها في حقول أولا (Olao) والزراعات الأخرى ، أرسلت محطة التجارب مستر . د . لارسن (Larsen) أحد الزراعيين الفنيين البارزين في الجزائر ، لعمل تقرير عن صلاحية استعمال تلك الطريقة وقد كانت ملاحظاته الختامية للسترآجى (Ague) المدير ذات قيمة خاصة

" لقد استغنوا بهذه الطريقة عن نصف العمليات الزراعية وقللوا من الغرق لدرجة كبيرة جدا ومن المرجح أنهم يستطيعون ترك جميع العمليات الزراعية من عمل الحواجز الخارجية إلى الحرت البسيط قبل عمل البنون . وإذا كان من المستطاع عمل ذلك ، ولست أرى مانعا يحول دونه ، فإن التوفير يكون أعظم بكثير مما ذكرنا " .

### ازدحام السكان ورخص الأيدي العاملة

كما لفت نظر المؤلف كثيرا منذ سنوات عديدة ، أن الأفطار الغربية المتجهة للسكرا عدا بورتوريكو . تجعل المسافة بين المخطوط أوسع بكثير مما تشير به تجاربهم وتؤيده (١) فلسفتهم الزراعية . ولا يفسر هذا الشذوذ البين إلا الحاجة الماسة الى خطوط واسعة تسمح باستعمال الآلات الميكانيكية في العمليات الزراعية . وأزاء هذا المبرر الذي يميل المخطوط أوسع من المخذ الأفضى للزراعة بحسب حاجة كل إقليم ثم ما يتوخونه من الاقتصاد بعض الشيء في تقاوى القصب ، رأى المؤلف أنه يجب الاهتمام بوجه أهم بالفوائد الجلية الآتية التي تعود من وراء زراعة القصب على خطوط ضيقة :

( ١ ) قلة العمليات الزراعية تحته لتضام القصب بسرعة وما ينجم عن ذلك من القضاء على الحشائش في إنشاء نموها وتظهر أهمية هذا الموضوع من الأبحاث الحديثة المستتيرة التي تجعله في مقدمة العمليات الزراعية .

( ٢ ) حفظ الرطوبة نتيجة لقلة البحر (٢٢)

( ٣ ) تخفيف ( الاستفادة ) من الرطوبة في وقت محدد .

( ٤ ) تخفيف الحشائش المتسببة عن نقص في الإنبيات نظرا الى تقليل مساحة الحفر .

( ٥ ) كثرة ما يتسببه القدان من العبدان .

(١) راجع (مصدر Reynoso (116) هذا الموضوع في سنة ١٩١٣ ، ومنتج أن المخطوط الضيقة تمل محصولا أكثر مما تعده المخطوط الواسعة وسكر وأشد اقتصادا لأنه لا يأخذ بكرة المخطوط الضيقة ولا يقلل من الأفطار .

(٢) يقول مستشار مزارع (Industrie) في تقريره عن سكر زارتة أعضوا (Antigua) إحدى جزائر الهند الغربية (أنتيغا) أن زراعة القصب أصبحت أكثر أهمية في بورتوريكو وسكانت أسرع في التضام واستمر انموذج هذا الأفطار التحليل حتى إذا انخفضت الظروف لم تسددها الأفطار في البرينين وفي الأفطار في حفرة في كل الحقلين ولو في سقوط الأمطار وهذا الأمر الذي في دراجين يؤيد أن تأثير نمو الخطة يظهر أن حشداً حاصل معناه إلى ضيق المسافات يحول دون نمو الخطة الشجرة وتكون قصب الشجر يكون الجزء الأكبر من المحصول مكون من عيه أن ميكرو . وتكون النتيجة أن أهداف القصب التي يكون مصف محسوطا في بورتوريكو من السببان المتأثرة نظرا إلى اتساع المسافات نحو في الأراضي في وقت سكر جدا .

### (٦) قلة الخلفة .

(٧) في الأفطار ذات التراتب الرسوبية الضيقة تحفظ التربة كثيرا من شدة تأثير الأمطار .

(٨) تحفظ النباتات في الأفطار الضيقة بالامتوائية من الضيق الزائد إلى من

المعلوم أن القصب (P.O.J.) المزروع في مصر على مسافات ضيقة جدا لا يصيبه ضرر بقدر ما يصيب نفس الصنف المزروع في لويزيانا بالأرجنتين على مسافات تبلغ الضعف وذلك تحت درجة برودة واحدة .

وعند ما كان مؤلف هذه النشرة يعمل في بورتوريكو ، بهت كثيرا لرؤية مزارع القصب ذات المخطوط الضيقة ( ١٢٠ - ١٣٥ متر ) في تلك الجزيرة ظلت مدة قرن أو أكثر تزرع زراعة دائمة ويقل القدان أكثر مما تقله الزراعات الواسعة المخطوط في معظم الأراضي السكر في كوبا الشرقية . وبعد ذلك ببضع سنوات وجد في جزائر الفلبين أن القصب كان يزرع عادة على مسافة ٩٠ - ١١٠ سنتيمترات ( يقين من تقرير مجلس أبحاث التجارب شجى السكر بالفلبين في سنة ١٩٣٢ - ١٩٣٣ أن الحد الأقصى لمسافات القصب يجب أن يكون مترا واحدا كما أن الزراعة على خطوط أضيق من ذلك فهي وإن كانت أرباحها أقل إلا أن غلتها أكثر ) في حين أن الشائع في الهند زرع القصب على مسافات ضيقة تبلغ ٦٠ سم . ولاحظ المؤلف في فرموزا ( ٩٨ ) وجاوه ( ٩٩ ) أن المؤلف فيما زرع القصب على خطوط تبعد عن بعضها البعض بمقدار ١٠٥ سم ونادرا ما تزيد على ١٢٠ متر . وكانت نتيجة التجارب الحديثة ، اتجاه الزراع إلى تضيق المسافات كما ثبت ذلك التقرير الأخير الذي كتبه دهانت ( Demandt ) وفيه يقرر أن القصب المزروع على خطوط ضيقة المسافات لا تقتصر فائدته على إعطاء غلة وسكرا أكثر مما تعطيه المسافات الواسعة بل إن التجارب التي أجريت على الأبعاد بين النباتات في الصف الواحد أثبتت أن كثرة العيدان في الصف أجدى من قتها .

وفضلا من ذلك فإن الزراع في جاوه يعمدون منذ عدة سنوات إلى تضيق الحفر نسبة (Reynoso) ذات المقاطع القائمة الزوايا حيث يزرع جميع القصب . ومنذ بدء ترويض الأعمال في الأسواق العالمية وتحديد مساحة القصب في جاوه لم تجر أبحاث كافية . مطاعة على الحد الأقصى لما يمكن أن تكون عليه أبعاد هذه الحفر . ولكن بحلول هذه الحالات الاقتصادية الجديدة رأى أنه من الأفضل بحث هذا الموضوع بأمل الوصول إلى شيء من الاقتصاد عند المستطاع . ولهذا السبب أقيمت ١١٩ تجربة على اتساع الحفر في الأنحاء المختلفة من الجزيرة وفي كل تجربة جعل اتساع الحفر ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ٥٠ سنتيمترا . فبين من النتائج أن غلات السكر الناتجة من الحفر الضيقة كانت عادة أكثر بقليل من غلات الحفر الواسعة . وذلك في كل حالة ( جودة ) ولذا فإن دهانت ( Demandt ) ( ٢٧ ) يوصي بأن يكون اتساع الحفر المعروفة باسم ( Rynoso ) ٢٥ سم في التراتب الخفيفة والمتوسطة ، و ٣٠ - ٣٥ في الأراضي الضيقة

والواقع أن جميع أقطار القصب السالفة الذكر حيث يشيع استعمال المسافات الضيقة ، مزدهرة بالسكان وخصبة في الأيدي العاملة خلا بورنوتريكو . والحقيقة أنه يظهر أن ازدحام السكان أو الأخرى الأهلى الوطنيين في كل قطر من الأقطار التي أدخلت زراعة القصب ، هو الذى أمل (كيف) لدرجة كبيرة نوع المسافات المستعملة فيه لجنا كثر السكان وتعذر الحصول على الأرض بدون مقابل كما في الهند وجاوه ، استعملت المسافات الضيقة ، في حين أن الجهات القليلة السكان والتي يسهل فيها الحصول على الأرض ، يقوم نظام الزراعة فيها عادة تحت إشراف صناعات السكر وتستخدم الخطوط الواسعة المسافات التي هي نتيجة ملازمة في العادة للعامل المستأجرين .

وفي هذه الأحوال المتباينة اتجهت الأفكار ، في الأقطار الغربية الى الرغبة في الاقتصاد وذلك بالإكثار من الآلات الميكانيكية ورغبة في تقليل ما يحتاج اليه الفدان من نفقات العمليات الزراعية بنينا اتجهت الأفكار في بلاد الشرق الى زيادة الغلة ، في وحدة المساحة بالاتجاه الى تكثيف زراعة القصب بقدر المستطاع . ويزيد الدخل في الحالة الأخيرة خصوصا بقيام النظم التي يتبعها الفلاحون ، نتيجة لإحلال الأيدي العاملة في الأسرة ( العائلة ) محل الأيدي المستأجرة ، وما يقابل ذلك من كثرة الغلات .

وعلى ذلك فالظاهر أن البحث عن المثل الأعلى للاقتصاد في هذه الأوقات العصبية قد اتضح نواح مختلفة . ويحس هذا لدرجة كبيرة الى حالات الأيدي العاملة المحلية وقد تحدت هذه الاتجاهات تحديدا عظيما في الوقت الذي أنشأت فيه مختلف صناعات السكر المحلية ، وقد اقتبسنا اتفاقا قول آجي من أن أقوى ما يؤثر في شؤون الإنسان تجاربه السابقة ، وأن من استغرق عدة سنوات في ملاحظة هذين الاتجاهين المختلفين في مسافات القصب تأخذاه الدهشة إذ لم يكن لهذا العامل ( التجارب السابقة ) أثره الفعال بالأخذ في هذه الحالة الخاصة من العمليات الزراعية في مزارع القصب في الأقطار الغربية . ليس من المحتمل أن زارع القصب في تلك الأقطار - وهو يعتمد الى المسافات الواسعة التي تمكنه من استعمال الآلات الزراعية الكبيرة - وقد نجيب ظنه في الاقتصاد برفع نفقة الزراعة في الطن في الوقت الذي يخفضها في الفدان ؟ أليست رغبته في استعمال الآلات الميكانيكية الزراعية وتوسيع الخطوط للاكثار من العمليات الزراعية بينها وزيادة العزيق يمكن الاستغناء عنها لو سمح للقصب بالتضام في وقت مبكر لكي تستغل الحشائش ويصبح الاستغناء عن كثير من العمليات الزراعية أمرا طبيعيا ؟ والواقع أن مزارع القصب الضيقة المسافات في مصر لا تحتاج الى عزقات في الخطوط أكثر مما في لوزيانا أو الأرجنتين حيث تنسع المسافات بنسبة ١٠٠٪ ويتأخر تضام النباتات في الخطوط متأخرا كبيرا .

## تجارب المسافات في مصر

إن أعظم ما يستدعي ، نظر الوافدين الى أرض الفراغنة ، فيما يخص زراعة القصب ، هو ازدحام النباتات في الخطوط التي تعمل مقارنة تقريبا أكثر مما في أي قطر آخر ، ومع ذلك فإن مصر تحتل المكان الأول بين الأقطار المدارية من حيث مقدار ما يفقه الفدان من القصب والسكر فضلا عن جودة العصاراة بالنسبة لفصل موسم الزراعة فيها . أما فيما يخص الحصول السنوي فإنها تقضار تماما أهم الأقطار الاستوائية المتفوقة في إنتاج القصب . والخطوط التي تعمل على مسافة تبلغ حوالي ٢ ونصف قدم ناتجة عن العرف السائد وهو التقسيم بمعدل تسعة خطوط في القصبين (١) وهذا معناه أن الفدان من زراعة القصب في مصر يحتوى على ضعف الخطوط التي يوجد في مثيله في لوزيانا أو الأرجنتين . ويقل من القصب ضعف ما تقل المساحة المساوية له في الأقطار المدارية .

وفي مستهل سنة ١٩٣٣ بدأ المؤلف في إقامة ست تجارب شطرنجية كبيرة على المسافات في أهم المناطق التي تزرع القصب في الوجه القبلي ابتداء من ماوى الواقعة قرب الحدود الشمالية للجهات التي تزرع القصب لصناعة السكر الى أقصى حدود كوم أمبو في الجنوب جاعلا المسافات تختلف بين ثمانية خطوط واحد عشر خطا في القصبين ، أما عدد القطع فيتراوح بين أربع وست تبعا لتجانس التربة ، فكانت تجارب كوم أمبو أكثرها عددا من حيث القطع وفي جميع هذه الحسابات كانت مساحة القطعة أربعة قرايط أى ما يوازي سدس فدان بعد أن رؤى أن هذه المساحة كفيلا لإنتاج قصب كاف للتداول في المصانع وتداولها سهلا بدون عرقلة عملياتها أو التسبب في بطئها وجعل جميع القصب الناتج من كل قطعة بمصر عن آخره حتى يمكن تغذية العامل المعقد أو بائع العامل النظري الدقيق ، وهو الحصول على " عينات مثله " أما اختيار الأرض فلم يكن خاضعا الى ترتيب معين .

وقد أقيمت تجارب المطاعمة تمولوى بمزارع وزارة الزراعة في أرض طيبة متوسطة ، ذات مظهر متناسق والمؤلف مدين بالسكر في اختيار الأرض وإقامة التجارب وحصادها إلى المونة الصادقة التي بذلها كل من حضرات حسين عنان بك مدير قسم الزراعة والاكثار ( السكرية

\* نذكر فيما يلي بعض الموازين والمقاييس المصرية وما يعادلها :

القصبه تساوى ٥ ٣٥٥ متر أدر ٣٨٨ ياردة وهل ذلك فالقصبين تساويان ٧١ متر وتقسيم هذه المساحة على تسعة خطوط معناه جعل المساحة بين الخطوط والذى يليه ٨٠ سم

الفدان المصرى يساوى ١٠٠٣٨ فدان الإنجليزي ويحتوى على ٢٤ قيراطا والقيراط يحتوى على ٢٤ مبرا

الرطل المصرى يساوى ٥٠٩٩٠ رطل الإنجليزي والمائة رطل تزن فطاطر وال ٢٢٢ فطاطر تزن حفا



العام للوزارة الآن) وحسن خليفه الهندى المفتش بالقسم ورزق موسى افندى مفتش مزرعة المطاعنة ومحمد محمود افندى مراقب مزرعة ملوى (١٠).

وفي جميع هذه الحالات استعمل صنف القصب (P.O. J106) وهو القصب النودجى في مصر الذى مر عليه ثلاثون عاما منذ أن جلبه الى هذا القطر جناب هنرى نوس بك المدير العام لشركات السكر والتكرير المصرية، وكان الخضر والذرة المحصولين السابقين للقصب في أرض تلك التجارب.

وعند قطع التجارب كان العمال يحشدون في الحال في قطعة واحدة فيقطع القصب الناتج من المكر الواحد ويحمل على ظهور قافلة من الجمال أو في عربات ديوكوفيل خاصة (في كوم أمبو) وفي أثناء التحميل كان القطع يجرى في القطعة المجاورة. ولم يحدث قط أن أجل تحميل جزء من قصب إحدى القطع الى ما بعد الليل أى أن المحصول الناتج من كل قطعة كان يحمل دائما في العربات ويشحن إلى المصنع في مساء يوم القطع. ولم يكتف مديرو المصانع بإبداء مشورتهم فيما يخص تنظيم الشحن وتسليمها بل عين كل منهم مساعدا خاصا لاستلام قطارات التجارب ولخصها فضلا عن الإشراف على العصر وتحليل العصارات وغير ذلك وإليهم يرجع الفضل في عدم قيام أية عقبة في أثناء سير الوزن والعصر والتحليلات التي أجريت على مقادير عظيمة من العينات الكبيرة التي تبلغ آلاف الأطنان ما ينطق بكفاءتهم ودقة نظهم، ولم يشحن قصب آخر من المزارع في أثناء سير العمل في قطع التجارب رغبة في تخفيض احتمال الخلف إلى الحد الأدنى.

تجارب المطاعنة وملوى — اشتملت كل منها على أربع قطع مكررة وكل من الأدع المكررات كان به ثمانية وتسعة خطوط في القصبتين (بالتوالى ٩٠ و ٨٠ و ٧٠ سبتيمترا تقريبا بين الخطوط وبعضها) وكانت أول حثة (قلب الأرض بالمحراث القلاب tractor) في المطاعنة في منتصف شهر ديسمبر سنة ١٩٣٣ وبكر بالحراثة الثانية في الشهر التالى وأكملت تسوية الأرض في السادس من شهر يناير سنة ١٩٣٣ ومسحت القطع بواقع الواحدة ١٦ فدان (٤ قراريط) وأنجزت عملية التخطيط بعناية على أبعادها المختلفة وأنشئت القناتوات اللازمة في أوائل فبراير ثم زرعت العقل الجيدة في منتصف شهر فبراير وهو من أحسن مواعيد الزراعة في مصر (١٠١) بعد تنظيف الخطوط بالفأس، ورويت الأرض في الحال الري العادية التي تلزم للزراعة الجافة. ثم ووليت الزراعة بالنتين وعشرين رية. الأولى في ٩ مارس والأخيرة في أول ديسمبر. وأجريت ثلاث عزقات الأولى في ٧ أبريل والثانية في ٥ مايو والثالثة في ٢٧ منه. وسمدت الزراعة على ثلاث دفعات (في ٦، ٣١ مايو و ٢ يوليو) بواقع ٣٠٠ كيلو من سماد ترو سلفات الأمونيا

\* يقدم المؤلف كذلك عظيم شكره الى حضرة الدكتور محمد عبد الكيلانى الاخصائى الاول بقسم تربية النباتات لمداومته الصادقة كما أنه يعترف بأنه كان يستعجل عليه الحصول على البيانات الكافية الصحيحة والكاملة لفائدة لولا مساعدة حضرات المستر مونتى مدير مصنع السكر بأبى قرقاص والمستر نوس والمستر كرينتو فارى بمصنع السكر بأرمنت والمستر فافر بمصنع كوم امبو بال حضرات موظفى المصانع وفكرات كوم أمبو جهدا في معاونتنا للحصول من هذه التجارب على نتائج تصلح نقابة للصحة.

الفدان (٢٦٪ أزوت) ونظفت القناتوات في أواخر مايو ومنتصف أغسطس. وبوشر القطع في ٢٣، ٢٢ فبراير حصلنا على النتائج المدونة بالجدول رقم ١٠. أما فيما يختص بالقصب الخلفة (محصول السنة الثانية) فقد رويت القطع في أواخر شهر أبريل سنة ١٩٣٤ وحُرثت الخطوط حرا تاما في ١٢ مايو وأعيد تمسيد القطع في ٢٣ مايو فبيل إضافة الدفعة الأولى من السماد (كما حدث في محصول الفرس). ورويت الأرض لثاني مرة في اليوم التالى وكانت الريّة الثانية والعشرين في ٥ يناير سنة ١٩٣٥. وأعطيت الدقتان الثانية والثالثة من سماد الترو سلفات في ١٧ و ٢٠ يونيو وأول يوليو. ولم يتطلب الحال عزقا ما. وبوشر القطع بعد مضي ستة تساما على قطع قصب السنة الأولى. وكان متوسط النتائج كما هو واضح في الجدول رقم ١١

ولم تجر عمليات التحضير والزراعة في ملوى في أنسب الأوقات كما حدث في تجارب المطاعنة. ويحمل تأثير قصر فصل الخو (الذى هو أقصر عن مثيله في المطاعنة) من أرقام المحصول المسدونة في الجدول رقم ١٠. فلم يبدأ في الحراثة والقصب قبل ٢٣ إبريل سنة ١٩٣٣ وأجريت الحراثة الثانية والقصب بعد أسبوع من الأولى ولم يجر رسم وتقسيم وتخطيط القطع حتى آخر الأسبوع الأول من مايو ولم تزرع التجارب (كان الزرع بالطريقة المبلولة) إلا في ٩ مايو. ورويت في اليوم التالى. أما الريات التي عقبته ذلك فلم ترد عن ست عشرة رية، الأولى بعد الزراعة بعشرة أيام والأخيرة لم تعط إلا في ١٠ فبراير سنة ١٩٣٤ وهو وقت متأخر جدا. ويرجح أن تكون هذه الريّة المتأخرة هي التي سببت، الى درجة عظيمة نوعا انخفاض متوسط السكرز والقوة في قصب ملوى إذا قورن بقصب المطاعنة ونظمت الزراعة أربع عزقات الأولى في ٢ يونيو وأجريت الأخيرة في ٢٢ يوليو. أما التسميد فقد اختلف عن مثيله بالمطاعنة إذ أضف ٢٠٠ ك. ج من ترات الجير المحتوى على ١٦ ٪ من سوبر فوسفات الجير مع ٥٠٠ ك. ج من ترات الجير (١٥،٥ ٪ أزوت) على ثلاث دفعات الأولى في ٦ يونيو والأخيرة في آخر يوليو. وأجرى القطع في ١٣ و ١٤ مارس سنة ١٩٣٤

وفي القصب المقرر رويت القطع في خلال الأسبوع الأول من مايو وأعطيت الدفعة الأولى من السماد في منتصف هذا الشهر أى مايو سنة ١٩٣٤. وكان مجموع السماد الذى أضف للقصب السنة الثانية ٢٠٠ ك. ج من ترات الجير و ١٠٠ ك. ج من السوبر فوسفات وحُرثت الخطوط حرا جيدا في ٢٢ مايو وفي ٢٤ مايو أعيد تمسيد القطع وأعطيت الدفعة الثانية من السماد، كما أضيفت الدفعة الأخيرة بعد الثانية بشهر. ثم رويت الأرض بعد ذلك ١٣ مرة كانت الأخيرة مبكرة في أوائل فبراير أى بعد مرور شهر على الريّة الأخيرة في المطاعنة وفي هذه المرة أيضا يربح أن يكون بعض الانخفاض الذي في قصب ملوى من حيث السكرز والقوة كما هو ظاهر من الجدول رقم ١١ راجعا إلى تأخير ميعاد الري. ولم تتطلب الزراعة إلا عرقة واحدة — في منتصف شهر يونيه — وأعقب ذلك تعديل البنون الفاصلة بين القطع تعديلا نهائيا. وفي الجدول رقم ١١ ذكر متوسط نتائج القطع الذى حدث في ١١ و ١٠ مارس سنة ١٩٣٥ كما ذكر متوسط نتائج التجارب في المجموعتين.

## بجارب التخطيط في المطاعة وملوى

و ده طرازى اختبار المسافات

مساحة المثلث : قرار بعد (١ / ٦ ميل)  
Size of Plot: 4 Kirates (1/6th Acre).

الساد على أساس كية تابعة للقدان (وليت يمثل المظهر)

Fertilizer on basis uniform quantity per feddan (not on row basis).

I	1	12	13	14	15	16	17
A	B	C	D	A	B	C	D
II	2	13	14	15	16	17	18
B	D	B	A	C	B	A	D
III	3	14	15	16	17	18	19
C	A	D	C	B	A	D	C
IV	4	15	16	17	18	19	20
D	C	A	D	C	B	A	C
V	5	16	17	18	19	20	21
A	B	C	D	A	B	C	D
VI	6	17	18	19	20	21	22
B	A	C	D	B	A	C	D
VII	7	18	19	20	21	22	23
C	C	D	A	C	D	B	A
VIII	8	19	20	21	22	23	24
D	A	B	C	D	A	B	C
IX	9	20	21	22	23	24	25
A	B	C	D	A	B	C	D
X	10	21	22	23	24	25	26
B	C	D	A	B	C	D	A
XI	11	22	23	24	25	26	27
C	D	A	B	C	D	A	B
XII	12	23	24	25	26	27	28
D	A	B	C	D	A	B	C
XIII	13	24	25	26	27	28	29
A	B	C	D	A	B	C	D
XIV	14	25	26	27	28	29	30
B	C	D	A	B	C	D	A
XV	15	26	27	28	29	30	31
C	D	A	B	C	D	A	B
XVI	16	27	28	29	30	31	32
D	A	B	C	D	A	B	C
XVII	17	28	29	30	31	32	33
A	B	C	D	A	B	C	D
XVIII	18	29	30	31	32	33	34
B	C	D	A	B	C	D	A
XIX	19	30	31	32	33	34	35
C	D	A	B	C	D	A	B
XX	20	31	32	33	34	35	36
D	A	B	C	D	A	B	C
XXI	21	32	33	34	35	36	37
A	B	C	D	A	B	C	D
XXII	22	33	34	35	36	37	38
B	C	D	A	B	C	D	A
XXIII	23	34	35	36	37	38	39
C	D	A	B	C	D	A	B
XXIV	24	35	36	37	38	39	40
D	A	B	C	D	A	B	C
XXV	25	36	37	38	39	40	41
A	B	C	D	A	B	C	D
XXVI	26	37	38	39	40	41	42
B	C	D	A	B	C	D	A
XXVII	27	38	39	40	41	42	43
C	D	A	B	C	D	A	B
XXVIII	28	39	40	41	42	43	44
D	A	B	C	D	A	B	C
XXIX	29	40	41	42	43	44	45
A	B	C	D	A	B	C	D
XXX	30	41	42	43	44	45	46
B	C	D	A	B	C	D	A
XXXI	31	42	43	44	45	46	47
C	D	A	B	C	D	A	B
XXXII	32	43	44	45	46	47	48
D	A	B	C	D	A	B	C
XXXIII	33	44	45	46	47	48	49
A	B	C	D	A	B	C	D
XXXIV	34	45	46	47	48	49	50
B	C	D	A	B	C	D	A
XXXV	35	46	47	48	49	50	51
C	D	A	B	C	D	A	B
XXXVI	36	47	48	49	50	51	52
D	A	B	C	D	A	B	C
XXXVII	37	48	49	50	51	52	53
A	B	C	D	A	B	C	D
XXXVIII	38	49	50	51	52	53	54
B	C	D	A	B	C	D	A
XXXIX	39	50	51	52	53	54	55
C	D	A	B	C	D	A	B
XL	40	51	52	53	54	55	56
D	A	B	C	D	A	B	C
XLI	41	52	53	54	55	56	57
A	B	C	D	A	B	C	D
XLII	42	53	54	55	56	57	58
B	C	D	A	B	C	D	A
XLIII	43	54	55	56	57	58	59
C	D	A	B	C	D	A	B
XLIV	44	55	56	57	58	59	60
D	A	B	C	D	A	B	C
XLV	45	56	57	58	59	60	61
A	B	C	D	A	B	C	D
XLVI	46	57	58	59	60	61	62
B	C	D	A	B	C	D	A
XLVII	47	58	59	60	61	62	63
C	D	A	B	C	D	A	B
XLVIII	48	59	60	61	62	63	64
D	A	B	C	D	A	B	C
XLIX	49	60	61	62	63	64	65
A	B	C	D	A	B	C	D
XLX	50	61	62	63	64	65	66
B	C	D	A	B	C	D	A
LI	51	62	63	64	65	66	67
C	D	A	B	C	D	A	B
LII	52	63	64	65	66	67	68
D	A	B	C	D	A	B	C
LIII	53	64	65	66	67	68	69
A	B	C	D	A	B	C	D
LIV	54	65	66	67	68	69	70
B	C	D	A	B	C	D	A
LX	55	66	67	68	69	70	71
C	D	A	B	C	D	A	B
LXI	56	67	68	69	70	71	72
D	A	B	C	D	A	B	C
LXII	57	68	69	70	71	72	73
A	B	C	D	A	B	C	D
LXIII	58	69	70	71	72	73	74
B	C	D	A	B	C	D	A
LXIV	59	70	71	72	73	74	75
C	D	A	B	C	D	A	B
LXV	60	71	72	73	74	75	76
D	A	B	C	D	A	B	C
LXVI	61	72	73	74	75	76	77
A	B	C	D	A	B	C	D
LXVII	62	73	74	75	76	77	78
B	C	D	A	B	C	D	A
LXVIII	63	74	75	76	77	78	79
C	D	A	B	C	D	A	B
LXIX	64	75	76	77	78	79	80
D	A	B	C	D	A	B	C
LXX	65	76	77	78	79	80	81
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXI	66	77	78	79	80	81	82
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXII	67	78	79	80	81	82	83
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXIII	68	79	80	81	82	83	84
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXIV	69	80	81	82	83	84	85
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXV	70	81	82	83	84	85	86
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXVI	71	82	83	84	85	86	87
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXVII	72	83	84	85	86	87	88
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXVIII	73	84	85	86	87	88	89
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXIX	74	85	86	87	88	89	90
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXX	75	86	87	88	89	90	91
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXXI	76	87	88	89	90	91	92
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXXII	77	88	89	90	91	92	93
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXXIII	78	89	90	91	92	93	94
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXXIV	79	90	91	92	93	94	95
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXXV	80	91	92	93	94	95	96
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXXVI	81	92	93	94	95	96	97
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXXVII	82	93	94	95	96	97	98
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXXVIII	83	94	95	96	97	98	99
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXXIX	84	95	96	97	98	99	100
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXXX	85	96	97	98	99	100	101
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXXXI	86	97	98	99	100	101	102
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXXXII	87	98	99	100	101	102	103
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXXXIII	88	99	100	101	102	103	104
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXXXIV	89	100	101	102	103	104	105
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXXXV	90	101	102	103	104	105	106
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXXXVI	91	102	103	104	105	106	107
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXXXVII	92	103	104	105	106	107	108
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXXXVIII	93	104	105	106	107	108	109
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXXXIX	94	105	106	107	108	109	110
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXXXX	95	106	107	108	109	110	111
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXXXXI	96	107	108	109	110	111	112
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXXXXII	97	108	109	110	111	112	113
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXXXXIII	98	109	110	111	112	113	114
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXXXXIV	99	110	111	112	113	114	115
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXXXXV	100	111	112	113	114	115	116
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXXXXVI	101	112	113	114	115	116	117
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXXXXVII	102	113	114	115	116	117	118
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXXXXVIII	103	114	115	116	117	118	119
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXXXXIX	104	115	116	117	118	119	120
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXXXXX	105	116	117	118	119	120	121
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXXXXXI	106	117	118	119	120	121	122
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXXXXXII	107	118	119	120	121	122	123
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXXXXXIII	108	119	120	121	122	123	124
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXXXXXIV	109	120	121	122	123	124	125
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXXXXXV	110	121	122	123	124	125	126
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXXXXXVI	111	122	123	124	125	126	127
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXXXXXVII	112	123	124	125	126	127	128
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXXXXXVIII	113	124	125	126	127	128	129
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXXXXXIX	114	125	126	127	128	129	130
B	C	D	A	B	C	D	A
LXXXXXXX	115	126	127	128	129	130	131
C	D	A	B	C	D	A	B
LXXXXXXXI	116	127	128	129	130	131	132
D	A	B	C	D	A	B	C
LXXXXXXXII	117	128	129	130	131	132	133
A	B	C	D	A	B	C	D
LXXXXXXXIII	118	129	130</				

جدول رقم ١١

محارب التخطيط في المطاعة وملوى

عدد الخطوط في القصبين (٧٠ متر)	الفاطير الناتجة من امدان		نقى القصب بالسكر	القذارة	نسبة الجلوكرز
	قصب السنة الثانية	متوسط المحصولين			

قصب السنة الثانية ١ — المطاعة قطع في ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٣٥

٨ (٩٠-م)	١٠٥٩	١٠٣٨	١٤٠٩	٨٦٩	٢٠٦
٩ (٨٠-م)	١٠٩٣	١٠٦٤	١٤٣٣	٨٧٠	٢٠٧
١٠ (٧٠-م)	١٠٩٧	١٠٧٩	١٤٣٥	٨٦٦	٢٠٨

قصب السنة الثانية ٢ — ملوى قطع ١٠ و ١١ مارس سنة ١٩٣٥

٨	٩٩٠	٩٠٨	١١٨٧	٧٩٣	٨٥٣
٩	١٠١٤	٩٤٢	١٢٠٢	٧٩٥	٧٠٤
١٠	١٠٢٠	٩١٩	١١٦٣	٧٩٤	٨٠٦

٣ — المتوسطات السنوية للتجربتين معا

٨	١٠٢٥	٩٧٣	١٢٥٩	٨١٣	٦٠٥
٩	١٠٥٤	١٠٠٣	١٢٦٧	٨١٤	٦٠٤
١٠	١٠٥٩	٩٩٩	١٢٤١	٨١٣	٦٠٩

(تابع) جدول رقم ١٠

محارب التخطيط في المطاعة وملوى

قصب السنة الأولى ٢ — ملوى قطع ١٣ و ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٤

عدد الخطوط في القصبين	رقم القطع في قرار بط	وزن القصب الناتج من كل قطعة بالكيلوجرام	ناتج الفدان بالفاطير	درجة غنى القصب بالسكر	درجة القذارة	نسبة الجلوكرز
٨	١ — ١	٦٨٦٠	—	٩٠٩٨	٧٢٠٢	١٥٠٣
٨	١ — ٤	٦١٩٠	—	١٢٠٠٤	٨١٠٤	٦٠٦
٨	١ — ٦	٦٤٨٠	—	١٠٠٦٠	٧٤٠٣	١١٠٠
٨	١ — ١	٥٤٦٠	—	١١٠٠٠	٧٥٠٦	١٠٠٦
٨	المتوسط	٦٢٤٨	٨٢٥	١٠٠٩١	٧٥٩	١٠٠٦
٩	ب — ٣	٦٩٢٠	—	١١٥٠٣	٧٤٠٥	١٣٠٤
٩	ب — ٥	٦٩٠٠	—	١٠٠٠٤	٧٣٠٢	١٢٠٨
٩	ب — ٨	٥١٦٠	—	١١٨٠٤	٧٨٠٧	٨٠٦
٩	ب — ١٠	٦٥٤٠	—	١١٣٠٦	٧٦٠١	١١٠٢
٩	المتوسط	٦٥٨٠	٨٦٩	١٠٠٩٤	٧٥٠٦	١١٠٥
١٠	ج — ٢	٦٢٨٠	—	١٠٢٠٤	٧٤٠٧	١٣٠٩
١٠	ج — ٦	٥٥٨٠	—	١٠٠٩٥	٧٥٠٣	١١٠٠
١٠	ج — ٩	٦٩٩٠	—	٩٠٨٣	٧٢٠٦	١٢٠٦
١٠	ج — ١٠	٥٩١٠	—	١١٤٠٢	٧٧٠٥	١٠٠٢
١٠	المتوسط	٦١٩٠	٨١٧	١٠٠٦١	٧٥٠٠	١١٠٩

الدقيقة التي كان يقوم بها المؤلف ووكيل الشركة من مزارع (١٠) في أثناء نمو المحصول ، أن القطع الرموز لما بحرف د ( ١١ خطأ في القصبتين ) كانت أحسن المذكرات حيث أنها كانت تتفوق قليلا في قصبها عن سائر الحقل .

ولم ينقل شيء يتعلق بتخصير سائر مساحات التجارب كما أن جميع العمليات الزراعية أجريت في أنسب الأوقات . وحُرث الحقول طولا وعرضا وزحفت في أوائل الشتاء بخرات فاو (Fowler) البخارى . وأجرى التخطيط الدقيق في مستهل شهر فبراير تحت إشراف مسيو مزارع نفسه وراجع قياسها المؤلف ومساعدته . واعتنى مسيو مزارع بالتقاط النقاوى وزرعت الأربع التجارب كلها في الأسبوع الواقع بين ٧ و ١٤ فبراير سنة ١٩٣٣ وأعطيت التجارب بمساحة رية الحياة التي عقيت الزراعة المحافاة مباشرة ٢٧ رية فيما يختص بالتجارب التي أقيمت في عباسية وصباح قبل أما في التجريبتين الأخرتين فقد نقص عدد الريات فيها رية واحدة . وعزقت الأرض ثلاث عزقات وأعطى السجاد على ثلاث دفعات أيضا (تروسلفات الأمونيا كما في المطاعة) الأولى في أواخر شهر أبريل أو أوائل شهر مايو والأخيرة في يوليو . واستمر القطع من ٢٠ مارس إلى أوائل أبريل كما يتبين من الجداول الآتية حيث دونت المحصولات الناتجة من كل نظارة . وكانت طريقة زراعة قصب السنة الثانية (المعقر) مماثلة من الوجهة العملية للقصب السكر إلا فيما يختص بالعزق فقد قل نوعا وبديء به مكبرا في أنسب وقت مما أطال فصل النمو في الحقل بدرجة محمودة .

(٩) يتذكر المؤلف أن يولى مسيو مزارع حقه من الشكر لمعاونته الصادقة وتجاربه العساية في إنتاج جرم تجارب كوم أمبو ومراقبتها مراقبة دقيقة إذ بجانب أعماله الهندسية كان يوال هذه التجارب بما تعجز عن تقديمه من حيث إرشاداته واختيار الترتيبات للتجارب المختلفة وفهمه لأجاءات التجارب وضرورية التفويض الدقيق على جميع سائر العمليات الزراعية من تخطيط القطع المختلفة إلى الجهود الشاق الذي يبذل في القطع وحسن الحصول الناتج من كل قطعة بنظام متوثق في فضلا عن ملاحظاته الدقيقة بوجه عام . وعمل حساب دقيق لكل شلوك اعترى إحدى قطع التجارب كالسرقة أو التلف النسب من الفيران وقد فطر المؤلف في ظاهرة مفيدة للغاية نظرا إلى اتساع المساحة المتنامة على التجارب . وأمدنا أيضا حضرة المفتي عبد الفتاح نور افندي والمدير العام ربيع نظارى بك ومستر سيون ز جرون بأرائهم النافعة ومساعدتهم المتواصلة .

وتدل نتائج السنة الأولى في المطاعة على وجود زيادة قليلة في محصول القصب كلما ضاقت المسافات بين الخطوط كما دلت على وجود هبوط ضئيل في السكروز وزيادة في نسبة الجلولكوز ، ولكن الفروق صغيرة جدا لدرجة أنها تعد أقل من الخطأ المسموح به في التجارب ولذا لأنها ليست بذات معنى من الوجهة الإحصائية إلا من حيث دلالتها مع أنه ليست هناك فائدة اقتصادية من تغيير القاعدة التي سار عليها المصريون من تخطيط الأرض بمعدل تسعة خطوط في الفد بيتين . وقد غلت المسافات العادية في ملوى أحسن غلة من القصب وهنا أيضا كانت أضيق المسافات أقلها نسبة في السكروز ولكن الاختلافات كانت قليلة أيضا لدرجة أنها ليست بذات أهمية . وفيما يختص بقصب السنة الثانية فإن كلا المجموعتين من التجارب لم يستدل منهما على زيادة في المحصول كلما اقتربت المسافات (فاقت أضيق المسافات على المسافات العادية بما لا يزيد عن ربع طن من القصب في الفدان) وكانت أحسن نسبة للسكروز في القصب المزروع على المسافات العادية تفوق قليلا عن غيرها . في حين أن المتوسطات التي أخذت للأربعة المحاصيل (القسم رقم ٣ في جدول رقم ٦) تدل على تفوق نتائجها تفوقا ضئيلا على طول الخط كما تدل على أن تخطيط الأرض بتخطيطا عاديا بمعدل تسعة خطوط في القصبتين أتى بأحسن غلة من حيث المحصول والسكر والنقاوة وبأدناها من حيث نسبة الجلولكوز .

تجارب كوم أمبو — أقيمت في أربع مناطق متباينة ، وزعت توزيعا شاسعا بحيث اشغلت على ترات تدرجت من أجود الأراضي إلى أردنها في هذه المزرعة المترامية الأطراف وأقيمت التجارب في قطع سبعة قبلى وكوم أمبو يجرى على أرض خصبة جدا وذات تربة غريبة متناسقة . مع تفوق تربة الناحية الأولى تفوقا قليلا من حيث التناسق مع أن أرض الناحيتين تعتبران من الدرجة الأولى كما يتضح من المحاصيل الهائلة التي جنت منهما . وتربة الرغامة الشرقية تربة خصبة . طينية متناسقة بلينا أخبرت أرض التجارب في عباسية من بين أفقر الترات الزراعية إذ كانت غير متناسقة (من الوجهتين الكيميائية والطبيعية) وذات تربة طينية مخاسكة تماسكا شديدا ، وأقل من متوسط الحصب في كوم أمبو . وقد رؤى أن ست مكررات كخيلة بتوزيع القطع على التجربة توزيعا ملائما ولكن اتضح من الإحصاءات

# جدول رقم ١٣

## تجارب التخطيط بمباسة

قصب السنة الأولى - قطع في ٢٩ مارس سنة ١٩٣٤

عدد الخسوط في القصين	أرقام القطع (١-٢ فدان)	ناتج القصب بالقناطر (الفنتار = ١٠٠ رطل)	غنى القصب بالسكروز	درجة التآوة	نسبة الجلكوز
٨	١ - ١	١٦٠٠٤	١٥٢١	٨٦٥	٣٦
٨	٥ - ١	١٢١٦٠	١٥٦١	٨٦٣	٢٨
٨	١٠ - ١	١٥٠٤٤	١٥٤٨	٨٥٦	٣٥
٨	١٦ - ١	١٨٤٩٣	١٥٩٠	٨٥٨	٣٤
٨	١٩ - ١	١٧٣٣٨	١٥٠٨	٨٥٦	٣٨
٨	٢٣ - ١	١٩٧٢٩	١٤٥٤	٨٥٢	٤٢
المجموع والمتوسطات ...					
٩	٢ - ١	١٣٦٥٣	١٤٦٦	٨٥٠	٤٧
٩	٦ - ١	١٢٤٣١	١٤٨٤	٨٤٩	٣٧
٩	٩ - ١	٢٠٣٤٧	١٤٨٤	٨٧٥	٢٥
٩	١٣ - ١	١٨٦٠٠	١٥٣٩	٨٧٥	٣٣
٩	١٧ - ١	١٦٨٤٤	١٥١٧	٨٤٠	٣٣
٩	٢٢ - ١	٢١٣٢٤	١٤٨٢	٨٦٤	٣٧
المجموع والمتوسطات ...					
١٠	٣ - ١	١١١٤٧	١٥٠٩	٨٦١	٢٧
١٠	٨ - ١	١٧٦٩٨	١٥٦٨	٨٥٨	٢٣
١٠	١٢ - ١	٢١٤٠٤	١٣٩٣	٨٤٥	٤٤
١٠	١٤ - ١	٢٠٠٩٣	١٤٥٠	٨٥٦	٣٣
١٠	١٨ - ١	١٧٦٤٩	١٥٠٢	٨٥٦	٤٠
١٠	٢١ - ١	١٩٨١٨	١٤٤٩	٨٥٥	٤٢
المجموع والمتوسطات ...					
١١	٤ - ١	١٣٥٧٨	١٥٠٨	٨٥٦	٣١
١١	٧ - ١	١٨٦٨٩	١٤٤٥	٨٤١	٣٩
١١	١١ - ١	١٩٢٣٨	١٤٠٥	٨٤٤	٤٧
١١	١٥ - ١	٢٢١٠٧	١٤٨٠	٨٦٥	٣٦
١١	٢٠ - ١	١٩٤٥٨	١٤٦١	٨٥٧	٣٦
١١	٢٤ - ١	١٩٧٨٢	١٤٦٧	٨٥٢	٣٨
المجموع والمتوسطات ...					
١١	٤ - ١	١١٢٩١٢	١٤٦١	٨٥٣	٣٨

# جدول رقم ١٢

## تجارب التخطيط بكوم أمبو

قصب السنة الأولى - قطع في ٢٠ مارس سنة ١٩٣٤

عدد الخسوط في القصين	أرقام القطع (١-٢ فدان)	ناتج القصب بالقناطر (الفنتار = ١٠٠ رطل)	غنى القصب بالسكروز	درجة التآوة	نسبة الجلكوز
٨	٢ - ١	٢٠٦٨٥	١٢٩٨	٧٦٦	١٠١
٨	٦ - ١	٢١٠٠٠	١٣٤٥	٨٦٦	٧٧
٨	١٠ - ١	١٥٧٢٠	١٣٧١	٧٨٧	—
٨	١٥ - ١	١٩٨٨٩	١٣٦٠	٨١٣	٩٩
٨	١٩ - ١	٢١٢٧١	١٣٤٠	٨٠٩	٧٣
٨	٢٣ - ١	٢١٢٣٢	١٣٣٤	٨١٦	—
المجموع والمتوسطات ...					
٩	٣ - ١	٢١٨٥٣	١٢٧٤	٧٧٥	١١٠
٩	٧ - ١	٢١٧٧٣	١٢١٢	٧٧٧	١١٤
٩	١١ - ١	١٧١٦٦	١٣٧٣	٨٥٨	٥٣
٩	١٦ - ١	٢١٧٧٨	١٣٥١	٨١٥	—
٩	٢٠ - ١	٢٣٠٤٠	١٣٢٧	٨٠٢	٨٥
٩	٢٤ - ١	٢١٤١٣	١٣٢٢	٨٠٥	—
المجموع والمتوسطات ...					
١٠	٤ - ١	١٢٦٩٧٣	١٣٠٩	٨٠٥	٩١
١٠	٨ - ١	١٨٣٦٥	١٣١١	٧٧١	١٠٧
١٠	١٢ - ١	١٩٤٠٩	١٤٠٨	٨٠٠	٩٢
١٠	١٦ - ١	١٩٧٩١	١٤٣٩	٨١٧	٧٨
١٠	٢٠ - ١	٢١٦٣١	١٣٣٤	٧٩١	٩٨
١٠	٢٤ - ١	٢١٣٨٢	١٤٠٤	٨٣٩	—
١٠	٢٨ - ١	٢٢٦٧٦	١٣٢٤	٨٢٥	—
المجموع والمتوسطات ...					
١١	٤ - ١	١٢٣٢٥٤	١٣٧٠	٨٠٧	٩٤
١١	٨ - ١	٢٠٨٤٠	١١٩٧	٧١١	١٦٤
١١	١٢ - ١	٢٠٦٤٩	١٣١٤	٧٩٣	٨٦
١١	١٦ - ١	١٩١٦٠	١٣٤٣	٧٩٤	١١٣
١١	٢٠ - ١	٢٢٨٥٣	١٢٥٤	٧٧٦	١٠٥
١١	٢٤ - ١	٢١٠٢٧	١٤٦١	٨٢٥	—
١١	٢٨ - ١	٢٢٤٤٠	١٣٣٤	٨١٧	—
المجموع والمتوسطات ...					
١١	٤ - ١	١٢١٩٦٩	١٣١٧	٧٨٦	١١٧

جدول رقم ١٥

محارب التخطيط برغامه شرق

قصب السنة الأولى — قطع في ٢٣ مارس سنة ١٩٣٤

عدد الخراط في القصبين	القطع (١ فدان)	الناتج بالقطاير (القطاير = ١٠٠ رطل)	غنى القصب بالسكرز	درجة القاطرة	نسبة الخلوكون
٨	٢ — ١	١٨٧,٢٠	١٣,٠٠	٨٣,٤	٤,٤
٨	٦ — ١	١٥٤,٥٨	١٣,٨٩	٨٣,٤	٤,٢
٨	١٠ — ١	١٩٩,٥١	١٣,٣٩	٨١,٧	٥,٠
٨	١٥ — ١	٢١٤,٢٢	١٢,٥٥	٨١,٥	٥,٠
٨	١٩ — ١	١٧٦,١٨	١٣,٥٩	٨٣,٢	٥,٥
٨	٢٣ — ١	٢٠٠,٦٤	١١,٥٨	٧٨,٧	٦,٨
المجموع والمتوسطات ...					
٩	٣ — ١	١٩٠,٠٠	١٢,٨٣	٨٠,٦	٦,٧
٩	٧ — ١	٢١٨,٥٨	١٣,٣٠	٨٢,٩	٥,٥
٩	١١ — ١	١٩٠,٢٢	١٥,٠٣	٨٢,٢	٧,١
٩	١٦ — ١	٢٠٠,٠٠	١٢,٩٧	٨٢,٤	٤,٦
٩	٢٠ — ١	١٨٨,٤٤	١٣,٢٨	٨٣,٢	٥,٦
٩	٢٤ — ١	١٧٩,٧٨	١١,٤٢	٧٨,٣	٧,١
المجموع والمتوسطات ...					
١٠	٤ — ١	١٧٠,٢٧	١٣,٧٧	٨٢,٢	٤,٥
١٠	٨ — ١	٢٠٤,٩٣	١٢,٧٠	٨١,٧	٥,٩
١٠	١٢ — ١	١٧٨,٨٩	١٢,٢٤	٨٠,٣	٥,٢
١٠	١٣ — ١	٢١١,٢٦	١٣,٢٥	٨٣,٥	٥,٧
١٠	١٧ — ١	٢٠١,٥١	١٣,٢٨	٨٣,٢	٣,٢
١٠	٢١ — ١	١٧٦,٩٣	١١,٥٢	٧٨,٨	٦,٦
المجموع والمتوسطات ...					
١١	١ — ٥	٢٠٤,٧١	١٢,٧٩	٨١,٦	٥,٢
١١	٥ — ٥	١٥٩,٦٥	١٢,٣٦	٨٢,٢	٤,٠
١١	٩ — ٥	١٩٣,٨٦	١٢,٥٣	٧٧,٤	٨,٣
١١	١٤ — ٥	١٨٨,٥٨	١٣,٢٥	٨٣,٥	٥,٤
١١	١٨ — ٥	٢١٢,٨٠	١٢,١٤	٨١,٠	٥,١
١١	٢٢ — ٥	١٩٢,٥٣	١١,٥٨	٧٨,٧	٦,٤
المجموع والمتوسطات ...					
١١	١ — ٥	٢٠٤,٧١	١٢,٧٩	٨١,٠	٥,٨

جدول رقم ١٤

محارب التخطيط بسبعة قبلي

قصب السنة الأولى (بكر) — قطع في ٤ أبريل سنة ١٩٣٤

عدد الخراط في القصبين	القطع (١ فدان)	الناتج بالقطاير (القطاير = ١٠٠ رطل)	غنى القصب بالسكرز	درجة القاطرة	نسبة الخلوكون
٨	١ — ١	٢١٠,٣٦	١٤,٠٨	٨٥,٠	٥,٣
٨	٥ — ١	٢٢٥,٣٨	١٣,٤٠	٨٣,٩	٥,٩
٨	٩ — ١	٢١٠,٨٠	١٤,٣٧	٨٣,٠	٦,٢
٨	١٦ — ١	٢٢٥,٣٨	١٣,٧١	٨٣,٦	٤,٥
٨	٢٠ — ١	٢١٠,٢٢	١٤,٤٢	٨٥,٧	٣,٩
٨	٢٤ — ١	٢١٧,٠٢	١٣,٣٦	٨٣,٤	٤,٩
المجموع والمتوسطات ...					
٩	٢ — ١	٢٠٧,٦٤	١٤,٨٦	٨٦,٦	٥,١
٩	٦ — ١	٢٢٦,٩٣	١٣,٢٤	٨٢,٧	٣,٥
٩	١٠ — ١	٢٣٨,٥٣	١٤,٥٣	٨٣,٩	٤,٥
٩	١٣ — ١	١٩٢,٨٠	١٤,٧٧	٨٣,٧	٣,٤
٩	١٧ — ١	٢٢٤,٨٠	١٣,٩٤	٨٢,٩	٥,٨
٩	٢١ — ١	١٩٤,٥٨	١٥,١٥	٨٤,٩	٣,٦
المجموع والمتوسطات ...					
١٠	٣ — ١	٢٢٠,٥٨	١٤,٠٣	٨٣,٤	٤,٣
١٠	٧ — ١	٢٠٨,٤٩	١٤,٥٦	٨٥,٦	٤,٩
١٠	١١ — ١	٢٣١,١١	١٤,٢٨	٨٤,٧	٣,٨
١٠	١٤ — ١	١٩٦,٥٨	١٥,٩٥	٨٦,٧	٣,٠
١٠	١٨ — ١	٢٣٥,٨٢	١٣,٨٧	٨٤,٠	٤,٣
١٠	٢٢ — ١	١٩٦,٥٣	١٥,١٨	٨٥,١	٣,٦
المجموع والمتوسطات ...					
١١	٤ — ٥	٢١٧,٧٦	١٣,٧٨	٨٤,٢	٣,٩
١١	٨ — ٥	٢١٥,٠٧	١٥,٠٦	٨٦,٩	٤,٤
١١	١٢ — ٥	٢٣١,١١	١٣,٧٢	٨٢,٤	٣,٨
١١	١٥ — ٥	١٩٣,٩١	١٤,٠٩	٨٤,٠	٤,٣
١١	١٦ — ٥	٢٠١,٤٢	١٤,٢٥	٨٢,٥	٦,٧
١١	٢٣ — ٥	٢٢٢,٦٧	١٣,٢٠	٨١,٥	٥,٠
المجموع والمتوسطات ...					
١١	٤ — ٥	٢١٨,٩٤	١٤,٠١	٨٣,٧	٤,٧

جدول رقم ١٦

متوسط نتائج الأربع تجارب بكم أمبو (فصل السنة الأولى)

عدد الميوط في القصبين	٨ - ١			٩ - ٢			١٠ - ٣			١١ - ٤		
	درجة القشور	نتج القصب بالسكر	نتج القصب بالقشور	درجة القشور	نتج القصب بالسكر	نتج القصب بالقشور	درجة القشور	نتج القصب بالسكر	نتج القصب بالقشور	درجة القشور	نتج القصب بالسكر	نتج القصب بالقشور
النتج (مقارنة)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
كوم أمبو بحري	١١٩٧.٨٧	١٣٤١	٨١٠	١٢٦٩.٧٣	١٣٠٩	٨٠٠	١٣٣٢.٥٤	١٣٧٠	٨٠٧	١٣٦٩.٦٩	١٣٦١٧	٧٨٦
جانبه	٩٨٧.٦٨	١٣٢٠	٨٣٥	١٠٣١.٩٩	١٤٦٥	٨٥٨	١٠٧٨.٠٩	١٤٦٧٨	٨٥٠	١١٢٩.١٢	١٤٦١	٨٥٢
ساحل قل	...	...	...	١٢٥٢.٢٨	١٥٣٩	٨٤٨	١٢٦٩.١١	١٤٦٨٤	٨٤٩	١٢٨١.٩٤	١٤٠١	٨٣٧
بناقه شرق	...	...	...	١١٦٧.٠٢	١٣١٤	٨١٥	١١٤٥.٩٩	١٢٧٩	٨١٦	١١٥٢.١٣	١٢٦٢١	٨٠٥
المتوسطات	...	...	...	١١٨٣.٠٠	١٣٨٩	٨٣٢	١١٨٦.٠٥	١٣٦٨٨	٨٣٢	١١٩٥.٧٢	١٣٥٥	٨٣١

وفي كل من كوم أمبو بحري والرافعة شرق أُنقِمت الزراعات العادية (٨٠ سنبمترًا) فصبًا أكثر بقليل من المسافات الأخرى، في حين أن زراعة سبعة قبل ذات المسافات الواسعة هي الحالة الوحيدة التي زاد فيها المحصول زيادة قليلة ليست بذات أثر كبير. وفي عباسية حيث لاحظنا أننا أن أضيق الزراعات مسافة شملت القطع التي فاقت المتوسط في خصب تربتها زاد محصولها عن الزراعات الواسعة المسافات زيادة كبيرة. وكانت درجة الشفاة أدنى ما يكون دائما في العصارات الناتجة من القصب المزروع على مسافات ضيقة ولو أن الفرق كانت ضئيلة وليست بذات أثر كبير من الوجهة الإحصائية. وبيدنا نجد محصول القصب في القصبين، نرى أن المتوسط النهائي لمحصول القصب المزروع على أبعاد المسافات بقل بما يقرب من ١/٢ طن وهو كما حدث في المطاعة وملوى كما يبين من القسم الأخير في الجدول رقم ١١. ويكاد يميز هذا الميوط في الحصول إلى أوسع المسافات في المتوسطات المشتركة بتجارب كوم أمبو (القسم الأخير من الجدول رقم ١٦).

وبعض ملخص البيانات المدونة بالجدول رقم ١٧ يتبين أن نتائج قصب السنة الثانية تكاد تشابه نتائج السنة الأولى في كل تجربة على حدتها ولو أن ذلك يخالف لما حدث في كل من المظاهرة وراوى حيث قصت غلة القصب قليلا في السنة الثانية عن السنة الأولى . ولم تكن الفروق بين تجارب المصارة كبيرة كما أنها لم تتغير مطلقا كما يتضح جليا من متوسط أرقام ( القمح الخامس ) الثمانية المحاصيل ( المحصولات الناتجة من الأربع التجارب في السنتين الأولى والثانية ) حيث بلغ أقصى الفرق في محتويات السكر نصف درجة وللنقاوة خمساً درجة وبالجلوكوز نصف درجة فقط . ويلاحظ على الرغم من عدم وجود شواهد معروفة أن أصبى المخطوط أنتجت نصبا من النوع الذى يحتوى على أقل متوسط من السكرز والقاوة وأعلاها نسبة من حيث السكر المذول .

وقد أنتجت أصبى القطع خطوطا ( ١١ خطا في القصبين ) محصولا يكاد يزيد متوسطه السنوى بنحو طن واحد من القصب ( الأقل في الجودة بدرجة بسيطة عن القطع المخططة ) تخطيطا عاديا ( ٩ خطوط في القصبين ) مما يؤدي بوجه عام زيادة خصب تربة القطع الواقعة في منطقة عباسية ، التي هي أصبى القطع خطوطا .

وإذا حسبتا حساب الخطأ التجريبي العظم في عباسية فإن هذا التباين لا يكون له شأن يذكر ، وقد يقدر ، على أى حال ، بما يوازي زيادة النقاوة التي تستلزمها تخطيط المخطوط الزائدة وكذا نحن التقاوى اللازمة لها وتكاليف زراعتها . فضلا عن ذلك فإن مثل هذه الزراعة الضيقة المسافات جدا ليست مألوفة وغير عملية ، كما يقول مسيو مزارعى في تقريره السنوى عن شركة كرم أمبو في سنة ١٩٣٣ - ١٩٣٤ وذلك للأسباب الآتية :

( ١ ) صعوبة الزرع على عمق مضبوط .

( ٢ ) مرور الرجال والحيوانات المشغلة بالزراعة يكون أدعى الإضرار بالخلفة .

( ٣ ) في الأراضي الضيقة والترات الغير المتناسقة يصل مثل هذا الخطأ عادة الى درجة كبيرة مما يجعل الناتج غير ملائمة للتجارب الإحصائية ، أو كما يقصر جرسى وحليل وضمان ، في نشرهم الفنية رقم ٢٢ لوزارة الزراعة بأن " أهم ظاهرة للتجارب المقامة في أرض ضيقة هي أن الاختلاف الناتج عن الخطأ يكون عظيما جدا لدرجة أن المعاملة لا يكون لها أثر هام من الوجهة الإحصائية ولا يوجد في الحقيقة أى اتجاه لاقامة هذه التجارب " .

وإذا استثنينا منطقة عباسية ، التي تم تجنب الوجود بجهة ترات أخرى مثله لزراعة كرم أمبو فليس هذه التجارب لما أكتننا عمل المقارنات بسهولة ، فإن الأراضي التي أقيمت عليها هذه التجارب كانت بدون شك أكثر محصولا من متوسط سائر الأراضي المصرية التي تنتج القصب ، وعلى ذلك يجب اعتبار متوسط الأرقام ، بالنظر الى منطقة زراعة القصب عموما أقل من ذلك .

## جدول رقم ١٧

تجارب التخطيط بكم أمبو - ملخص نتائج الأربع التجارب

عدد المخطوط في القصبين	قصب السنة الثانية	متوسط المحصولين	غنى القصب السكرز	النقاوة	نسبة الجلوكوز (السكرز الأملر %)

قصب السنة الثانية ١ - كرم أمبو بحرى قطع ٤ مارس سنة ١٩٣٥

٨	١٠٥١ر٢٣	١١٢٤ر٥٥	١٣ر٤١	٨٣ر٩	٥ر٣
٩	١١٢٥ر٣٨	١١٩٧ر٥٦	١٣ر٧٣	٨٣ر٣	٥ر٥
١٠	١١٠٩ر٣٤	١١٧٠ر٩٤	١٣ر٥٩	٨٢ر٢	٥ر٧
١١	١٠٨٦ر١٤	١١٥٢ر٩٢	١٤ر٠٠	٨٣ر٠	٥ر٢

قصب السنة الثانية ٢ - عباسية قطع ٢٣ فبراير سنة ١٩٣٥

٨	٩٤٠ر٥٣	٩٦٤ر١١	١٣ر٣١	٨٣ر٤	٥ر١
٩	١٠١٢ر٧١	١٠٢٣ر٣٥	١٢ر٧٩	٨٢ر٣	٥ر٤
١٠	١٠٢٤ر٨٠	١٠٥١ر٤٥	١٢ر٦٨	٨١ر٩	٥ر٤
١١	١٠٥٧ر٧٨	١٠٩٣ر٤٥	١٢ر٥٩	٨٢ر٠	٥ر٤

قصب السنة الثانية ٣ - صباح قبل قطع ٣٠ يناير سنة ١٩٣٥

٨	١٠٧٧ر١٩	١١٨٨ر١٩	١٣ر٣٧	٨٠ر٣	٧ر١
٩	١٠٣١ر٣٢	١١٥٣ر٣٠	١٣ر٣٤	٨٠ر٣	٦ر٨
١٠	١٠٣٤ر٤٥	١١٤٦ر٧٨	١٣ر٣٩	٨١ر٩	٧ر١
١١	١٠٦٤ر٦٢	١١٢٣ر٣٨	١٣ر٤٦	٨٢ر٠	٧ر٢

قصب السنة الثانية ٤ - رغامه شرق قطع ٢٨ مارس سنة ١٩٣٥

٨	١١٠٧ر٦٨	١١١٤ر٩٩	١٣ر٣٧	٨٢ر٦	٥ر٤
٩	١١٣٦ر٣٤	١١٥١ر٦٣	١٣ر٨٩	٨١ر١	٦ر٠
١٠	١١٣٣ر٥٤	١١٣٨ر٧٧	١٣ر٠٣	٨٣ر٠	٥ر٩
١١	١١٤٢ر٩٢	١١٤٧ر٥٣	١٣ر٩٥	٨١ر٧	٥ر٩

٥ - المتوسطات السنوية للأربع التجارب معا

٨	١٠٤٥ر١٦	١٠٩٧ر٩١	١٣ر٥٠	٨٢ر٩	٥ر٧
٩	١٠٧٦ر٤١	١١٣١ر٢١	١٣ر٤٢	٨٢ر٤	٥ر٩
١٠	١٠٧٣ر٧٨	١١٢٦ر٩٩	١٣ر٤٤	٨٢ر٦	٥ر٨
١١	١٠٨٧ر٨٧	١١٥٤ر٣٠	١٣ر٣٨	٨٢ر٢	٦ر٢





ويعطى القدان من الزراعات العادية المخططة على بعد ٨٠ سم ، متوسطا سنويا زائدا عن الزراعات المخططة على بعد ٧٠ سم بمقدار خمس طن من القصب المتفوق في كمية السكر تفوقا ضئيلا ، أما الزراعات الأبعد مسافة من ذلك فإن الزيادة في محصولها قد تكون هامة فتبلغ ١ ١/٢ طن .

### النسبة

يستخلص من نتائج أبحاثنا في مسافات القصب ، أن الزارع المصرى قد أوصنته تجاربه إلى أفضل المسافات في زرع القصب ، وكان وصوله إلى هذه الدقة في التخطيط اعتباطا على غير أساس علمية كما حدث في القطن ، وفيما يختص بالحالة الأخيرة . دون تيموثون (Templeton 198) ملاحظته الآتية :

” إن المسافات التي وجد بولز (Bulls) أنها تقل أقصى ما يكون من المحصول ، والتي يرجع الفضل فيها إلى الزارع الذي يقال أنه هو الذى أوجدها لنفسه — ظلت ثابتة لا تتغير من الوجهة العملية “ .

والحق أن أرقامنا تدل دلالة قاطعة على أنه ليس هناك ، فيما يختص بصنف القصب السائر في مصر في الوقت الحاضر — ما يدعو إلى تعديل المسافات العادية التي توصل إليها زراعتنا قبل الآن وهي ٩ خطوط في القصبين (حوالي ٨٠ سم) .

### الخلاصة

هناك بعض اعتبارات عامة فيما يختص بالمسافات التي يزرع عليها القصب ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالتفريع أو الخلفة أو الأقطار الشبيهة بالاستوائية ، وأهمية النمو الأول في مستقبل فصلها المحدود بوقت معلوم . والإنبات هو الذى يمين في وقت المحصول ، السن النسبي لتكاثر النباتات (تضام) في حقل القصب المتسع المسافات في القطر الشبه الاستوائى مما يتسبب عنه وجود مقدار هائل من العيدان الفجة التي تقلل كثيرا من متوسط قيمة السكر في المحصول .

وقد نال كثيرا في أهمية توفير الضوء والهواء لعيدان القصب ، نظرا إلى أن الأوراق هي التي تحتوي على ” معامل “ النبات أما العيدان فتعتبر مخازن للسكر المتركز المفروض .

وليس الإقلاع عن تجريد العيدان الناضجة من أوراقها إلا نتيجة مباشرة لظهور هذه الحقيقة ظهورا تدريجيا كما أشفقت دائما طرق توسيع المسافات توسيعا غير مالوف ، كما حدث في طرق زاياس وأبرو وكوبا . ولم تصبح نظاما ثابتا لهذا السبب نفسه .

ومنذ أن أثبت موسك (Soucek) ، في سنة ١٩٢٢ ، العلاقة الرياضية (الحسابية) بين المحصول وكثافة النباتات ، انتشرت التجارب في جميع أنحاء الدنيا فانضح أنها الحد الأقصى للمحصول ولا كمية السكر يمكن الحصول عليها بتوسيع مسافات بغير السكر .

وبينا ثبت من التجارب العملية في جميع الأقطار التي تزرع القصب ، أن ازدياد الغلة في القصب والسكر يمكن بلوغها بتضييق المسافات ، اتجهت الأفكار الغربية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الآلات الميكانيكية نظرا إلى قلة الأيدي العاملة وغلوها ، إلى جعل أبعاد المسافات تتفق ومروء الحيوانات أو الجرافات التي تجر الآلات الزراعية الميكانيكية . وقد نشأ عن هذا الموضوع السؤال الآتي وهو : ألم ينتج من استعمال تلك الآلات ذات الأهمية الموهومة أية عوامل ضارة كالإنطاف في العرق وتأخير تضام القصب وما ينعجم عن ذلك من اختلال في الميزان الاقتصادي الدقيق فيما يختص بالمفقات النسبية التي يتكادها الطن من المحصول .

لقد شهد هذا القرن تغيرات جوهرية فيما يختص بالعرق كركن أساسى في الزراعة وهو ضرورة لازمة للنبات في امتصاصه للغذاء امتصاصا صحيحا بواسطة الجذور وتقليل الرطوبة التي تفقدها الشمرات وغير ذلك . وكثير من البحوث القديرين في الوقت الحاضر ، يعتبر تنقية الحشائش من أهم وسائل الزراعة (وهي تختلف بطبيعة الحال عن الحرق الذي يسبق الزراعة ونمو البزور في الأحواض المقسمة تقسيما منسقا) و يرون أنه باستعمال الغرشة النباتية والتسميد والرى المتواليين بقصد تمجيد تضام القصب في الخطوط ، تقل نفقات إزالة الحشائش لدرجة كبيرة بدون عرقلة ما للمحصول في أثناء نموه .

والحقيقة أن الإقلال من إصابة الجذور في أثناء الزراعة يجعل القصب عادة ينمو مضطربا وينتج محصولا جيدا بنفقات زائدة . وتدل الأبحاث المستنفة إلى أعريت على قصب السكر في هاواي وكوبا والهند وجزائر الفلبين وترينيداد وجاوة وكذا التجارب التي أقيمت في الولايات المتحدة على الذرة ، وهو من نفس الفصيلة النباتية ، على أن العرق الأول من عرق الأرض حول القصب المزروع إنما هو تنقية الحشائش التي تراحم القصب في غذائه وليس القصد من العرق جعل الغذاء أكثر ملائمة للنبات بتنسيق تقسيم التربة حول الجذور .

وقد أتينا على وصف التقسيم والاجراءات الأخرى التي اتبعت في التجارب الشطرنجية الست المقامة على المسافات في ملوى والمطاطة وكوم أمبو كما ذكرنا البيانات التفصيلية والإجمالية التي أخذت من المحصول في سنتي ١٩٣٤ و ١٩٣٥ وانضح منها أنه ليس هناك ما يبعث على تغيير النظام القاضى بتخطيط الأرض بمعدل ٩ خطوط في القصبين (حوالي ٨٠ سم) وهو النظام الذى وصل اليه الزارع المصرى بتجاربه الدقيقة التي لم يتم على أساس علمية وهذه التجارب العملية نفسها هي التي أوصته تدريجيا إلى أفضل المسافات في زرع القطن .

- (21) DAMBERG, H. W.—Sugar Beet Stands in Sweden. Through the Leaves Mar., 1935, pp.60-2.
- (22) DASO, J. SYN.—Administrative Rept. of Dir. of Agriculture. Brit Guiana, 1930-32.
- (23) DESER, NORL.—Cane Sugar. London, 1921.
- (24) .....—AND ATKINS—Cane Cultivation in North India. Proc. Conf. I.S.S.C. Technols., III. Selya., 1929.
- (25) DELBERT, R.—La Canne à Sucre. Paris, 1884.
- (26) DEMANDT, R.—Planting Distances for Cane. (Trans. Tit.) Arch. Suikerrind. Ned.—Ind., XXXIX, Pt. III, Med. II, 1931; XLII, Pt. III, Med. 26, 1934.
- (27) .....—Field Tests on Width of Reynoso Ditches (Trans. Tit.). *Ibid*, XL, Pt. III, Med. 6, 1932.
- (28) DEVENTER, W. VAN.—De Cultuur van het Suikerriet. Amstam., 1914
- (29) DOBBS, H. H.—Rept. on Agr. Practice in So. African Sug. Industry. Proc. Assn. S. Af. Sug. Tees., VII, 1933.
- (30) DODEN, HANS.—Remarks on Cane Cultivation. *Ibid*, Philip. Sug. Assn., V. Manila, 1927.
- (31) DOGER DE SPIVILLE, M.—Comparative Study of Yields from Cane Co, tivation in Hawaii, Java and Mauritius. *Ibid*, Int. Soc. Sug. C. Technols. III, 1929.
- (32) DYK, J. VAN.—Tillage in Java. *Ibid*.
- (33) EAGLE, F. S.—Wide Spacing of Cane. Facts Abt. Sug., XIX, 1924
- (34) .....—Sugar Cane Cultivation. Jnl. Dept. Agr. Pto. Rico, VIII, No. 2, 1921.
- (35) .....—Sugar Cane and its Culture. N.Y., 1928.
- (36) EASTERBY, H. T.—Queensland Sugar Industry. Bur. Sug. Expt. Stas. Brisbane, 1933.
- (37) ECKART, C. F.—Repts. for 1932-04. H.S.P.A. Exp. Sta., Div. Ag. and Chem. Buls. 8-10, 1904-5. Stripping Experiments. *Ibid*, Buls. 11, 16 and 25 and Circ. 8, 1906-8.
- (38) .....—The Olao Weed Sprayer. Proc. Acl. Mtg. H.S.P.A. Indu., 1913, and Haw. Plots. Rec., X, 161-5, 1913. Paper Mulch. U.S. Patents 1,227,989, 1,219,355 and 1,274,527.
- (39) EDWARDS, PATRICK AND RAMAMURTI.—Cultivation of Combatore Seedling in South India. Mad. Agr. Dept., Bul. 30, 1932.
- (40) FOWLE, P.—Spacing of Lanes. Proc. Cerp. S. Af. Sug. Technols. Assn IX, 191-3, 1935.
- (41) GINNEKEN, P. J. H. VAN.—Influence of Stand (Trans. Tit.). Med. Inst. Skebiesteelt., V, I, 1935.

## المراجع


- (1) AGER, H. P.—The Implements of the Industry. H.S.P.A. Expt. Sta., Agr. Chem. Ser. Bull. 44. Hahu., 1914.
- (2) .....—The Sugar Planter Looks at Botany. Proc. H.S.P. A. Acl. Mtg., LII, 1932.
- (3) .....—Plantation Strategy. *Ibid*, LIII, 1933.
- (4) ANDREWS, W. R.—Tractors in Natal. Proc. So. Af. Sug. Technols. Assn., III, 1929.
- (5) BALLS, W. L.—Analysis of Agricultural Yield. Phil. Trans., B. Vol. 206 1915-16; 208, 1918.
- (6) BARBER, C. A.—Scientific Work in the Hawaiian Cane Fields. Int. Sug. Jour., XXXIII, 1931.
- (7) .....—Recent Advances in Plantation Research. *Ibid*, XXXIV, 1932.
- (8) BESSENGER, GEO. H.—Knowledge of Cane Roots and Application to Tillage Operations. Proc. Philip. Sug. Assn. Conv., VI, 1928.
- (9) BLOUIN, R. E.—Report for the Year 1901. H.S.P.A. Exp. Sta. Bull. 7, 1902.
- (10) .....—AND ROSENFELD. Memorias sobre los Trabajos de la Estacion. Experimental. Rev. Indstl. Agr. Tuc., I-IV, 1911-14.
- (11) BONAME, P. H.—Culture de la Canne à Guadeloupe. Paris, 1888
- (12) BOONE, ROY C. P.—*Ibid*. Min. Colonies, Pub. 263. Paris, 1926.
- (13) BREWBAKER, H. E.—Spacing Beets in the Row. Through the Leaves pp. 71, 6 May, 1935.
- (14) BRYAN, ROY.—Cultivation on Unirrigated Plantations. Proc. Assn. Haw. Sug. Technols., XI. Hahu., 1932.
- (15) CALVINO, MARIO.—El Sistema Abreu de Plantacion de Cana. Chaparra Agua, I, No.3, 1924.
- (16) CAZAUD, MARQUIS DE.—Précis sur la Canne. 1776.
- (17) CRAWLEY, J. T.—Miscellaneous Papers on Cane. Exp. Sta. B-I. Comm. Agr. P. Rico, Bull. 8, 1915.
- (18) CROSS, W. E.—Estudios Relacionados con la Experimentacion de la Cana. Univ. Tuc. Depto. Invests. Indstls., Inf. 5, 1918.
- (19) .....—Distancia a que se Debe Plantar la Cana. Rev. Indstl. y Agr. Tucuman, X, 1919; XI-XII, 1921; XIX, 1928-29. Plantacion en Hoyos *Ibid*, XXIV, 1934.
- (20) CROWTHER AND MAHMOUD.—Interaction of Factors in Egyptian Crop Growth. I. Roy. Agr. Soc. Egypt, Techn. Bull. 22, 1935.

- (64) LAPPSCHEITZ, E.—La Industria Azucarera Argentina. Cent. Azero. Nacl., 1928.
- (65) LOESIN CARLOS, L.—Tractors and Agr. Implements. Proc. Conv. Philip. Sug. Assn., V, 1927.
- (66) LOPEZ DOMINGUEZ, FCO. A.—Sugar Cane Growing in Puerto Rico. *Ibid* Intl. Soc. Sug. C. Technols., IV, S. Juan, 1932.
- (67) ..... TOERO, F.—Cana de Azucar. S. Juan, 1895.
- (68) LYMAN, O. H.—Recent Developments in Cultural Practices on Maui. Repts. Anl. Mtg. H.S.P.A., LII, Honolulu, 1932.
- (69) MARTENS, J.—Cultivation of Plant Cane by Intensive Methods. *Ibid* So. Al. Sug. Technols., V, 1931.
- (70) MASRY AND PATERSON.—The Tractor in Trinidad. Trop. Agr., IX, 1933.
- (71) MAXWELL, FRANCIS.—Economic Aspects of Cane Sugar Production. Ldn., 1927.
- (72) ..... WALTER.—Repts. for 1895-1901. H.S.P.A. Expt. Str., Div. Agr. & Chem., Bulls. 1-5, Hahaione, 1896-1902.
- (73) ..... Rept. Bur. Sug. Expt. Stas. Qnsld., 1904-5.
- (74) MAY, D. W.—Sugar Cane in Porto Rico. P.R. Expt. Sta. Bul. 9, 1910.
- (75) McCONNIE, R. C.—Cane Cultivation at Fajardo, Assa. Pto. Rico Sug. Technols., I, 1922.
- (76) ..... OREN AND DE CELIS.—Notes on Sugar Industry of Puerto Rico. *Ibid* Intl. Soc. Sug. C. Technols., IV, S. Juan, 1932.
- (77) MILNE AND ALI MOHAMMED.—Handbook on Field and Garden Crops of Punjab, 1932.
- (78) MIRASOL, J. J.—Research for the Sugar Industry in Philippines. Sug. News, XIII, 1932.
- (79) MOIR, W. W. G.—A Java Sugar Plantation. Facts Abt. Sugar, XXV, No. 3, 1930.
- (80) MUNIERTH, N. G.—Handbook of Indian Agriculture.
- (81) NEWMAN, J. A. R.—Sugar Cane and Sugar. Ldn., 1869.
- (82) FRINGLE, J.—Southern Sugar Experiment Station, Bundaberg. In Annl. Rept. Qnsld. Bur. Sug. Expt. Stations, XXXIV, pp. 41-2, 1934.
- (83) PRINSEN GIERVIGS, H. C.—Cane Cultivation in Java. Intl. Sug. Jour., VI, pp. 277, 336 and 381. Ldn., 1901.
- (84) QUINTUS, R. A.—*Ibid*. Ldn., 1923.
- (85) REYNOSO, ALVARO.—Ensayo sobre el Cultivo de la Caña. Habana, 1925.
- (86) RICHARDSON KUNTZ, PEDRO.—Cane Spacing Experiments. Pto. Ric. Rev. Agr., 1931.

- (42) RZ, A. J.—Cane Roots. Proc. Anl. Mtg. Assn. Cuban Sug. S., VI, 1932.
- (43) L. RENTON.—The Hole System of Planting. Sug. Cent. and Pitra. Inds., 1921.
- (44) L. C. J. VAN.—Bibliography of Tropical Agriculture. Rome, 1922.
- (45) ..... BARU.—Cane Cultivation by Mechanical Power. Facts Abt. Sug., XXII, 1927.
- (46) HOWARD, ALB.—Application of Science to Crop Production, 1929.
- (47) JENSEN, J. E.—Higher Tonnage with Closer Spacing. Farm Mgr., May, 1935.
- (48) JENSEN, JAS. H.—Studies of Root Habits of Cuban Cane. Trop. Plt. Resch. Found., Sci. Cont. 21, 1931.
- (49) KEOGH, F.—Interspaceing of Cane Rows. Proc. Qnsld. Soc. Sug. Cane Technols., IV, 1933.
- (50) KERR, H. W.—Tillage and Cultivation. Qnsld. Bur. Sug. Expt. Stas. Farm. Bull. 2, 1931.
- (51) KING, F. H.—Farmers of Forty Centuries. N.Y., 1895.
- (52) KLINGB, GERARDO.—La Industria Azucarera en Peru. Mtro. Fomento, Lima, 1921.
- (53) .....—*Ibid* del Hawaii. Soc. Nacl. Agra. Lima, 1928.
- (54) KOENIG, M.—Growth of Sugar Cane. Mauritius Dept. Agr. Sci. Bull. 13, 1929.
- (55) KONIGSBERGER, V. J.—Cane Cultivation and Field Operations in Java. Proc. Cong. Intl. Soc. Sug. C. Technols., III, Sbiya., 1925.
- (56) KRUGER, W.—Das Zuckerrohr und seine Kultur auf Java. Magdeburg und Wien, 1889.
- (57) KULESCHA, M.—Development of Root System of P.O.J. 2878 (Trans. Tit.). Arch. Sukerin. N.-I., XXXIX, pt. III, Med. 8, 1931.
- (58) LARSEN, L. D.—Statistical Information as Aid to Management on Plantations. Proc. H.S.P.A., I, 1930.
- ..... LER, H. ARH.—Distribution of Cane Roots in Hawaiian Soil. Plt. Physiol., I, 1926.
- .....—Work of Research Bureau of Phil. Sugar Assn. Sugar News, XII, 1931.
- ..... AND MEDALLA.—Structure of Cane Plant in Relation to Cultivation. Proc. Conv. Phil. Sugar Assn., VI, Manila, 1928.
- ..... AND WELLER.—Life of Seed-Piece Cane Roots and Progress at Different Ages. Plt. Physiol., II, 1927.
- LINDNER.—Influence of Stand on Yield and Composition (Trans. Tr. Cent. Suikerin. XLIII, No. 11, pp. 214—, 1935).

- (110) TURNER, P. E.—Cultivation Experiments with Cane. Proc. Cong. Int. Soc. Sug. C. Technols., IV, S. Juan, 1932.
- (111) VENKATRAMAN AND THOMAS.—Sugar Cane Root Systems. Agr. J. India, XVII, 1922, and Mem. Dept. Agr. India, Bot. Ser., XVI, 5, 1929.
- (112) VILLELLE, AGR. DE.—Rapport de Mission aux Iles Hawaïennes au Sujet de l'Industrie du Sucre. Réunion, 1911.
- (113) WALK, J. H.—Informe de las Subestaciones. Rev. Ind. Agr. Tuc., VI, 1915.
- (114) WALKER, H.—The Sugar Industry of the Island of Negros. Mala., 1910.
- (115) ..... ALB.—*Ibid* of Mauritius. 1910.
- (116) WEBSTER, J. N. P.—Width of Cane Rows in Various Countries. Haw. Plots. Rec., XXXV, 1931.
- (117) WILCOX, D. W.—El Cultivo de la Cana. Mundo Azero., XIX, 1931.
- (118) ..... Underlying Factors in Porto Rican Sugar Production. Facts Abt. Sug., XXVII, 1932.
- (119) WILLIAMS, C. HOLMAN B.—A Visit to West Indian Sugar Producing Islands. Br. Gua. Agr. Jour., IV, 1931.
- (120) ..... AND FOLLETT SMITH.—Field Expts. with Cane. *Ibid*, Sug. Bull. No. 1, 1933.

- (87) ROSENFELD, ARTHUR H.—Experimentos con Diferentes Anchuras de Trochas de Cana. Rev. Ind. Agr. Tuc., II, 1911. Memoria de la Estacion. *Ibid*, V, 1915.
- (88) .....—Some Epoch-Making Experiments in the Argentine. Sugar, Dec, 1919.
- (89) .....—Power Cultivation of Sugar Cane. Intl. Sug. Jour., XXII, 1920.
- (90) .....—The Question of the Distance between Cane Rows. *Ibid*, XXII, 1920, and XXIV, 1922.
- (91) .....—“Luz y Aire” en el Cultivo Moderno de la Cana. Rev. Agr. Pto. Rico, XIII, 1924.
- (92) .....—Tractor Cultivation of Cane. Facts Abt. Sugar, XX, 1925. How Old is Ten-Months-Old Cane? *Ibid*.
- (93) .....—La Plantacion de la Caña de Azúcar. La Henda., XX, 1925, and XXI, 1926.
- (94) .....—Cultivation of Cane in Peru. Intl. Sug. Jour., XXVIII, 1926.
- (95) .....—La Estacion Experimental de la Soc. Nac. Agraria de Peru. Pyeto. Pntdo. A la Soc. Lima, 1926.
- (96) .....—The Sugar Industry of Peru. Trop. Plt. Resch. Found., Sci. Cont. 6. Washgtn., 1926.
- (97) .....—*Ibid* of Honduras. Intl. Sug. Jour., XXIX, 1927.
- (98) .....—*Ibid* of Formosa. *Ibid*, XXXI, 1929.
- (99) .....—La Estacion Experimental de la Industria Azucarera de Java. Bol. Un. Panam., LXIV, 1930.
- (100) .....—Stripping for Light and Air. Facts Abt. Sug., XXV, 1930.
- (101) .....—Optimum Sugar Cane Planting Date in Egypt. Min. Agr. Techn. Bul. 156, 1935.
- (102) STUBBS, W. C.—Sugar Cane in Field and Laboratory. La. Agr. Expt. Stas., Bull. 14, 1892.
- (103) .....—Sugar Cane. N. Orhs., 1887.
- (104) .....—*Ibid*. Field and Lab. Results for Ten Years. La. Exp. Sta. Bull. 59, 1900.
- (105) SUTHERS, W. F.—Weed Control with Arsenic. Haw. Plots. Rec., X, 204, 1913.
- (106) TAGGART, W. G.—Tractor Cultivation. La. Pltr., IV-30-21.
- (107) TEMPANY, H.—Cultivation and Field Operations in Mauritius. Proc. Cong. Intl. Soc. S.C.T., III, 1929.
- (108) TEMPLETON, J.—Watering and Spacing Experiments with Egyptian Cotton. Muntry. Agr. Tech. Bull. 112, 1932.
- (109) TIEMANN, W.—Sugar Cane in Egypt. 1903.



الشكل رقم ١ — أخفاف حقل نصب بودووزيكو على مساحة ١٠٠ قدم (١٠٣٥ م) — حرات هراس .




الشكل رقم ٢ — من الدورات تكون المسافة بين المخطوط في كوة أقل من مترين أى ٣١ خطا في القصدين .



الشكل رقم ٣ — الخدمة الأرض توفر كثيرا من الأعمال التي تؤدي بعد المزارع — الجرار المعدى وهو  
يحرر عمرا إذا ثلاثة أمتار في ذلك يجتوب أفريقيا .




الشكل رقم ٤ — القصب المزروع على مسافات واسعة يكون بالبيع قابلا لأن تجرى فيه خدمة آلية، ملاحظة فوائده  
يحتاج الى زمن أطول حتى يكمل النمو ويتضام القصب فتصبح الخدمة غير ضرورية .



الشكر روه — الهند: الهندورى القصب فى هوارى موضع بين اكران سكايه والهندورى متباعدة بعد ايام ١٤٠ متر  
 وضع يري جليا انه اقل ال يه ابداء الهندورى الا انه غير مرئية ما سيحدث من الاضرار بالهندورى قلا من آجى (١)






الكلب رقم ٩ — طريق زينت في صحراء — الصفحة ٢٥٦٦٨ — من رافق الجرافيك من الصورة .



الشكل رقم ٧ — في لوزيانا *Louisiana* تبعد صفوف القصب بعضها عن بعض بسا يقرب من ضعف المسافة  
في مصر تقريبا وبغل القدان ما يقرب من نصف محصول القدان في مصر .



الشكل رقم ٨ — يقص حيز عرف في عصر بأن توضع صفوف في المهادين أي بترك ٨٠ سم مثلاً بين الصفوف على وجه التقريب .



الشكل رقم ٩ — في المطاعة كان يشحن محصول كل قطعة مكررة في عربتين من عربات السكة الحديدية وهذا يمثل العينة التي تمسح في معمل أرميت .

وزارة الزراعة

قسم تربية النباتات

النشرة الفنية

رقم ١٦٨

اختبارات خاصة

بوزن بعض أصناف مستوردة من قصب السكر

بم

ارثر ه . روزنفيلد

إخصائى الحكومة الخبير بقصب السكر

ترجمة

عبد المجيد افندى القمري

بسم الإرشاد الزراعى

أوصت لجنة المطبوعات بوزارة الزراعة بطبع هذه النشرة وإكبتها غير مسئولة عن الآراء المدونة فيها

طبعت بالمطبعة الأميرية بيولاقي بالقاهرة ، سنة ١٩٣٧

تباع مطبوعات الحكومة بصالة البيع بوزارة المالية — أما الكتابات  
الخاصة بهذه المطبوعات فيرسل رأسا الى قسم النشر بالمطبعة الأميرية  
الثمن ..... ٢٠ مليا



## اختبارات خاصة

### بوزن بعض أصناف مستوردة من قصب السكر

بفلم

أرثر هـ . روزنفلد

إخصائى الحكومة الخبير بقصب السكر

قد شهد ربع القرن الماضى عددا من الانقلابات فى الميادين الحربية السياسية تبعها تبدل فى الحدود الجغرافية و"مناطق النفوذ" وفى ذلك الوقت حصل انقلاب فى زراعة قصب السكر بجميع أنحاء الدنيا لا يقل حتما عن تلك الانقلابات إلا فى أنه لم يصحب بضرر الطبول ونفخ البوق اللذين هما من مميزات الانقلابات السياسية ، وكان زعماءه وهم القائمون بأعمال محطات تجارب قصب السكر فى عدة من البلاد الشجرة بزراعة القصب على اتصال مع الإدارة العامة لشركات القصب التابعين لها وهى التى تؤيدهم بالرأى والمسال . وأن وصول الشيوعيين بالروسيا والفاشيست بإيطاليا وحزب النازى بألمانيا إلى مقابله الأمور بعد أن لم يكن لهم ذكر ، ليس بأعظم من الانقلاب الزراعى الذى رفع الجزر الصغيرة بكاوه وهاوا إلى وبورتوريكو من مراكز ضئيلة نسبيا فى عالم القصب إلى مراكز الزعامة والرئاسة التى لا تنزع بين البلاد المنتجة للقصب والتى من بينها ما هو أوسع نطاقا وذو موقع ممتاز من أسواق العالم .

فى فجر القرن الحالى كانت جملة محصول القصب تزيد قليلا عن خمسة ملايين طن وعند بدء هذا الضيق الاقتصادى الشهير الذى لا يزال ضاربا أطنابه فى كافة أنحاء العالم زاد محصول القصب عن ١٨,٠٠٠,٠٠٠ طن .

ومنذ موسم سنة ١٩١١ - ١٩١٢ زاد إنتاج القصب فى جاوه من ١٣٩٥٠٠٠ إلى ما يقرب من ٣,٠٠٠,٠٠٠ طن وفى جزر هاواى من ٥٩٥٤١٢ إلى ١٠٢٩٠٠٠ طن وفى جزيرة پورتوريكو الصغيرة من ٣٦٧١٤٥ إلى مائون مليون طن بقليل .

ولقد كانت هذه الزيادات المدهشة تفقد أهميتها إذا كانت نسبة زيادة المساحات قاربت نسبة زيادة صافى السكر ولكن مظهر النجاح البارز إنما هو فى أن الإنتاج زاد زيادة عظيمة فى حين أن الزيادة فى المساحات لم تكن إلا ضئيلة جدا نسبيا . ذلك لأن مساحات القصب

محدودة في تلك الجزر كما هي الحال في مصر، فالمساحة محدودة في جاوه بمرسوم حكومي لكي يكون أغلب الأراضي الزراعية مخصصة للحصول الغذائية لسد طلبات الأهالي الذين يبلغون نحو خمسين مليوناً من الأشخاص. وفي هاواي الصغرى وبيورتوريكو لقللة المساحات الصالحة لزراع القصب وعلى ذلك فمعظم الزيادة في جملة محصول القصب آتية من العمل على زيادة غلته بالطرق العلمية. ومعنى هذا طبعاً أن نفقات إنتاج القنطار من القصب يجب أن يتعدها نقص مناسب لذلك إذ من البديهي أن نفقات زرع وخدمة القصب القليل الغلة، تادل ما ينقص في زراعة الحبوب الأكثر إنتاجاً أو تزيد على ذلك.

وقد ذكر الدكتور ف. م. كوتنيسبرجر (٨) \* المدير الزراعي لمحطة تجارب القصب بجاوه الشهيرة في سنة ١٩٢٩ أن متوسط الغلة في جاوه البالغ قدره ٢٠٠ قنطاراً تقريباً من القصب عن الفدان كان أكثر من ضعف المتوسط المتحصل عند ما شرعت محطة التجارب المذكورة في عملها. وقرىبا من هذا القدر في الزيادة كان نصيب متوسط الغلة سنة ١٩٣٣ في هاواي، البالغ قدره ١٣١٠ قنطاراً عن الفدان (١٤٩٦ عن الزراعات المروية) عند ما تأسست محطة تجارب القصب هناك في حين أن متوسط الغلة الحالي في بيورتوريكو البالغ قدره ٧٠٠ قنطاراً تقريباً من القصب عن الفدان يزيد على وجه التقريب بمقدار ١٢٠ ٪ عما كان عليه عند تأسيس محطة التجارب هناك في سنة ١٩١٠.

ونظرا لكون مصر بلد شبه استوائية ذات موسم نمو قصير عبارة عن ٨ ¼ إلى ٩ شهور فقط على العكس عما في تلك الجزر الاستوائية السالفة الذكر حيث يبقى المحصول قائماً من ١٤ إلى ٢٦ شهراً قد يكون من المفيد أن نبين هنا أن زراعة القصب الشبه الاستوائية قابلة نسبياً للتحسين كما هو الحال في أوق المناطق الاستوائية. عند ما أسست حكومة توكومان (الجمهورية الفضية) محطتها لتجارب القصب سنة ١٩١٠ كانت غلات القصب في تلك المنطقة تهبط هبوطاً مريعاً بسبب فناء المرض الفسيفسائي بالمحصول عند ذلك قامت تلك المحطة الجديدة فوراً باختيار مناعة مثاث من أصناف جديدة ضد هذا المرض وغلثا في الحقل ومعامل السكر الخ. ولما أوشكت صناعة السكر أن ينحى أثرها من تلك المنطقة حوالى سنة ١٩١٦ (فقد كان يجل غلة السكر في تلك السنة ٤٥٠٠ طن فقط) كان لديها تقاوى من عدة طراز معروفة بمناعتها ضد هذا المرض تكفى لإعادة زرع مساحة القصب بأكثرها (١١) وكانت النتيجة من هذا التغيير في الأصناف ومن التحسينات التي أمكن الوصول إليها في طرق الزراعة بوجه عام أن أتيحت المنطقة بعد عشر سنين ٣٧٥٠٠ طن من السكر إذ بلغ محصول الفدان في تلك الأثناء (١٥) ثلاثة أمثال ما كان عليه.

\* الأرقام التي بين قوسين تشير إلى المراجع المدونة بالمحق رقم ٢.

وفي السنة نفسها (١٩٣٩) أغرى المؤلف (٢٠) على العودة إلى لوزيانا التي حصل فيها نفس ما حصل في توكومان في حقول زراعة القصب حيث كان المرض الفسيفسائي ضارياً أظنا به حتى أدى إلى نقص إنتاج السكر في السنة التالية فهبط إلى ٤٦٠٠ طن فقط وبفضل الخبرة التي اكتسبها في الجمهورية الفضية في أحوال المناخ المماثلة أمكن إبطاء الصناعة في لوزيانا بدرجة سرية حتى أنه بعد ست سنين بلغ محصول السكر هناك ٢١٠٠٠ طن وبلغت غلة الفدان ثلاثة أمثال (٣٤) ما كانت عليه.

وأخيراً قد أدى إدخال القصب صنف P.O.J. ١٥ وشبوه بهمر إلى زيادة في محصول الفدان بلغ نحو ٣٠ ٪.

وتحمل معظم مشقة الكفاح في سبيل الحصول على غلات ممتازة في كل واحدة من هذه الجزر الذين قاموا بشيرة الأصناف وهم مربي النباتات الذين استنبطوا أصنافاً رئيسية ذات غلة كبيرة وقوة مناعة ضد الأمراض صالحة على وجه خاص للزراعة في بيئاتهم مثل صنف P.O.J. ١٠ ٢٨٧٨ "قصب جاوه المدهش" وصنف H ١٠٩ الذي بلغ الرقم القياسي العالي بإنتاج نحو ٥٠٠ قنطار من السكر (نحو ٣٢٠٠ قنطار من القصب) من الفدان في هاواي. وكذا صنف B.H. ١٠ (١٢) في بيورتوريكو إلا أن تغييرات الأصناف ليست معتبرة العلاج الوحيد لآفات الزراعة وكثير من النجاح والنصر في ميدان الكفاح الزراعي إلى العناية بالابتعاث وتحديد العوامل المهمة المؤثرة في زراعة القصب كأدق وقت للزرع وأدق المسافات وأدق مقادير التسميد وهلم جرا.

### استعراض مختصر للأصناف المصرية التي من أصل أجنبي

حتى أوائل القرن الحالي كانت أنواع القصب التي تزرع بقصد إنتاج السكر هي الأسود والمخطط والأبيض (كرستاليا) التي من نوع "تشربون" المعروفة بالأصناف البديلة في حين أنه كان يزرع بالوجه القبلي مقدار متوسط من الصنف الفرعوني اللين (الكريول) بقصد بيعه للص. وفي سنة ١٩٠٢ استحضرت جناب هنري نوس بك، الذي كان وقتئذ كيميائياً بمعمل سكر نجع حمادى، وهو الآن المدير العام للشركة المصرية العامة لصناعة السكر والتكرير من جاوه أحد عشر صنفاً من القصب لتجربتها بمصر ومن جملة صنف P.O.J. ١٥ الذي يعرف الآن بمصر لسبب خفى باسم القصب الأمريكاني وباسم القصب الكهربائي في الخارج

وقد بقي عدة سنين القصب الخوجى بالقطر المصرى وهو عمادنا فى المبالغة فى جميع تجاربنا الصنفية . وفضلا عن الصنف P.O.J. ١٠٥ قد أدخلت فى تلك السنة الأصناف الآتية وهى مانيسلا الأبيض والأسود والتشرييون والبوربون ولوزير والمخطط البورى وجاوه P.O.J. ٢٤٧ و ٢٣ و ٣٦ و ١٠٠ \*

وفى سنة ١٩٠٩ قد أدخلت بنجى حمادى ثمانية أصناف إضافية من جزيرة موريشس بالمحيط الهندى وهى تنا الكبير الأبيض والأسود وصنف بلدى معروف باسم فوتياجو M ٥٥ و ١٣٩ و ٢١٨ و ١٠٣٠ ( قصب المص الحبوب عند الجمهور المعروف فى مصر باسم خد الجبل ) و ١٩٠٠ ( برومات . وفى السنة التالية ١٩٠٠ ( برومات ) . وفى السنة التالية حصلت مصر على P.O.J. ٣٢٠ من جاوه وعلى O.I. ٥٢ و F ٩٠ وفى سنة ١٩٢٠ استوردت آخر رسالة عظيمة من جاوه وكانت تتضمن الأصناف الآتية :

٦٦ B.	بالتجانج	P.O.J. ١٥٠٧
١٤٨ B.	لاهيا	P.O.J. ١٥٤٧
٢٢١ B.	كاليدونيا الأصفر	P.O.J. ١٩٩١
٢٧٩ B.	P.O.J. ١٣٩	P.O.J. ٢٣٧٩
٧٤ DEM.	P.O.J. ٢١٣	P.O.J. ٢٦٠٤
١١٣٥ DEM.	P.O.J. ٨٢٦	P.O.J. ٢٦٠٨
٤٦ DI.	P.O.J. ٩٢٠	P.O.J. ٢٦١٠
٨٨ DI.	P.O.J. ٩٧٩	P.O.J. ٢٦٨٨
٢ E.K.	P.O.J. ١٠٥٠	P.O.J. ٢٦٩٠
٦ E.K.	P.O.J. ١٠٩١	P.O.J. ٢٦٩٥
٢٨ E.K.	P.O.J. ١٢٢٨	P.O.J. ٢٧٠٣
١٦٠ F.	P.O.J. ١٣٣٥	P.O.J. ٢٧٠٤
١٠٩ HAW.	P.O.J. ١٣٣٧	P.O.J. ٢٧٠٦
١١٢ HAW.	P.O.J. ١٤١٠	P.O.J. ٢٧٠٨
٣ SW.	P.O.J. ١٤١٩	P.O.J. ٢٧١٤
١١١ SW.	P.O.J. ١٤٤٥	P.O.J. ٢٧٢٥
٢٤ TJEP.	P.O.J. ١٤٩٩	P.O.J. ٢٧٢٧

U-BA

(١) والبروف على الاصطلاحات القية ووراة الصفات لهذه الأصناف راجع كتاب المؤلف المعنون " تربية قصب السكر بمصر " (٢٦)

وفى سنة ١٩٢٥ استورد م. ر. روش، مديرا إدارة شركة بنجى حمادى، من كوتجو الباجيكية ستة أصناف معروفة بالأسماء الآتية وهى كيتوبولا "الموق" والأصفر وبلدى أصفر وإنكيزى أصفر وإيولا تنسكوليت وكوتجو المخطط . وفى سنة ١٩٢٨ ختم الاستيراد بإدخال الصنف الجلاوى المعروف باسم " القصب المدهش " P.O.J. ٢٨٧٨

وقد أخبرنا الميسوم . روش الذى نفضل بمدادنا بهذه المعلومات التاريخية نحو معنى صنف أدخلت واختبرت فى بنجى حمادى ولكن لم ينجح منها سوى الثمانين صنف موضوع البحث هنا فهى أشهر القصب المعروف الذى تغطى التجارب الأولية وعمر وقد اختبرت كل هذه الأصناف علميا وعمليا عدة سنين فى قطع مكورة كالمعاد وفى أحوال بيئية مختلفة وظهر أنه ليس من بينها ما يصادل صنف P.O.J. ١٠٥ الذى برهن الزمن على أنه القصب الوافى بالأغراض العامة على أن كثيرا منها ومن جملتها P.O.J. ٩٧٩ و ٢٨٧٨ لا يزال يختبر اختبارا واسع النطاق بنجى حمادى . ومع ذلك فكما سبق أن لا حظته المؤلف (٢٧) يلزم أن يكون الصنف الذى ثبت أنه يفوق نهائيا من كل الوجوه صنف P.O.J. ١٠٥ المعروف من زمن بأوقيته، جامعا لصفات استثنائية من جهة قوة النمو الخضرى والمناعة ضد الأمراض والاحتواء على مقدار كبير من السكر وهلم جرا .

وإن الأبحاث المضنية التى قام بها الميسو نوس بك والميسو روش لمدة ثلاثين سنة لأبحاث ثمينة جدا جدية بكل ثناء من جانب جميع زراع القصب المصريين فالحق أنها مهدا الطريق تمهيدا ناجما لأعمال القسم المنشأ حديثا بوزارة الزراعة لمباحث قصب السكر .

وفى سنة ١٩٢٥ اتفق الدكتور محمد على الكيلانى لما كان فى بعثة بكوبا مع جناب المستر زل بمزرعة هرشى الوسطى على شحن عقل من عشرة من أشهر أصناف القصب تبشر بمستقبل حسن ، الى الجزيرة فصدرت فى منتصف سبتمبر ووصلت هنا بعد شهرين من تاريخ التصدير وفى طول هذا الوقت ما يكفى لتحلل بطاقات الأصناف فى مسحوق القصب البلدى المبلل الذى كانت العقل محزومة فيه وترتب على ذلك أن الأصناف التى نصفها فقط نبث هنا قد أعطيت رقاما احتياطية بالجزيرة ومجزت حتى حقق المؤلف (٢٦) شخصيتها كالآتى :

جيزة ٤ = H. ١٠٩ وجيزة ٧ = B.H. ١٠ (١٢) وجيزة ٨ = P.O.J. ٢٧٢٥ وجيزة ٩ = Uba = وجيزة ١٠ = CH. ٦٤ (٢١) .

وفي الوقت الذي فيه عملنا ترتيباً لأن يشحن لنا من الهند وفيها بعض أصناف تبشر  
بغير كثير فقد حددنا كثيراً من استيراد القطن بسبب الخطر الدائم الذي ينتج من إدخال  
أمراض أجنبية وآفات حشرية لا وجود لها لحسن الحظ في مصر، مفضلين تركيز جهودنا  
للحصول على أصناف ممتازة بترقية أصناف جديدة من البذرة المحبنة (٢٨). هذا ولو أننا يلزم  
أن نستورد بذورنا من الخارج غير أنه لا يعتد بإدخال آفات بهذه الكيفية .

### التجارب بالمطاعة

نظراً لقيام الدكتور الكيلاني بإثمار الأصناف المستوردة من كوبا وواشنطن بمزعة  
وزارة الزراعة بكم أمبو فقد وجد في سنة ١٩٣٣ مقدار من التقاوى لتجارب شطرنجيه على  
الأصناف في مزرعة الوزارة بالمطاعة القرية من هناك وبما أنه مع ذلك لم توجد التقاوى  
الكافية من التسعة الأصناف جميعها التي أردنا أن نقارن بينها في التجارب وبين P.O.J. ١٠٥  
القياسي فقد تقرر أن نشحن بمركب ما يكفي من تقاوى كل صنف بقصد إظهارها  
بالمطاعة بحيث يمكننا القيام بعمل تجارب واسعة النطاق ومكررة في أوائل السنة المقبلة (١٩٣٤)  
وكانت الأرض التي اقتضيت للتجارب صفراء خفيفة لدرجة ما ذات تركيب متجانس جداً  
ظاهر بالخدمة جيداً بعد أن أخذ منها محصول فول وخططت باعتبار تسعة خطوط في كل  
قصبين (٨٠ متباعدة تقريباً) ثم قسمت إلى قطع بلغت مساحة كل منها ثلاثة أقدام  
(ثمان فدان الجازي) خلال الأسبوع الأول من أبريل سنة ١٩٣٤ وزرع الحقل بالطريقة  
الجافة في ٩ أبريل وقد كرر كل صنف من العشرة الأصناف ثلاث مرات على غير نظام  
مدبر ووسق في اليوم التالي وأعطيت ثلاث وعشرون رية إضافية كانت الأخيرة منها في ٥ فبراير  
سنة ١٩٣٥ وهو آخر تاريخ قبل الحصد بأقل من ثلاثة أسابيع وعرق أربع مرات كانت  
العزقة الأولى في ٨ مايو والأخيرة بعد أن خدم خدمة وسطى في ٢٥ يونيه واستعمل  
في التسميد ثلاث غرارات من تروسلقات النواشر، المحتوى على (٣٦ ٪ من الأزوت)  
كل غرارة مائة كيلو على دفعات متعددة في ٢، ٢٧ يونيه وفي ١٦ يولييه وأخيراً نظفت  
القنوات في ٥ يولييه .

وحصدت زراعات التجارب في ٢٤، ٢٥ فبراير سنة ١٩٣٥ وشحن محصول كل قطعة  
في عربة فردية مرفقة وعصر وحلل على حدة في معمل سكر أرمنت وأسفرت النتيجة عما  
يأتي فيما بعد . ولا يسع المؤلف إلا أن يبدي تقديره لمن شاركه في القيام بهذا العمل وهم  
جناب الخواجه كريستوفوروس ونوس بك مديراً معمل السكر بأرمنت كما يشكر حضرتي  
مفتي وزارة الزراعة حسن خليفه وزرق موسى والدكتور محمد على الكيلاني بقسم النباتات  
ومساعديه سام نظيف أفندي والحسيني النجار أفندي على المساعدة الكبيرة التي بذلوا في إجراء  
التجارب وفي حصد محصولها .

وكل هذه الأصناف ما عدا الصنف الأخير منها هي أصناف ذات شهرة في المسالك  
المختلفة فالصنف P.O.J. ١٠٩ يحقق تقريباً أنه هجين بين لاهينا (بوربون) وروزامبو  
(كريستالينا أو وايت تشريون) وهو القصب الأساسي في هواي حيث الأراضي أحسن  
أحوالاً والري متوفر والتي فازت بالرقم ألفا في العالم في إنتاجه التجارى لاسكر من الفدان  
الانجليزي إذ ينتج ما يسكاد يبلغ ١٨ طنًا . والصنف B.H. ١٠ (١٢) . هو أحد  
العوامل الرئيسية التي ينسب إليها تضاعف الإنتاج السنوي لاسكر في بورتوريكو حتى بلغ  
المثلين ، سواء عن الفدان الانجليزي أو عن المجموع في العشر السنوات الماضية (١٢)  
والصنف P.O.J. ٢٧٢٥ (٥) هو من نفس سلالة "القصب المدهش" الجاوي ،  
P.O.J. ٢٨٧٨ ، وهو يزرع بكثرة في فورموزا وتايلاند . والصنف Uba هو الصنف  
التنوعى لأنواع القصب الصيلة وهو ذو مناعة ضد المرض الفسيفسائي (مزايك) ولهذا  
السبب كان هو الصنف الوحيد الذي أبحاث حكومة أفريقيا الجنوبية زرعه في نانال حتى  
اكتشف سنوري قابليته القصوى لمرض الفسيفسائي (تخطط الورق) . والصنف ٦٤ CH  
(٢١) قال عنه متجه كافيون (٤) إنه هجين بين أوبا و D ٧٤ غير أنه يرجح أنه نتيجة  
لقصح ذاتي لبودرة من نوع أوبا إذ لم تظهر فيه صفات (saccharum officinarum)  
(سكارم أفسينارم) مطلقاً (١٦)

وفي سنة ١٩٢٨ - ٢٩ استورد الدكتور ل. ه. ملشرز بفضل من الدكتور ه. ي.  
براندز بقلم مباحث نباتات القصب السابع لوزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأصناف  
الآتية وهي : P.O.J. ٣٦ (M) و ٢٣٤ و ٢٧١٤ و ٢٨٨٣ ثم Co. ٢٨١ .

وفي سنة ١٩٣٣ شحن لنا المستر فكو I. أوردو ومينجيز مدير محطة تجارب جزيرة  
بورتوريكو عقلاً من قصبهم المبشر بمستقبل حسن P.O.J. ٢٧٢٥ S.C. ١٢ (٤)  
بإدرات من P.O.C. ٩١٦ ، كما أن المستر دايو باهادور فنكاترمان خبير تجارب  
القصب بمحكمة الهند بالمحطة الامبراطورية لتجارب القصب بالكو يماطور تفضل فارسل  
له صنف ال Co. ٢٩٠ الذي منه خير بلوزيانا والهجين (كوامباتور) Co. ٣٥٢ و ٣٩٨  
و ٣٩٩٠ .

وفي يونيه سنة ١٩٣٤ تكرم علينا مكتب مجموعة النباتات المحففة بدرابان من أعمال نانال  
بإرساله عقل من صنف P.O.J. ٢٩٥٢ وفي الجزء الأخير من تلك السنة تمكن المؤلف ،  
وقت أن كان قائماً بأمورية في بورتوريكو ، من الحصول من محطة تجارب الجزيرة على  
صنفين آخرين يشيران بغير وهما الهجينان P.O.J. ٢٧٢٥ × ١٢ SC (٤) و M.P.R.



يلاحظ بالنظر إلى الجدول أن القصب القياسي المخصص للتأبلة وهو P.O.J. ١٠٥ خلق جميع الأصناف الأخرى بمراحل فكان متوسط غلته عظميا إذ بلغ ١١٣١ قنطار من العيdan وأكثر من ١/٥ طن من السكر من العيdan فزاد عن أقرب صنف منافس بما فوق مائة قنطار من العيdan و ٣٤٥ كيلو جرام من السكر من العيdan الانجليزى . وإن الفوارق بين المخطط (M) تدل على الكتابة اليابانية للفظ مخطط أى (Minka) والصنف العنادر P.O.J. ٣٦ ليست ذات أهمية تذكر فباستمرار المحصول عروسا يوجد عادة فارق بسيط في غلة القصب بين الاثنين فالطرز المخطط حيث السكروز أحسن بدرجة بسيطة ، وباعتباره خليفة فإن الشكل المعتاد أكثر خشونة (٢٢) ويعطى على العموم غلات من العيdan أحسن من غلة المخطط في حين أن فائدة P.O.J. ٣٦ (M) في احتوائه على السكروز تزداد عادة كلما تقدم القصب في السن ولم يحتفظ Co ٢٨١ بسعته من ناحية التضاع المبكر جدا (٣ ، ٧) ولكن P.O.J. ٣٣٤ حافظ على ميزته ألا وهى ارتفاع احتوائه على السكر (٢٥) — أما الأربعة الأصناف الأخيرة الواردة في الجدول فكانت قصيرة جدا وغير نامية مما يدل على أنها أنواع تمثل الطراز الاستوائى لا يلائمها موسم النمو عندنا لفقر مدته جدا .

وهذا الاستنتاج يؤيده احتوائها على السكر إلا في حالة P.O.J. ٢٧٢٥ الذى هو صنف مشهور بنضجه المبكر .

وقد شرع هذا العام (١٩٣٦) في عمل تجارب مزدوجة بمزرعة وزارة الزراعة بملوى بعد أن تم إكثار التقاوى الكافية هناك من الأصناف التى جربت بالمطاعة .

### خلاصة ونتائج

قد شهد عالم السكر انقلابا عظيما في زيادة غلات القصب الناتج من العيdan وفي مجمل محصول العالم ومعظم السبب في ذلك تحسين الأصناف فوق تحسين العمليات الزراعية والمخصبات وطرق الري .

وأول أصناف جديدة من القصب أدخلت القطر المصرى هى التى آف بها هنرى نوس بك إلى نجع حمادى سنة ١٩٠٣ حين أدخل الصنف P.O.J. ١٠٥ مع عشرة أصناف أخرى لحل الأول تدريجيا على الأنواع البلدية (تشريون) التى كانت تزرع من قبل حتى أصبح ما يزرع اليوم منها لصناعة السكر قليل فقد زاد متوسط غلة القصب في مصر بفضل P.O.J. ١٠٥ بما يقرب من ٣٠ ٪ عن العيdan . وفي خلال الثلاثين عاما الأخيرة اختبر هنرى نوس بك وخلفه الميسوس . روش نجع حمادى نحو مئتي صنف استوردها من بلاد مختلفة ولم يكن من بينها ما يتفوق على P.O.J. ١٠٥ باعتباره قسما يزرع لغرض عام .

ونتيجة الاختبارات التى أجريت بالمطاعة على تسعة من الأصناف التى تبشر بنجاح عظيم استوردها قسم مباحث قصب السكر تشير إلى مثل هذا الاستنتاج ولا تزال التجارب مستمرة حتى الآن ، تجرى بملوى حيث عمل ترتيب لزراعة قصب السنة الثانية وبمجموعات مزدوجة .

### غلات قصب السنة الأولى (المروسي) بالمطاعة

الصنف	وزن القصب بالكيلو جرام عن كل قنطرة عيdan	القصب عن العيdan		مقدار السكر بالكيلو جرام عن العيdan	وزن السكر
		بالطن المزرى	بالقنطاري		
P.O.J. ١٠٥	٦٤٩٠			١٤٠٥	
" "	٦٤٧٠			١٤١٣	
" "	٦٠٩٠			١٢٨٢	
P.O.J. ١٠٥	٦٣٥٠	٥٠٠	١١٣١	١٣٦٧	٥٥٣٧
P.O.J. ٣٦ (M)	٥٩٤٠			١٤١٦	
" "	٦٣٢٠			١٤٢٨	
" "	٤٩٧٠			١٤١١	
P.O.J. ٣٦ (M)	٥٧٤٣	٤٥٠	١٠٢٣	١٤١٨	٥١٩٢
P.O.J. ٣٦	٥٣٤٠			١٤٥٤	
" "	٥٦٥٠			١٣٧٩	
" "	٥١٧٠			١٤٧٧	
P.O.J. ٣٦	٥٠٨٧	٤٣٠	٩٥٩	١٤٣٧	٤٩٥٦
P.O.J. ٩٧٩	٤٧١٠			١٤٧٥	
" "	٥٦٢٠			١٤٧٠	
" "	٤٩٢٠			١٤٧٠	
P.O.J. ٩٧٩	٥٠٨٣	٤٠٥	٩٠٥	١٤٧٣	٤٧٩٩
P.O.J. ٢٨١	٥٠٤٠			١٤٣٣	
" "	٤٠٣٠			١٣٧٩	
" "	٥١٤٠			١٣٧٨	
P.O.J. ٢٨١	٤٦٣٧	٣٧٠	٨٤٤	١٣٩٧	٤٢٤٤
P.O.J. ٢٣٤	٤٦٨٠			١٤٣٣	
" "	٤١٩٠			١٤٩٥	
" "	٤٣٩٠			١٣٧٨	
P.O.J. ٢٣٤	٤٤٢٠	٧٨٧	٣٥٠	١٤٣٥	٤٠٦٦
H. ١٠٩	٤٣٧٠			١٣٧٨	
" "	٤١٥٠			١٣٢٠	
" "	٤٧٠٠			١٣٩٦	
H. ١٠٩	٤٤٠٧	٧٨٥	٣٥٠	١٣٣١	٣٧٣٧
P.O.J. ٢٧١٤	٣٨٦٠			١٤١٧	
" "	٣٥٧٠			١٤٢٧	
" "	٣٣٤٠			١٤١٦	
P.O.J. ٢٧١٤	٣٦٩٠	٦٥٧	٢٩٠	١٤١٧	٣٣٣٦
B.H. (١٢٢)	٣٨٢٠			١٣٩٢	
" "	٣٨٥٠			١٣٨٤	
" "	٣٨٣٥			١٣٨٨	
B.H. (١٢٢)	٣٨٣٥	٥٠٥	٢٢٠	١٣٨٨	٢٥١٧
P.O.J. ٢٧٢٥	٣٥٤٠			١٦٠٠	
" "	٣٥١٠			١٦٠٠	
" "	٣٥٧٠			١٦٠٤	
P.O.J. ٢٧٢٥	٣٥٤٠	٢٠٠	٤٥٢	١٦٠٤	٢٦٠١

## ملحق رقم ١

وصف بسيط لأصناف القصب التي بالمطاعة

لوصف أصناف قصب السكر وصفا يمكن الخبير وغير الخبير تمييزها تمييزا حاسما يجب استخدام الطرق المتبعة في وصف النباتات كما يجب إلى حد كبير استعمال الاصطلاحات الفنية المعتادة في وصف النباتات أو تبويبها على حسب أجناسها وأول من حاول ذلك هو باربر (Barber) وتبعه وودهاوس (Woodhouse) وياسو (Basu) (٣٠) بالهند ثم أن إيرل (Earle) في مجموعات أوصافه النفيسة عدل وكشف طريقة باربر (Barber). ويتبع المؤلف الخاني إيرل (Earle) في رسالته على أوصاف القصب (١٦) بيد أنه لم يذكر في الأوصاف الحالية عددا من الصفات الأقل بروزا منها للالتباس غير أنه يلزم مع ذلك أن يشمل الوصف النقط الآتية :

أولا - عادة النبات العامة : أمتص أم سريع الانبطاح أكثر المساليج أم قليلا - فوته العامة .

ثانيا - ساقه بوجه عام ( أغليظة جدا - أم غليظة نوعا - أم متوسطة - أم رفيعة - أم رفيعة جدا ) - اللون و "الازدهار" . فالعبدان التي يقل متوسط قطرها عن ثلاثة سنتيمترات توصف بأنها رفيعة جدا والتي يبلغ قطرها حوالي ثلاثة سنتيمترات تعتبر رفيعة والتي يبلغ قطرها من ٣ إلى ٣ ١/٢ سنتيمترا - تعتبر متوسطة ، وإذا بلغ القطر من ٣ ١/٢ إلى ٤ سنتيمترا تعتبر العبدان غليظة وإذا زاد عن ٤ سنتيمترا تعتبر غليظة جدا مع ضرورة الإشارة طبعاً إلى متوسطات العبدان الجيدة التكوين لا الضعيفة ولا المتقدمة في السن ولا الخلفة المتأخرة . ومع أن لون الساق من أظهر الصفات . فإنه كما أبان إيرل (٧) يكون داعياً إلى الالتباس إلى درجة كبيرة إذ أنه يتوقف غالباً على النمو والقوة والتعرض لضوء الشمس " وهذا يصدق بوجه خاص على تلك الأصناف الكثيرة التي تكون عادة خضراء وتصبح قرظية اللون أو حمراء إلى حد ما عند ما تتعرض للضوء " فوصف اللون يلزم أن يشير إلى العقد التامة النضج التي تعرضت بسبب سقوط الأوراق ولكنها لم تصبح ناضجة أو ذابلة . وتجب ملاحظة مقدار الطبقة الشمعية ولو أن هذا المقدار يختلف أيضاً لدرجة ما باختلاف أحوال النمو .

ثالثا - العقل - يلزم بيان متوسط الطول النسبي ولو أن ذلك لا يمكن عمله إلا على وجه عام إذ أن هذه الصفة تتوقف إلى حد كبير، على حالة النمو ، وكثيراً ما تختلف اختلافا عظيماً في مختلف أجزاء الساق فيلزم ذكر الشكل العام أو رميل أم اسطوانى أم مضغوط في الوسط امتضخم عند القمة أو في الجزء السفلى . أوجد به على الجانب السفلى فوق البرعم انخفاض كالأخدود أم لا يوجد لأن هذه نقطة هامة - وتدون كذلك ملاحظات على طول ذلك الأخدود وعمقه وما إلى ذلك .

رابعا - العقد : أهي مبسوطة أو متجمعة أو متضخمة لدرجة واضحة أم مكونة زوايا قائمة مع الساق أم مائلة ، إذ توجد جملة عناصر هامة ذات تأثير في تكوين المنطقة العقدية يلزم العناية بتدوين مذكرات عنها لأنها في غالب الأحيان ضرورية للتشخيص وهي :

(١) حلقة النمو : هي منطقة ضيقة تفصل العقد من العقلة التي فوقها وقد تختلف أو لا تختلف عن العقلة لونا وقد تكون مبسوطة أو منخفضة أو مرتفعة وقد يختلف الاتساع بدرجة عظيمة . وفي هذه المنطقة يبقى النسج الخاوي في حالة نمو زمن مدة أطول من باقي الساق و بالتساقم اختلايا التي على الجانب الأسفل ونموها يتمكن أحدث أجزاء العود نموا من أن يستقيم بعد أن يكون قد أرقدهته الريح أو وقد بشقل وزنه .

(ب) الشريط الجذري أو المسافة بين حلقة النمو ونقطة اتصال غمد الورقة قد يختلف عرضه باختلاف الأصناف من ٦ مليمترا إلى ١٢ مليمترا وهو ينشأ على وجه العموم بلون يخالف نوعا ما لون العقل ويعرف بجملة صفوف دائرية غير منتظمة من نقط مستديرة هي رؤوس جذور مبدئية تتوالتكون منها النظام الجذري عند زرع القصب أو إنبات العين . ومن الضروري ذكر عدد صفوف الجذور وجمعها و بروز لونها وكثرة نهايات الجذور المبدئية .

(ج) ندبة الورقة هي بقية قاعدة غمد الورقة ، التي تبقى على الساق عند سقوط الورقة وهي عادة تكون بارزة أي ( خشنة الملمس ) تحت البرعم وقد تكون بارزة بأجمعها لكن يرجح أن تكون ظاهرة بهرب الجزء من الساق المقابل للجانب الذي فيه العين . والانسان كما أشار إيرل ، يصادف عادة دائرة صغيرة ظاهرة من زغب طويل على قاعدة غمد الورقة في عقد العود الصغير جدا ولكن هذا الزغب يسقط عادة ويزل قبل أن تنضج الورقة ويترك الندبة بعده لمساء أو "جرداء" وقد يبقى الزغب دائما في بعض الأصناف فتبقى ندبة الورقة مهدبة ( ذات هدب ) بدرجة ظاهرة - وهذه علامة مميزة دائمة ذات أهمية عظيمة .

(د) الشريط المغطى بطبقة شمعية خضراء : هي المنطقة التي عرضها عادة نحو سنتيمترا واحد تحت نقطة ندبة الورقة مباشرة وتمتاز برأس من الشمع حتى في الأصناف التي بها قليل من الشمع أو التي ليس فيها شمع على العقل والتي تكون فيها هذه المنطقة ظاهرة جدا إذ لا يطمسها الإزدهار العام . وهذه المنطقة الشمعية هي بوجه عام غائرة بدرجة ظاهرة أو مقبضة ولو أن ذلك ليس بصفة دائمة في حين أن كلا من هذه المنطقة والمنطقة الجذرية قد تكون متفخة بصفة واضحة في بعض أحوال كما في حالة مجموعة S.Barberi (سكارم باربري) وذات قطر أطول بكثير عن قطر العقل .

خامسا — البراعم أو الديون لها أهمية تنسيقية في علم الفصائل ، أكبر من أى جزء آخر من نبات القصب لأن صفاتها أقل تنبؤا وتوقفا على حالات النمو على أنه يلزم أن يكون وصفها متعلقا فقط بالمفاصل الكاملة التكوين حيث البراعم لم تبدأ في الأنبات على الساق القائمة . وفي البلاد الشبه الاستوائية كصغر جرت العادة بأن العود البالغ من السن سبعة أشهر يكون تقريبا في أوفق حالة لدراسة أوصاف البراعم ويجب مراعاة النقط الاتية :

(أ) الشكل العام — أرمحي هو أرم بيضى أو شبه بيضى أو مداريا أو شبه مداري

أوزانها في العرض عن الطول .

(ب) الحافة : أضيقة هذه الحافة الفاحلة ومتناسقة في الاتساع أو عريضة ومتناسقة أو "مبجحة" أى تسع بخاء من الجهة السفلى .

(ج) الحجم : خصوصا من حيث علاقته بالعناصر العقدية الأخرى وفي بعض الأحوال لا تصل قة البرعم الى حلقة النمو في حين أنها قد تفوقها أحيانا بمقدار طول البرعم .

(د) الخصلة القمية : إن وجود خصلة صغيرة من الزغب على قة البرعم أحيانا ما يكون من الصفات الصيفية الدائمة .

سادسا — الأعمدة الورقية تكون في بعض الأصناف مثل P.O.J. ٢٧.٢٥ أو E. ٩ ذات غطاء كثيف من زغب شائك يابس وحاد على أغلب وجهها يعرف غالبا "بجرب العود" لدى الشغالة الذين يسبب لهم تيجا في بشرتهم وأعينهم . وقد يبق هذا الزغب أو يسقط نوعا ما ثم يظهر على الأعمدة الحديثة ويسقط عند قرب النضج . ومن المهم أن نصف هذا الغطاء من حيث الصفة العامة والغزارة واللون . ذلك لأنه في بعض الأصناف لا تشتمل الا على قليل من الزغب المبعثر بطول الخط الأوسط في الجزء الخلفي للعمد (أملس تقريبا)

وفي البعض الآخر لا يوجد مطلقا (أملس) فإذا وجد على العمد كثير من رأسب شمعي فإنه يسمى "بالغطاء الشمعي" وهو مادة ذلولون أخضر ولكن في بعض الأصناف توجد صفات مميزة عند ما يكون ملونا باللون الأحمر أو الأرجواني وقد يكون أرجوانيا أذكنا تسمانا متجانسا كما في الصنف P.O.J. ١١٣٥

سابعا — النصال الورقية قد تكون مفردة قائمة برعوس مائلة أو قائمة بالضبط كما في الصنف P.O.J. ٢٨١ وقد تختلف لونا من الأخضر الخفيف أو المصفر كما في P.O.J. ٣٦ إلى الأخضر الداكن أو الشمعي أو المزرق أو البصلي كما في P.O.J. ٢٨١ مع ضرورة ملاحظة ضيقة هي أم متوسطة أم عريضة قليلا أو كثيرا (كما في الصنف P.O.J. ٢٧١٤) وفي بعض الأصناف تكون حواف الورقة مسننة تسننا عميقا في حين أنها تكاد تكون ناعمة في البعض الآخر .

### الصنف P.O.J. ١٠٥

مستقيم ، شديد ، عظيم الإسطواء ؟ طول الساق — نحيل نوعا — يصير كهرمانى اللون عند ما ينضج — ذو طبقة شمعية ثقيلة جدا — عقله طويلة اسطوانية أو مضغوطة قليلا جدا مائلة ميلا خفيفا جدا — ذات أخدود واضح والعقد بارزة ومنضخمة وحلقة النمو عريضة ومنسطة ومائلة إلى الصفرة والعصبة الجذرية عريضة والجذور الأولية غير ظاهرة وأرجوانية في ثلاثة صفوف متساوية جميعها وليست مضغوطة من الخلف (تجاه البرعم) ومكونة لأوسع جزء في الساق والشريط الشمعي غير واضح لأنه مطموس بالطبقة الشمعية التي على العقل — والبراعم كبيرة مثلثة الشكل — ذات حافة واسعة — مبنجة جدا (كما هي الحال في البلدى) — جرداء تقريبا — والأعمدة الورقية جرداء وملونة — والنصال الورقية شبه قائمة ولكن رؤوسها منحدره طويلة ضيقة خضراء زاهية لا تكاد تكون مسننة .

### P.O.J. ٣٦

مستقيم ، قوى جدا عظيم الإسطواء؟ سيقانه طويلة ونحيلة قليلا (مثل P.O.J. ١٠٥ تقريبا) والفاضة خضراء يفساها لون وردي يضرب إلى الأرجواني الأسمر والطبقة الشمعية معتدلة والعقل طويلة اسطوانية مائل إلى الرقود قليلا جدا . لا يكاد الأخدود أن يكون واضحاً — والعقد عريضة بارزة مائلة غير مقبضة وحلقة النمو ضيقة مستوية استواء العقل ، خضراء تؤول خضرتها إلى السعرة المشربة بمجرة خفيفة — والمنطقة الجذرية عريضة محددة جيدا مرتفعة متناسقة اللون ذات غطاء شمعي والجذور الأولية صغيرة غير ظاهرة قليلة جدا ومبعثرة في صفين أو ثلاثة صفوف، ويختلف لونها فقد تكون أرجوانية تقريبا وقد تكون ذات لون واحد متناسق ، والنسبة الورقية جرداء — عريضة بارزة في الأمام ومتلاصقة

والمنطقة الشمعية واسعة ، ظاهرة ، متقبضة قليلا — والبزاع حجمها متوسط — بيضبة ناقصة عريضة واصله الى حلقة النور ، حوافها خفيفة جدا ، منبسطة على النصف العلوي فقط ، جرداء ، ليس لها خصلة قبة والأعمدة الورقية ، لمساء مظنة بطبقة شمعية وملونة قليلا عند قاعدتها الخارجية فقط والنصال الورقية مستقيمة ذات قمم مائلة نوعا ، ضيقة لونها أخضر مغلى بطبقة شمعية — مسننة أسننا متجانسا دقيقا .

P.O.J. ٢٣٤

مستقيم — قوى — مفرع نوعا طويل الساق نحولها لونها مائل الى الخضرة القائمة التي ينشأها بعض الأحمر والعقل طويلة ، اسطوانية أو منسعة نوعا من الأسفل ، مستقيمة ، أخذودها لا يكاد يكون واضحاً ، والعقد عريضة ، متضخمة وحلقة النور عريضة ، ضاربة الى الصفرة ، منبسطة والمنطقة الجذرية منسعة — والجذور الأولية مظلمة لا تكاد ترى والندبة الورقية جرداء ، ضيقة ، ملتصقة من الخلف — والمنطقة الشمعية واضحة غير متقبضة والبزاع صغيرة تفوق حلقة النور ، مدارية ، تكاد تكون نصف كرية ، جرداء ، والأعمدة الورقية جرداء ، والنصال الورقية مفردة ، كثيرة ، ضيقة ، متدلية على الساق ومسنة قليلا .

H ١٠٩ (Hawaii)

مستقيم ، جيد القوة حسن الأشطاء طول السيقان ذو محيط جيد قرمزي مخضر أو أرجواني قائم ، يصير أسمر محمرا عند النضج — ذو طبقة كثيفة من الشمع الرمادي الذي يصبح قائما بمضى الزمن ، والعقل منسطة أو طويلة ، مائلة الى الرفود نوعا ، اسطوانية ، ملتصقة قليلا في الجوانب ومتقبضة عند القاعدة تجاه البرعوم ، يوجد أثر لأخذود أو لا يوجد لأخذود مطلقا والعقد مائلة ، منبسطة أو مرتفعة قليلا ، وحلقة النور عريضة ، منبسطة تقريبا ، خضراء أو منسقة اللون — والمنطقة الجذرية واسعة ، مائلة ، لونها أخضر خفيف أو منسقة اللون والجذور الأولية كبيرة ، ظاهرة ، كثيرة العدد — في ثلاث صفوف أو أربعة ، أرجوانية أو منسقة اللون — والندبة الورقية جرداء ، متقبضة في الخلف — والمنطقة الشمعية عريضة ، منبسطة تقريبا ، غير ظاهرة والبزاع متوسطة الحجم ، واصله الى حلقة النور ، ممتلئة ، خضراء أو حمراء أو أرجوانية ، مدارية ، حوافها ضيقة ، مستوية ، جرداء ، أرجوانية ، مقعرة في الوسط ولكن تكون أحيانا حادة ، أعرض في الجوانب العلوية ثم تأخذ في أن تضيق تدريجيا وتنتهي في وسط البرعوم ، والخصلة القمية قصيرة والأعمدة الورقية ذات وبر ظهري غزير ( خشبي أكثر من شوكي ) والجوانب جرداء واللون أرجواني ضارب الى الخضرة والقاعدة الداخلية مشربة قليلا بالارجواني — والنصال الورقية مستقيمة ذات قمم مائلة عريضة ، لونها أخضر قائم وحوافها مسنة حتى القاعدة أسنينا دقيقا متجانسا .

في الخلف — والمنطقة الشمعية ظاهرة وليست متقبضة — والبزاع كبيرة ممتلئة وواسعة المرض عن الطول وتكاد تزيد عن منطقة النور ، مدارية ، حوافها عريضة ، متجانسة والخصلة القمية ظاهرة وذات زغب قصير ، والأعمدة الورقية جرداء تقريبا ، مظنة بطبقة شمعية خفيفة وملونة نوعا ما وقاعدتها الداخلية أرجوانية لدرجة ما — والنصال الورقية مفردة قليلا وقمها مائلة ، ضيقة ومدمبة بتدبيا طويلا ومسنة قليلا حتى القاعدة .

الصنف P.O.J. ٣٦ (M)

ليس إلا نوعا ملونا من شوارد P.O.J. ٣٦ يميل لأن تكون بعقله الغير الناضجة خطوط صغيرة ملونة باللون الوردى ولكن هذا ليس دائما . وفي عدا ذلك فهو يشابه P.O.J. ٣٦ المعتاد تمام المشابهة .

الصنف P.O.J. ٢٧٩

مستقيم ذو قوة عظيمة وسيقانه طويلة ومحيطه متوسط وهو أخضر أرجواني باع وأفر الطبقة الشمعية وعقله طويلة ، اسطوانية تقريبا وهو ميل للرفود قليلا ، وأخذوده عريض غير غائر أو معدوم والعقد مرتفعة قليلا ومائلة وحلقة النور ضيقة ومنبسطة ولونها واحد والمنطقة الجذرية واسعة ومحددة جيدا ، مائلة ، مظنة بالشمع وذات لون واحد والجذور الأولية صغيرة لا تكاد ترى — قليلة ، مبعة ، وتشغل صفين أو ثلاثة أو أربعة وهي سمرا . والندبة الورقية جرداء عريضة بارزة من الإمام ، وملتصقة من الخلف والمنطقة الشمعية غير ظاهرة وتكاد تكون منبسطة والبزاع بين المتوسط والكبير ولا تزيد عن حلقة النور ، مدارية ، حوافها واسعة ، مقطوعة الطرف — وأعمدة الأوراق لمساء ليس بها شمع لونها أخضر خفيف ، نصال الورقة مستقيمة — أطرافها مائلة وأساسها متوسط ولونها ضارب الى الأخضر المائل الى الزرقة القائمة وثلاث الحافتين العلوين مسننان .

Co ٢٨١ (كوامباتور)

مستقيم جيد القوة حسن الأشطاء طول السيقان رقيقها جدا بلون التيد كثيف الطبقة الشمعية — طول العقل اسطوانية ميل الى الرفود قليلا جدا خال من الأخاديد والعقد تكاد تكون منبسطة ، متوازية وحلقة النور واسعة ، مرتفعة قليلا لونها أخضر ثم يتغير الى لون واحد والمنطقة الجذرية واسعة ، متوازية ، خضراء ضاربة الى الصفرة أو متباينة اللون والجذور الأولية كبيرة ، قليلة ، مبعة ، غير ظاهرة ، في صفين أو ثلاثة — لونها ضارب الى الأرجواني أو متناسق — والندبة الورقية جرداء ملتصقة من الخلف —

٢٧٢٥ P.O.J.

مستقيم ، جيد القوة ، جيد الأشطاء ، طويل السيقان قويها جدا والساق سمراء مخضرة  
مصفرا أو أخضر فاتح يغشاها لون برزى عند التعرض للشمس ، وليس مغلى بطبقة شمعية  
والعقل متوسطة أو طويلة ، اسطوانية ، ملتصقة قليلا في الجوانب مائلة إلى الانحناء نوما ما  
أو ليست كذلك كلية والأخدود خفيف أو ضيق عميق ممتد إلى أكثر من نصف العقلة  
والعقد متقبضة قليلا ومائلة وحلقة النمو عريضة منبسطة أو مرتفعة قليلا أحيانا ، لونها  
يختلف من أخضر فاتح حتى اللون المتناسق — والمنطقة الجذرية مائلة ، متوسطة الاتساع  
ذات لون واحد — والجذور الأولية قليلة وكبيرة — في ٢-٣ صفوف — لونها يختلف من  
القرمزي نوما إلى اللون المتناسق وهي غير ظاهرة والندبة القمية جرداء — متقبضة في الخلف  
وبارزة في الأمام والمنطقة الشمعية ضيقة ، متقبضة قليلا ، ظاهرة ، والبراعم ذات حجم  
متوسط ، تفوق حلقة النمو بمقدار الربع أو الثلث ، بيضية ناقصة أوشبه بيضية ، حوافها  
عريضة مستوية على النصف الأعلى فقط — مجنحة ومقطوعة في الجوانب فتجعل شكل  
البرعم ققميا — والخصلة القمية طويلة — والأعمدة الورقية خضراء في الداخل والخارج —  
شائكة بغزارة في الخلف — جوانبها جرداء — والنصول الورقية مفردة ولها أطراف مائلة  
دريضة جدا خضراء قائمة ذات غير أبيض ، حوافها مسننة تسنينا متسقا .

٢٧١٤ P.O.J.

مستقيم ، جيد القوة حسن الأشطاء ، طويل السيقان قويها جدا والساق سمراء مخضرة  
يفشاها طفح أرجواني إذا تعرضت للشمس ، والطبقة الشمعية عظيمة والعقل طويله ،  
اسطوانية ، عمودية على الساق — به أثر لأخدود أو أخدود ضيق ، منبسط انبساطا صغيرا  
والعقد متضخمة ومتوازية وحلقة النمو ضيقة ، تكون منبسطة وهي صغيرة وتأخذ في الاتساع  
وتصير مرتفعة وهي كبيرة ولونها أخضر مصفر أو تكون ذات لون واحد — والمنطقة الجذرية  
واسعة ، وبارزة قليلا ، لونها يختلف من أخضر خفيف حتى اللون المتناسق — والجذور  
الأولية قليلة ، كبيرة مبعثرة ، مرتفعة ، في ثلاثة صفوف أو أربعة ، أرجوانية اللون ، والندبة  
الورقية جرداء وملتصقة في الخلف — والمنطقة الشمعية ضيقة ، غير ظاهرة مدببة والبراعم  
متوسطة الحجم ، بيضية عريضة القاعدة ، واصله إلى حلقة النمو ، وحوافها ضيقة ، مثلثة الشكل  
ذات وبر متبادع والخصلة القمية طويلة كثيفة — والأعمدة الورقية لها وبر غزير في الخلف  
وذات زغب أسمر خشن وجوانبها جرداء ، خضراء والنصال الورقية منتشرة عريضة جدا  
( مثل ٢٧٢٥ P.O.J. تقريبا ) خضراء قائمة غير منبسطة — مسننة تسنينا دقيقا متجانسا  
حتى القاعدة .

\* (١٢) ١٠ B.H.

مستقيم أو مائل نوعا قويا ، قوى الأشطاء سيقانه طويلة وثخانتها متوسطة ولونها مائل  
إلى الخضرة ولكن سرعان ما يغشاها لون قرمزي فاتح مخطط وغالبا ما تكون به بقع ناصلة .  
والطبقة الشمعية عظيمة . والعقل متوسطة الطول مائلة متقبضة نوعا — عريضة من أسفل  
ومجنحة تجاه البرعم — والعقد متقبضة ، مائلة — وحلقة النمو عريضة على الأرجح غير أنها  
غير واضحة — وهي متضخمة في الكتف الخلفي — والمنطقة الجذرية مائلة ذات لون واحد  
أو أنفصل ، مدببة إلى الأسفل ، والجذور الأولية صغيرة لونها ضارب إلى الأرجواني —  
على ٣-٤ صفوف — والندبة الورقية جرداء ملتصقة في الخلف والمنطقة الشمعية متقبضة قليلا  
تطمسها قليلا الطبقة الشمعية التي على العقل — والبراعم مدارية تقريبا ، تفوق حلقة النمو قليلا ،  
حوافها ضيقة ، متجانسه ، كثيرا ما يكون لونها ضاربا إلى الأرجواني ، لها غطاء قمي متبادع  
الأجزاء — والأعمدة الورقية لها غطاء متفرق من زغب قصير ملصق ، لونها أخضر أو هي  
ذات لون خفيف جدا وعليها طبقة شمعية ضئيلة والنصال الورقية شبه مستقيمة ذات أطراف  
مائلة ، مستوية ، أكبر اتساعها فوق الوسط ، لونها أخضر خفيف ، وهي مسننة تسنينا دقيقا .

## كشـف

باسماء الموظفين الفنيين التابعين لقدم تربية النباتات  
الذين في الدرجة السادسة فما فوق



يستورد عقنات أو ثلاث فقط من الخارج وهذه يجب تكاثرها للحصول على أغصان كوبة لدخول

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| جناب الدكتور ج . تمبلتون .          | حضرة يوسف شبنای افندی .        |
| » » براون .                         | » محمد بدر الدين افندی .       |
| » المستر هـ . ا . هانكوك .          | » محمد عفيفي حسين افندی .      |
| » الدكتور ج . قايب .                | » رياض نجيب افندی .            |
| » المستر روز نفلید .                | » أحمد يوسف افندی .            |
| » المستر ف . دانكرلى .              | » محمد محمود صالح افندی .      |
| حضرة أرمناك بديفيان افندی .         | » محمود فهمى الكاتب افندی .    |
| » محمد عبد الديب افندی .            | » محمود عبد الباقى افندی .     |
| » الدكتور محمد على الكيلانى افندی . | » أحمد زكى أبو النجا افندی .   |
| » محمود فائق افندی .                | » محمد صادق افندی .            |
| » محمد عبد الله زغلول افندی .       | » عبد الفتاح السيد افندی .     |
| » محمد سعيد أبو العطا افندی .       | » فوزى ساويرس بسطا افندی .     |
| » الدكتور وديع شارويع افندی .       | » الدكتور حسين المغير افندی .  |
| » محمد عبد العزيز القشيري افندی .   | » أحمد زكى عبد الجواد افندی .  |
| » عبد الحميد جلال محرز افندی .      | » سليم نظيف افندی .            |
| » محمود جوهر افندی .                | » ابراهيم حمدى افندی .         |
| » عبد الحميد سويلم افندی .          | » عبد العزيز مصطفى عمر افندی . |
| » أحمد منير افندی .                 | » عثمان عبد الحافظ افندی .     |
| » عبد الغفار سليم افندی .           | » محمد على سليم افندی .        |
| » البيرونيشتين افندی .              |                                |

## بعض الصفات المميزة عند الوصف




المعلق مستقيمة الوضع والعين بيضاوية الشكل  
لا تمتد لها حلقة الخو



العين تمتد لها حلقة الخو بمقدار  
ثلث حجمها والمنطقة الشمعية واضحة  
والخط المحرف أعلى العين بطول  
المعلقة تقريبا

## بعض الصفات المميزة عند الوصف



- (من أعلى لأسفل) العقدة — منطقة الثور —  
 الخلفة الجسدية — (أثر الثور) —  
 المنطقة الشعبية — الجذور الأولية



العقل مقابل الوصف



وزارة الزراعة

قسم تربية النباتات

# النشرة الفنية

رقم ١٦٨

اختبارات خاصة

بوزن بعض أصناف مستوردة من قصب السكر

بم

ارثر هـ . روزنفلد

إعصافى الحكومة الخير بقصب السكر

ترجمة

عبد الحميد افندى القمري

بسم الإرشاد الزراعى

أوصت لجنة المطبوعات بوزارة الزراعة بطبع هذه النشرة ولكنها غير مسئولة عن الآراء المدونة فيها

طبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة ، سنة ١٩٣٧

تباع مطبوعات الحكومة بصالة البيع بوزارة المالية — أما المكاتبات  
الخامسة بهذه المطبوعات فتُرسل رأساً الى قلم النشر بالمطبعة الأميرية  
الثلث ... .. ٢٠ ملياً

# اختبارات خاصة

## بوزن بعض أصناف مستوردة من قصب السكر

بهم

أرثر هـ . روزنفلد

أخصائى الحكومة الخيرية بقصب السكر

فد شهد ربع القرن الماضى عددا من الانقلابات فى الميادين الحربية السياسية تبعها تبدل فى الحدود الجغرافية و " مناطق النفوذ " وفى ذلك الوقت حصل انقلاب فى زراعة قصب السكر بجميع أنحاء الدنيا لا يقل حسبا عن تلك الانقلابات إلا فى أنه لم يصحب بضر الطبول ونفخ البوق للذين هما من مميزات الانقلابات السياسية ، وكان زعماءه وهم القائمون بأعمال محطات تجارب قصب السكر فى عدة من البلاد الشهيرة بزراعة القصب على اتصال مع الإدارة العامة لشركات القصب التابعين لها وهى التى تؤيدهم بالرأى والمسال . وأن وصول الشيوعيين بالروسيا والفاشيست بإيطاليا وحزب النازى بألمانيا إلى مقاليد الأمور بعد أن لم يكن لهم ذكر ، ليس بأعظم من الانقلاب الزراعى الذى رفع الجزر الصغيرة بجاهوهاواى و بورتوريكو من مراكز ضئيلة نسبيا فى عالم القصب إلى مراكز الزعامة والرياسة التى لاتنازع بين البلاد المنتجة للقصب والى من بينها ما هو أوسع نطاقا وذو موقع ممتاز من أسواق العالم .

فى بخر القرن الحالى كانت جملة محصول القصب تزيد قليلا عن خمسة ملايين طن وعند بدء هذا الضيق الاقتصادى الشهير الذى لايزال ضاربا أطنابه فى كافة أنحاء العالم زاد محصول القصب عن ١٨,٠٠٠,٠٠٠ طن .

ومنذ موسم سنة ١٩١١ - ١٩١٢ زاد إنتاج القصب فى جاوه من ١٣٩٥٠٠٠ إلى ما يقرب من ٣٠٠,٠٠٠ طن وفى جزر هاواى من ٥٩٥٤١٣ إلى ١٠٢٩,٠٠٠ طن وفى جزيرة بورتوريكو الصغيرة من ٣٦٧١٤٥ إلى ما دون مليون طن بقليل .

ولقد كانت هذه الزيادات المدهشة تفقد أهميتها إذا كانت نسبة زيادة المساحات قاربت نسبة زيادة صافى السكر ولكن مظهر النجاح البارز إنما هو فى أن الإنتاج زاد زيادة عظيمة فى حين أن الزيادة فى المساحات لم تكن إلا ضئيلة جدا نسبيا . ذلك لأن مساحات القصب

محدودة في تلك الجزر كما هي الحال في مصر، فالمساحة محدودة في جاوه بمرسوم حكومي لكي يكون أغلب الأراضي الزراعية مخصصة للحصول الغذائية لسد طلبات الأهالي الذين يبلغون نحو خمسين مليوناً من الأنفس. وفي هاواي الصغرى وبيورتوريكو قليلة المساحات الصالحة لزراعة القصب وعلى ذلك فمعظم الزيادة في جملة محصول القصب آتية من العمل على زيادة غلته بالطرق العلمية. ومعنى هذا طبعاً أن نفقات إنتاج القطن من القصب يجب أن يتورها نقص مناسب لذلك إذ من البديهي أن نفقات زرع وخدمة القصب القليل الغلة تعادل ما ينقص في زراعة الحبوب الأكثر إنتاجاً أو تزيد على ذلك.

وقد ذكر الدكتور ف. ب. كونيجسبرجر (٨) \* المدير الزراعي لمحطة تجارب القصب بجاوه الشهيرة في سنة ١٩٢٩ أن متوسط الغلة في جاوه البالغ قدره ١٢٠٠ قطاراً تقريباً من القصب عن الفدان كان أكثر من ضعف المتوسط المتحصل عند ما شرعت محطة التجارب المذكورة في عملها. وقريباً من هذا القدر في الزيادة كان نصيب متوسط الغلة سنة ١٩٣٣ في هاواي، البالغ قدره ١٣١٠ قطاراً عن الفدان (١٤٩٦ عن الزراعات المروية) عند ما تأسست محطة تجارب القصب هناك في حين أن متوسط الغلة الحالي في بيورتوريكو البالغ قدره ٧٠٠ قطاراً تقريباً من القصب عن الفدان يزيد على وجه التقريب بمقدار ١٢٠ % عما كان عليه عند تأسيس محطة التجارب هناك في سنة ١٩١٠.

ونظراً لكون مصر بلد شبه استوائية ذات موسم نمو قصير عبارة عن ٨½ إلى ٩ شهور فقط على العكس عما في تلك الجزر الاستوائية السافلة الذكر حيث يبق المحصول قائماً من ١٤ إلى ٢٦ شهراً قد يكون من المفيد أن نبين هنا أن زراعة القصب الشبه الاستوائية قابلة نسبياً للتحسين كما هو الحال في أوفق المناطق الاستوائية. عند ما أسست حكومة توكومان (الجمهورية الفضية) محطات تجارب القصب سنة ١٩١٠ كانت غلات القصب في تلك المنطقة تهبط هبوطاً مريعاً بسبب فناء المرض الفسيفسائي بالمحصول عند ذلك قامت تلك المحطة الجديدة فوراً بختيار مائة مثاق من أصناف جديدة ضد هذا المرض وغلته في الحقل ومعاملاً السكر الخ. ولما أوشكت صناعة السكر أن ينحى أثرها من تلك المنطقة حوالي سنة ١٩١٦ (فقد كان يحمل غلة السكر في تلك السنة ٤٥٠٠ طن فقط) كان لديها نقاوى من عدة طراز معروفة بتاعتها ضد هذا المرض تكفى لإعادة زرع مساحة القصب بأكلها (١١) وكانت النتيجة من هذا التغيير في الأصناف ومن التحسينات التي أمكن الوصول إليها في طرق الزراعة بوجه عام أن أتيحت المنطقة بعد عشر سنين ٣٧٥٠٠ طن من السكر إذ بلغ محصول الفدان في تلك الأثناء (١٥) ثلاثة أمثال ما كان عليه.

\* الأرقام التي بين قوسين تشير إلى المراجع المدونة باللحق رقم ٢.

وفي السنة نفسها (١٩٢٦) أغرى المؤلف (٣٠) على العودة إلى لوزيانا التي حصل فيها نفس ما حصل في توكومان في حقول زراعة القصب حيث كان المرض الفسيفسائي ضاراً باطنابه حتى أدى إلى نقص إنتاج السكر في السنة التالية فهبط إلى ٤٦٠٠٠ طن فقط وبفضل الخبرة التي اكتسبها في الجمهورية الفضية في أحوال المناخ المتأثلة أمكن إيقاف الصناعة في لوزيانا بدرجة مريعة حتى أنه بعد ست سنين بلغ محصول السكر هناك ٣١٠٠٠ طن وبلغت غلة الفدان ثلاثة أمثال (٣٤) ما كانت عليه.

وأخيراً قد أدى إدخال القصب صنف P.O.J. ١٠٥ وشيوعه بمصر إلى زيادة في محصول الفدان "بلغ نحو ٣٠ %".

وتحمل معظم مشقة الكفاح في سبيل الحصول على غلات متنازة في كل واحدة من هذه الجزر الذين قاموا بثورة الأصناف وهم مربو النباتات الذين استنبطوا أصنافاً رئيسية ذات غلة كبيرة وقوة مناعة ضد الأمراض صالحة على وجه خاص للزراعة في بيئاتهم مثل صنف P.O.J. ٢٨٧٨ "قصب جاوه المددش" وصنف II ١٠٩ الذي بلغ الرقم الفسيفسائي العالمي بإنتاج نحو ٥٠٠ قطار من السكر (نحو ٣٢٠٠ قطار من القصب) من الفدان في هاواي. وكذا صنف B.II. ١٠ (١٢) في بيورتوريكو إلا أن تغييرات الأصناف ليست معتبرة العلاج الوحيد لآفات الزراعة وكثير من النجاح والنصر في ميدان الكفاح الزراعي إلى العناية بالآفات وتحديد العوامل المهمة المؤثرة في زراعة القصب كأوقوف وقت للزرع وأوقوف المسافات وأوقوف مقادير للتسميد واهلهم جراً.

### استعراض مختصر للأصناف المصرية التي من أصل أجنبي

حتى أوائل القرن الحالي كانت أنواع القصب التي تزرع بقصد إنتاج السكر هي الأسود والمخطط والأبيض (كرستالينا) التي من نوع "تشربون" المعروفة بالأصناف البديدة في حين أنه كان يزرع بالوجه القليل مقدار متوسط من الصنف الفرعوني اللين (الكربول) بقصد بيعه للاص. وفي سنة ١٩٠٢ استحضرت جناب هنري نوس بك، الذي كان وقتئذ كيميائياً بمعمل سكر نجع حمادى، وهو الآن المدير العام للشركة المصرية العامة لصناعة السكر والتكرير من جاوه أحد عشر صنفاً من القصب لتجربتها بمصر ومن جعلتها صنف P.O.J. ١٠٥ الذي يعرف الآن بمصر لسبب خفى باسم القصب الأمريكانى وباسم القصب الكهربائى في الخارج

وقد بقي عدة سنين القصب الذوزجى بالقطر المصرى وهو عمادنا فى المقابلة فى جميع تجاربنا الصنفية . وفضلا عن الصنف P.O.J. ١٠٥ قد أدخلت فى تلك السنة الأصناف الآتية وهي ماينلا الأبيض والأسود والتشريبيون والبوروبون ولوزير والمخطط البسورى وجاوه B. ٢٤٧ و P.O.J. ٣٣ و ٣٦ و ١٠٠ \*

وفى سنة ١٩٠٩ قد أدخلت نجع حمادى ثمانية أصناف إضافية من جزيرة موريشص بالمحيط الهندى وهي تنا الكبير الأبيض والأسود وصنف بلدى معروف باسم فوتياجو و M. ٥٥ و ١٣٩ و ٢١٨ و ١٠٣٠ ( قصب المص المحبوب عند الجمهور، المعروف فى مصر باسم خد الجبل ) و ١٩٠٠ ( برومات . وفى السنة التالية ١٩٠٠ ( برومات ) . وفى السنة التالية حصلت مصر على P.O.J. ٣٢٠ من جاوه وعلى O.I. ٥٢ و F. ٩٠ وفى سنة ١٩٢٠ استوردت آخر رسالة عظيمة من جاوه وكانت تتضمن الأصناف الآتية :

B. ٦٦	باتمانج	P.O.J. ١٥٠٧
B. ١٤٨	لاهينا	P.O.J. ١٥٤٧
B. ٢٢١	كاليدونيا الأصفر	P.O.J. ١٩٩١
B. ٣٧٩	P.O.J. ١٣٩	P.O.J. ٢٣٧٩
DEM. ٧٤	P.O.J. ٢١٣	P.O.J. ٢٦٠٤
DEM. ١١٣٥	P.O.J. ٨٢٦	P.O.J. ٢٦٠٨
DI. ٤٦	P.O.J. ٩٢٠	P.O.J. ٢٦١٠
DI. ٨٨	P.O.J. ٩٧٩	P.O.J. ٢٦٨٨
E.K. ٢	P.O.J. ١٠٥٠	P.O.J. ٢٦٩٠
E.K. ٦	P.O.J. ١٠٩١	P.O.J. ٢٦٩٥
E.K. ٢٨	P.O.J. ١٢٢٨	P.O.J. ٢٧٠٣
F. ١٦٠	P.O.J. ١٣٣٥	P.O.J. ٢٧٠٤
HAW. ١٠٩	P.O.J. ١٣٣٧	P.O.J. ٢٧٠٦
HAW. ١١٢	P.O.J. ١٤١٠	P.O.J. ٢٧٠٨
SW. ٣	P.O.J. ١٤١٩	P.O.J. ٢٧١٤
SW. ١١١	P.O.J. ١٤٤٥	P.O.J. ٢٧٢٥
TJEP. ٢٤	P.O.J. ١٤٩٩	P.O.J. ٢٧٢٧
U-BA		

والقوتوف على الأصناف التى وردت الصفات لهذه الأصناف راجع كتاب المؤلف الممتون " تربية قصب السكر بمصر " ( ٢٦ )

وفى سنة ١٩٢٥ استورد م . ر. روش، مديرا إدارة شركة نجع حمادى، من كوجو البلجيكية ستة أصناف معروفة بالأسماء الآتية وهي كينوبولا "المونى" والأصفر وبلدى أصفر وإنكيزى أصفر وإيولا تشكوليت وكوجو المخطط . وفى سنة ١٩٢٨ ختم الاستيراد بأدخال الصنف البخاوى المعروف باسم " القصب المدهش " P.O.J. ٢٨٧٨

وقد أخبرنا المسبوم . روش الذى نفضل بامدادنا بهذه المعلومات التاريخية نحو متى صنف أدخلت واختبرت فى نجع حمادى ولكن لم يجمع منها سوى الثمانين صنفا موضوع البحث هنا فهى أشهر القصب المعروف الذى تخطى التجارب الأولية وعمر وقد اختبرت كل هذه الأصناف علميا وعمليا عدة سنين فى قطع مكورة كاللناد وفى أحوال بيئية مختلفة وظهر أنه ليس من بينها ما يعادل صنف P.O.J. ١٠٥ الذى برهن الزمن على أنه القصب الوافى بالأغراض العامة على أن كثيرا منها ومن حملتها P.O.J. ٩٧٩ و ٢٨٧٨ لا يزال يختبر اختيارا واسع النطاق يجمع حمادى . ومع ذلك فكم سبق أن لا حظه المؤلف ( ٢٧ ) يلزم أن يكون الصنف الذى يثبت أنه يفوق نهائيا من كل الوجود صنف P.O.J. ١٠٥ المعروف من زمن بأوقيته، جامعا لصفات استثنائية من جهة قوة النمو الخضرى والمناعة ضد الأمراض والاحتواء على مقدار كبير من السكر وهلم جرا .

وإن الأبحاث المضنية التى قام بها المسبوم نوس بك والمسبوم روش، عدة ثلاثين سنة لأبحاث ثمينة جدا جدية بكل ثناء من جانب جميع زراعى القصب المصرين فالخلق أنهما مهدا الطريق تمهيدا ناجعا لأعمال القسم المنشأ حديثا بوزارة الزراعة لمباحث قصب السكر .

وفى سنة ١٩٢٥ اتفق الدكتور محمد على الكيلانى لما كان فى بعثة بكو يامع جناب المستر زل بمنزلة هرشى الوسطى على شحن عقل من عشرة من أشهر أصناف القصب بيشر بمستقبل حسن ، الى الجزيرة فصدرت فى منتصف سبتمبر ووصلت هنا بعد شهرين من تاريخ التصدير وفى طول هذا الوقت ما يكفى لتحلل بطاقات الأصناف فى مسحوق الفحم البلدى الجبل الذى كانت العقل محزومة فيه وترتب على ذلك أن الأصناف التى نصفها فقط نبت هنا قد أعطيت رقاما احتياطية بالجزيرة وهجرت حتى حقق المؤلف ( ٢٦ ) شخصيتها كالاتى :

جيزة ٤ = H. ١٠٩ وجيزة ٧ = BH. ١٠ ( ١٢ ) وجيزة ٨ = P.O.J. ٢٧٢٥ وجيزة ٩ = Uba وجيزة ١٠ = CH. ٦٤ ( ٢١ ) .

وكل هذه الأصناف ما عدا الصنف الأخير منها هي أصناف ذات شهرة في الممالك المختلفة فالصنف ١٠٩ II محقق تفريرا أنه هجين بين لاهينا (بوربون) وروزامبو (كريستالينا أو وايت تشريون) وهو القصب الأساسي في هواي حيث الأراضي أحسن أحوالا والرى متوفر والتي فازت بالرغم اقتصاسي العالمى في إنتاجه التجاري لاسكر من الفدان الانجليزى إذ ينتج ما يسكاد يبلغ ١٨ طنسا . والصنف ١٠ B II (١٢) . هو أحد العوامل الرئيسية التي ينسب اليها تضاعف الانتاج السنوى لاسكر في بورتوريكو حتى بلغ المثلين ، سواء عن الفدان الانجليزى أو عن المجموع في العشر السنوات الماضية (١٢) والصنف ٢٧٢٥ P.O.J. (٥) هو من نفس سلالة " القصب المدهش " الجاوى ، ٢٨٧٨ P.O.J. وهو يزرع بكثرة في فورموزا وناثال . والصنف أوبا U II هو الصنف التوجزى لأنواع القصب الصينية وهو ذو مناعة ضد المرض الفسيفاسى (مزايك) ولهذا السبب كان هو الصنف الوحيد الذى أبحاث حكومة أفريقيا الجنوبية زرهه في ناثال حتى اكتشف ستورى قابليته الفصوى لمرض الفسيفاسى (مخطط الورق) . والصنف ٦٤ CH (٣١) قال عنه متجه كاليفو (٤) إنه هجين بين أوبا و D ٧٤ غير أنه يرجح أنه نتيجة تلقيح ذاتى لبسودة من نوع أوبا إذ لم تظهر فيه صفات (saccharum officinarum) (سكارم أفسينارم) مطلقا (١٦)

وفي سنة ١٩٢٨ - ٢٩ استورد الدكتور ل. ه. ملتشرز بفضل من الدكتور ه. ي. براندز بفعل مباحث نباتات القصب التابع لوزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأصناف الآتية وهى : ٣٦ P.O.J. (M) و ٢٣٤ و ٢٧١٤ و ٢٨٨٣ ثم ٢٨١ Co.

وفي سنة ١٩٣٣ شغل لنا مستر فكو . ا. لويزدمينجر مدير محطة تجارب جزيرة بورتوريكو فعلا من قسمهم المباشر باستقبال حسن ٢٧٢٥ P.O.J. ١٢ S.C. (٤) بذرات من ٨٠٣ P.O.J. و ٩١٦ P.O.J. كما أن المستر رابوباهادور فنكاترهان خبير تجارب القصب بحكومة الهند بالمحطة الامبراطورية لتجارب القصب بالكويمباطور تفضل فأرسل له صنف ال ٢٩٠ Co. الذى منه خير بلوزيانا والهجن (كومباطور) ٣٩٨ و ٣٥٢ Co. ٣٩٩٥ .

وفي يونيه سنة ١٩٣٤ تكلم علينا مكتب مجموعة النباتات المجففة بدر بان من أعمال ناثال بإرساله عقل من صنف ٢٩٥٢ P.O.J. وفي الجزء الأخير من تلك السنة تمكن المؤلف ، وقت أن كان قائما بأمورية في بورتوريكو ، من الحصول من محطة تجارب الجزيرة على صنفين آخرين يشيران بخير وهما الهجينان ٢٧٢٥ P.O.J. × ١٢ S.C. (٤) و M.P.R. ٢٨ و ١٠١٧ F.C.

وفي الوقت الذى فيه عملنا ترتيبا لأن يسجن لنا من الهند وغيرها بعض أصناف تبشر بخير كثير فقد حددنا كثيرا من استيراد العقل بسبب الخطر الدائم الذى ينتج من إدخال أمراض أجنبية وآفات حشرية لاجود لها لحسن الحظ في مصر ، فمضابن تركيز جهودنا للحصول على أصناف ممتازة بترية أصناف جديدة من البذرة المهجنة (٢٨) . هذا ولو أننا يلزم أن نستورد بذورا من الخارج غير أنه لا يحتل إدخال آفات بهذه الكيفية .

### التجارب بالمطاعة

نظرا لقيام الدكتور الكيلانى بإكثار الأصناف المستوردة من كوبا وواشيجتون بمزرعة وزارة الزراعة بكونامبو فقد وجد في سنة ١٩٣٣ مقدار من التقاوى لتجارب شطرنجيه على الأصناف في مزرعة الوزارة بالمطاعة القريبة من هناك وبما أنه مع ذلك لم توجد التقاوى الكافية من التسعة الأصناف جميعها التى أردنا أن نقارن بينها في التجارب وبين P.O.J. ١٠٥ القياسى فقد تقرر أن تشحن بمركب ما يكفى من تقاوى كل صنف بقصد إدخالها بالمطاعة بحيث يمكننا القيام بعمل تجارب واسعة النطاق ومكبرة في أوائل السنة المقبلة (١٩٣٤) وكانت الأرض التى انتخبت للتجارب صفراء خفيفة لدرجة ما ذات تركيب متجانس جدا ظاهريا لخدمت جيدا بعد أن أخذ منها محصول فول وخططت باعتبار تسعة خطوط في كل قصبتين (٨٠ سنتيمترا تقريبا) ثم قسمت إلى قطع بلغت مساحة كل منها ثلاثة قرار يبط (ثمان فدان الجازى) خلال الأسبوع الأول من أبريل سنة ١٩٣٤ وزرع الخفل بالطريقة الجافة في ٩ أبريل وقد كرر كل صنف من العشرة الأصناف ثلاث مرات على غير نظام مدبروسقي في اليوم التالى وأعطيت ثلاث وعشرون رية إضافية كانت الأخيرة منها في ٥ فبراير سنة ١٩٣٥ وهو آخر تاريخ قبل الحصد بأقل من ثلاثة أسابيع وعرق أربع مرات كانت العزقة الأولى في ٨ مايو والأخيرة بعد أن ألت خدم خدمة وسطى في ٢٥ يونيه واستعمل في التسعيد ثلاث غرارات من ترومسلقات النواشدر . المحتوى على (٢٦ ٪ من الأذوت) كل غرارة مائة كيلو على دفعات متعددة في ٢ ، ٢٧ يونيه وفي ١٦ يوليه وأخيرا نظفت القنوات في ٥ يوليه .

وحصدت زراعات التجارب في ٢٤ ، ٢٥ فبراير سنة ١٩٣٥ وشحن محصول كل قطعة في عربة فردية مرقعة وعصر وحلل على حدة في معمل سكر أرمنت وأسفرت النتيجة عما يأتي فيما بعد . ولا يسع المؤلف إلا أن يبدى تقديره لمن شاركه في القيام بهذا العمل وهم جناب الخواجه كريستوفوروس ونوس بك مديرا معمل السكر بأرمنت كما يشكر حضرة مفتشى وزارة الزراعة حسن خليفه وزرق موسى والدكتور محمد على الكيلانى بقسم النباتات ومساعديه سليم نظيف افندى والحسينى النجار افندى على المساعدة الكبيرة التى بذلوها في إجراء التجارب وفي حصد محصولها .

غلات قصب السنة الأولى ( العروس ) بالمطاعة

الصفة	وزن القصب بالكيلو جرام عن كل قطعة خرد	القصب عن الفدان		وزن السكر بالكيلو جرام عن الفدان
		بالعام المتري	بالقناطير	
P.O.J. ١٠٥	٦٤٩٠			١٤٠٥
" "	٦٤٧٠			١٤١٣
" "	٦٤٩٠			١٢٠٨٢
P.O.J. ١٠٥	٦٣٥٠	٥٠٨٠٠	١١٣١	١٣٦٧
P.O.J. ٣٦ (M)	٥٩٤٠			١٤١٦
" "	٦٣٢٠			١٤٢٨
" "	٤٩٧٠			١٤١١
P.O.J. ٣٦ (M)	٥٧٤٣	٤٥٩٤٦	١٠٢٣	١٤١٨
P.O.J. ٣٦	٥٣٤٠			١٤٥٤
" "	٥٦٥٠			١٣٧٩
" "	٥١٧٠			١٤٧٧
P.O.J. ٣٦	٥٣٨٧	٤٢٠٩٤	٩٥٩	١٤٧٥
P.O.J. ٩٧٩	٤٧١٠			١٤٧٠
" "	٥٦٢٠			١٤٧٠
" "	٤٩٢٠			١٤٧٣
P.O.J. ٩٧٩	٥٠٨٣	٤٠٦٦٧	٩٠٥	١٤٧٣
P.O.J. ٢٨١	٥٠٤٠			١٤٣٣
" "	٤٠٣٠			١٣٧٩
" "	٥١٤٠			١٣٧٨
P.O.J. ٣٨١	٤٧٣٧	٣٧٨٩٤	٨٤٤	١٣٩٧
P.O.J. ٣٣٤	٤٦٨٠			١٤٣٣
" "	٤١٩٠			١٤٩٥
" "	٤٣٩٠			١٣٧٨
P.O.J. ٢٣٤	٤٤٢٠	٣٥٣٦٠	٧٨٧	١٤٣٥
H. ١٠٩	٤٣٧٠			١٣٧٨
" "	٤١٥٠			١٣٢٠
" "	٤٧٠٠			١٣٩٦
H. ١٠٩	٤٤٠٧	٣٥٢٥٤	٧٨٥	١٣٣١
P.O.J. ٢٧١٤	٣٨٦٠			١٤١٧
" "	٣٥٧٠			١٤٢٧
" "	٣٦٤٠			١٤١٦
P.O.J. ٢٧١٤	٣٦٩٠	٢٩٥٢٠	٦٥٧	١٤١٧
B.H. (١٢١)	٢٨٢٠			١٣٩٢
" "	٢٨٥٠			١٣٨٤
" "	٢٨٣٥			١٣٨٨
B.H. (١٢١)	٢٨٣٥	٢٢٢٨٠	٥٠٥	١٣٨٨
P.O.J. ٢٧٢٥	٢٥٤٠			١٦٠٠
" "	٢٥١٠			١٦٠٨
" "	٢٥٧٠			١٦٠٤
P.O.J. ٣٧٢٥	٢٥٤٠	٢٠٣٢٠	٤٥٢	١٦٠٤

يلاحظ بالنظر إلى الجدول أن القصب القياسي المخصص للقابلة وهو P.O.J. ١٠٥ فاق جميع الأصناف الأخرى بمراحل فكان متوسط غلته عظميا إذ بلغ ١١٣١ قطار من البندان وأكثر من ٥ طن من السكر عن الفدان فزاد عن أقرب صنف منافس بما فوق مائة قطار من البندان و ٣٤٥ كيلو جرام من السكر عن الفدان الانجليزي . وإن الفوارق بين المخطط (M) تدل على الكلمة اليابانية للفظ مخطط أى (Minka) والصنف المعتاد P.O.J. ٣٦ ليست ذات أهمية تذكر فباعتبار المحصول عروسا يوجد عادة فارق بسيط في غلة القصب بين الاثنين فالطرز المخطط حيث السكرز أحسن بدرجة بسيطة ، وباعتباره خلفه فإن الشكل المعتاد أكثر خشونة (٢٣) ويعطى على العموم غلات من البندان أحسن من غلة المخطط في حين أن فائدة P.O.J. ٣٦ (M) في احتوائه على السكرز تزداد عادة كلما تقدم القصب في السن ولم يحتفظ Co ٢٨١ بسمته من ناحية النضج المبكر جدا (٣ ، ٧) ولكن P.O.J. ٣٣٤ يحافظ على ميزته ألا وهي ارتفاع احتوائه على السكر (٢٥) — أما الأربعة الأصناف الأخيرة الواردة في الجدول فكانت قصيرة جدا وغير نامية مما يدل على أنها أنواع تمثل الطراز الاستوائى لا يلائمها موسم النمو عندنا لقصر مدته جدا .

وهذا الاستنتاج يؤيده احتوائها على السكر إلا في حالة P.O.J. ٢٧٢٥ الذى هو صنف مشهور بنضجه المبكر .

وقد شرع هذا العام (١٩٣٦) في عمل تجارب مزدوجة بمزرعة وزارة الزراعة بملوى بعد أن تم إكثار التقاوى الكافية هناك من الأصناف التى جربت بالمطاعة .

### خلاصة ونتائج

قد شهد عام السكر انقلابا عظيما في زيادة غلات القصب الناتج من الفدان وفى مجمل محصول العالم ومعظم السبب في ذلك تحسين الأصناف فوق تحسين العمليات الزراعية والمخصبات وطرق الري .

وأول أصناف جديدة من القصب أدخلت القطر المصري هى التى أتى بها هنرى نوس بك إلى نجع حمادى سنة ١٩٠٢ حين أدخل الصنف P.O.J. ١٠٥ مع عشرة أصناف أخرى فخل الأول تدريجيا محل الأنواع البلدية (تشرييون) التى كانت تزرع من قبل حتى أصبح ما يزرع اليوم منها لصناعة السكر قليل فقد زاد متوسط غلة القصب في مصر بفضل P.O.J. ١٠٥ بما يقرب من ٣٠ ٪ عن الفدان . وفى خلال الثلاثين عاما الأخيرة اختبر هنرى نوس بك وخلفه المسبوس . روش نجع حمادى نحو مئتي صنف استوردوها من بلاد مختلفة ولم يكن من بينها ما يتفوق على P.O.J. ١٠٥ باعتباره قصبا يزرع لغرض هام .

ونائج الاختبارات التى أجريت بالمطاعة على تسعة من الأصناف التى تبشر بنجاح عظيم استوردوها قسم مباحث القصب السكر تشيد إلى مثل هذا الاستنتاج ولا تزال التجارب مستمرة حتى الآن ، تجرى بملوى حيث عمل ترتيب لزراعة قصب السنة الثانية ومجموعات مزدوجة .

**ثالثا - العقل -** يلزم بيان متوسط الطول النسبي ولو أن ذلك لا يمكن عمله إلا على وجه عام إذ أن هذه الصفة تتوقف على حد كبير، على حالة النمو، وكثيراً ما تختلف اختلافاً عظيماً في مختلف أجزاء الساق فيلزم ذكر الشكل العام أو ريميل أم اسطوانى أم مضغوط في الوسط أم متضخم عند القمة أو في الجزء السفلى. أوجد به على الجانب السفلى فوق البرعم انخفاض كالأخدود أم لا يوجد لأن هذه نقطة هامة - وتدون كذلك ملاحظات على طول ذلك الأخدود وعمقه وما إلى ذلك.

**رابعا - العقد :** أى مبسوطة أو متجمعة أو متضخمة لدرجة واضحة أمكونة زوايا قائمة مع الساق أم مائلة ، إذ توجد جملة عناصر هامة ذات تأثير في تكوين المنطقة العقدية يلزم العناية بتدوين مذكرات عنها لأنها في غالب الأحيان ضرورية للتشخيص وهى :

(١) **حلقة النمو :** هى منطقة ضيقة تفصل العقدة من العقلة التى فوقها وقد تختلف أو لا تختلف عن العقلة لونا وقد تكون مبسوطة أو منخفضة أو مرتفعة وقد يختلف الاتساع بدرجة عظيمة . وفى هذه المنطقة يبنى النسج الخلقى فى حالة نمو صرن مدة أطول من باقى الساق و بالتقسام لخللايا التى على الجانب الأسفل ونموها يتمكن أحدث أجزاء العود نمواً من أن يستقيم بعد أن يكون قد أرفدته الرياح أو رقد بثقل وزنه .

(ب) **الشريط الجذرى** أو المسافة بين حلقة النمو ونقطة اتصال غمد الورقة قد يختلف عرضه باختلاف الأصناف من ٦ مليمترا إلى ١٢ مليمترا وهو يمتاز على وجه العموم بلون يختلف نوعاً ما لون العقل ويعرف بجملته صفوف دائرية غير منتظمة من نطق مستديرة هى رؤوس جذور مبدئية تنمو لتكون منها النظام الجذرى عند زرع القصب أو إنبات العين . ومن الضروري ذكر عدد صفوف الجذور وحجمها وبروز لونها وكثرة نهايات الجذور المبدئية .

(ج) **ندبة الورقة** هى بقية قاعدة غمد الورقة ، التى تبقى على الساق عند سقوط الورقة وهى عادة تكون بارزة أى ( خشنة الملمس ) تحت البرعم وقد تكون بارزة بأجمعها لكن يرجح أن تكون ظاهرة بقرب الجزء من الساق المقابل للجانب الذى فيه العين . والانسان كما أشار إيرل ، يصادف عادة دائرة صغيرة ظاهرة من زغب طويل على قاعدة غمد الورقة في عقد العود الصغير جدا ولكن هذا الزغب يسقط عادة ويزل قبل أن تنضج الورقة ويترك الندبة بعده ملساء أو "جرداء" وقد يبقى الزغب دائماً في بعض الأصناف فتبقى ندبة الورقة مهدبة ( ذات هدب ) بدرجة ظاهرة - وهذه علامة مميزة دائمة ذات أهمية عظمى .

## ملحق رقم ١

### وصف بسيط لأصناف القصب التى بالمطاعة

لوصف أصناف قصب السكر وصفاً يمكن الخبير وغير الخبير تمييزاً حاسماً يجب استخدام الطرق المتبعة في وصف النباتات كما يجب إلى حد كبير استعمال الاصطلاحات الفنية المعتادة في وصف النباتات أو تبويبها على حسب أجناسها وأول من حاول ذلك هو باربر (Barber) وتبعه وودهاوس (Woodhouse) وباسو (Busu) (٣٠) ألخند ثم أن إيرل (٦) (Earle) في مجموعات أوصافه النفسية عدل وكشف طريقة باربر (Barber) . وتبع المؤلف الخالى إيرل (Earle) في رسالته على أوصاف القصب (١٦) بيد أنه لم يذكر في الأوصاف الحالية عدداً من الصفات الأقل بروزاً منها للاتباس غير أنه يلزم مع ذلك أن يشمل الوصف النقط الآتية :

أولاً - عادة النبات العامة : أمتصب أم سريع الانبطاح أكثر العسالىج أم قليلها -  
قوته العامة .

ثانياً - ساقه بوجه عام ( أغليظة جداً - أم غليظة نوعاً - أم متوسطة - أم رفيعة - أم رفيعة جداً ) - اللون و "الازدهار" . فالعبدان التى يقل متوسط قطرها عن ثلاثة سنتيمترات توصف بأنها رفيعة جداً والتى يبلغ قطرها حوالى ثلاثة سنتيمترات تعتبر رفيعة والتى يبلغ قطرها من ٣ إلى ٣ ١/٢ سنتيمتراً - تعتبر متوسطة ، وإذا بلغ القطر من ٣ ١/٢ إلى ٤ سنتيمتراً تعتبر العبدان غليظة وإذا زاد عن ٤ سنتيمتراً تعتبر غليظة جداً مع ضرورة الإشارة طبعاً إلى متوسطات العبدان الجيدة التكوين ولا الضعيفة ولا المتقدمة فى السرى ولا الخلفة المتأخرة . ومع أن لون الساق من أظهر الصفات . فإنه كما إبان إيرل (٧) يكون داعياً إلى الاتباس إلى درجة كبيرة إذ أنه يتوقف غالباً على النمو والقوة والتعرض لضوء الشمس " وهذا يصدق بوجه خاص على تلك الأصناف الكثيرة التى تكون عادة خضراء وتصبح غريغالية اللون أو حمراء إلى حد ما عند ما تتعرض للضوء " فوصف اللون يلزم أن يشير إلى العقد الثامة النضج التى تتعرض بسبب سقوط الأوراق ولكنها لم تصبح ناصلة أو ذابلة . وتجب ملاحظة مقدار الطبقة الشمعية ولو أن هذا المقدار يختلف أيضاً لدرجة ما باختلاف أحوال النمو .

(د) الشريط المظلي بطبقة شمعية خضراء : هي المنطقة التي عرضها عادة نحو سنتيمتر واحد تحت نقطة ندبة الورقة مباشرة وتمتاز براسب من الشمع حتى في الأصناف التي بها قليل من الشمع أو التي ليس فيها شمع على العقل والتي تكون فيها هذه المنطقة ظاهرة جدا إذ لا يطمسها الإزدهار العام . وهذه المنطقة الشمعية هي بوجه عام غائرة بدرجة ظاهرة أو متقبضة ولو أن ذلك ليس بصفة دائمة في حين أن كلا من هذه المنطقة والمنطقة الجذرية قد تكون متنفخة بصفة واضحة في بعض أحوال كما في حالة مجموعة S.Barberi (سكارم باربري) وذات قطر أطول بكثير عن قطر العقل .

خامسا — البراعم أو العيون لها أهمية تنسيقية في علم الفصائل ، أكبر من أى جزء آخر من نبات القصب لأن صفاتها أقل تغيرا وتوفقا على حالات النمو على أنه يلزم أن يكون وصفها متعلقا فقط بالمفاصل الكاملة التكوين حيث البراعم لم تبدأ في الأنبات على الساق القائمة . وفي البلاد الشبه الاستوائية كصغر جرت العادة بأن العود البالغ من السن سبعة أشهر يكون تقريبا في أوفق حالة لدراسة أوصاف البراعم ويجب مراعاة النقط الآتية :

(أ) الشكل العام — أرمحي هو أم يبيض أو شبه يبيض أو مداريا أو شبه مداري أو زائدا في العرض عن الطول .

(ب) الحافة : أضيق هذه الحافة القاحلة ومتناسقة في الاتساع أو عريضة ومتناسقة أو "مجنحة" أى تتسع بغاة من الجهة السفلى .

(ج) الحجم : خصوصا من حيث علاقته بالعناصر المعقدة الأخرى وفي بعض الأحوال لا تصل قمة البرعم الى حلقة النمو في حين أنها قد تفوقها أحيانا بمقدار طول البرعم .

(د) الحصلة النمية : إن وجود خصلة صغيرة من الزغب على قمة البرعم أحيانا ما يكون من الصفات الصيفية الدائمة .

سادسا — الأعمدة الورقية تكون في بعض الأصناف مثل P.O.J. ٢٧,٢٥ أو B. ٩ ذات غطاء كثيف من زغب شائك يابس وحاد على أغلب وجهها يعرف غالبا "بجرب العود" لدى الشغالة الذين يسبب لهم تهيجا في بشرتهم وأعينهم . وقد يبقى هذا الزغب أو يسقط نوعا ما ثم يظهر على الأعمدة الحديثة ويسقط عند قرب النضج . ومن المهم أن نصف هذا الغطاء من حيث الصفة العامة والغزارة واللون . ذلك لأنه في بعض الأصناف لا تشمل الأعلى قليل من الزغب المبعثر بطول الخط الأوسط في الجزء الخلفي للغمد (أملس تقريبا)

وفي البعض الآخر لا يوجد مطلقا (أملس) فالذا وجد على الغمد كثير من راسب شمعي فإنه يسمى "بالغطاء الشمعي" وهو عادة ذو لون أخضر ولكن في بعض الأصناف توجد صفات مميزة عند ما يكون ملونا باللون الأحمر أو الأرجواني وقد يكون أرجوانيا أذكن تماما متجانسا كما في الصنف D. ١١٣٥

سابعا — النصال الورقية قد تكون مفردة قائمة بروس مائلة أو قائمة بالضبط كما في الصنف Cn. ٢٨١ وقد تختلف لونا من الأخضر الخفيف أو المصفر كما في P.O.J. ٣٦ إلى الأخضر الداكن أو الشمعي أو المزرقي أو البصل كما في Cn. ٢٨١ مع ضرورة ملاحظة ضيقة هي أم متوسطة أم عريضة قليلا أو كثيرا (كما في الصنف P.O.J. ٣٧١٤) وفي بعض الأصناف تكون حواف الورقة مسننة تسننات عميقة في حين أنها تكاد تكون ناعمة في البعض الآخر .

### الصنف P.O.J. ١٠٥

مستقيم ، شديد ، عظيم الإشطاء ؟ طول الساق — نحيل نوعا — بصير كهيواني اللون عند ما ينضج — ذو طبقة شمعية ثقيلة جدا — عقله طويلة أسطوانية أو مضغوطة قليلا جدا مائلة ميلا خفيفا جدا — ذات أخدود واضح والعقد بارزة ومتضخمة وحلقة النمو عريضة ومنبسطة ومائلة إلى الصفرة والعصبة الجذرية عريضة والجذور الأولية غير ظاهرة وأرجوانية في ثلاثة صفوف متساوية جميعها وليست مضغوطة من الخلف (تجاه البرعم) ومكونة لأوسع جزء في الساق والشريط الشمعي غير واضح لأنه مغموس بالطبقة الشمعية التي على العقل — والبراعم كبيرة مثلثة الشكل — ذات حافة واسعة — مجنحة جدا (كما هي الحال في البلدي) — جرداء تقريبا — والأعمدة الورقية جرداء وملونة — والنصال الورقية شبه قائمة ولكن رؤوسها منحادة طويلة ضيقة خضراء زاهية لا تكاد تكون مسنة .

### P.O.J. ٣٦

مستقيم ، قوى جدا عظيم الإشطاء ؟ سيقانه طويلة ونحيلة قليلا (مثل P. O. J. ١٠٥ تقريبا) والقاعدة خضراء بغشاها لون وردي يضرب إلى الأرجواني الأحمر والطبقة الشمعية معتدلة والعقل طويلة أسطوانية ميل إلى الرقود قليلا جدا . لا يكاد الأخدود أن يكون واضحاً — والعقد عريضة بارزة مائلة غير متقبضة وحلقة النمو ضيقة مستوية استواء العقل ، خضراء تؤول خضرتها إلى السمرة المشربة بحمرة خفيفة — والمنطقة الجذرية عريضة محدودة جيدا مرتفعة متناسقة اللون ذات غطاء شمعي والجذور الأولية صغيرة غير ظاهرة ليلية جدا ومبعثرة في صفين أو ثلاثة صفوف ، ويختلف لونها فقد تكون أرجوانية تقريبا وقد تكون ذات لون واحد متناسق ، والنسبة الورقية جرداء — عريضه بارزة في الأمام ومتلاصقة



في الخلف — والمنطقة الشمعية ظاهرة — وليست متقبضة — والبراعم كبيرة ممتلئة وواسعة العرض عن الطول وتكاد تزيد عن منطقة النخ، مدارية، حوافها عريضة، متجانسة والخصلة القديمة ظاهرة وذات زغب قصير، والأعمدة الورقية جرداء تقريبا مغطاة بطبقة شمعية خفيفة وملونة نوعا ما وقاعدتها الداخلية أرجوانية لدرجة ما — والنصال الورقية مفردة قليلا وقمها مائلة، ضيقة ومدمبة تديبا طويلا ومسننة قليلا حتى القاعدة .

#### الصفحة P.O.J. ٣٦ (M)

ليس إلا نوعا ملونا من شوارد P.O.J. ٣٦ يميل لأن تكون بعقله الغير الناضجة خطوط صغيرة ملونة باللون الوردى ولكن هذا ليس دائما . وفيما عدا ذلك فهو يشابه P.O.J. ٣٦ المعتاد تمام المشابهة .

#### الصفحة P.O.J. ٢٧٩

مستقيم ذو قوة عظيمة وسبقاته طويلة ومحيطه متوسط وهو أخضر أرجواني يانع وأفر الطبقة الشمعية وعقله طويلة ، اسطوانية تقريبا وهو ميل للرقود قليلا ، وأخدوده عريض غير غائر أو معدوم والعقد مرتفعة قليلا ومائلة ، مغطاة بالشمع وذات لون واحد والجدور الأولية صغيرة لا تكاد ترى — قليلة، مبعثرة وتشغل صفين أو ثلاثة أو أربعة وهي سيمرا . والنديبة الورقية جرداء عريضة بارزة من الأمام ومتصلة من الخلف والمنطقة الشمعية غير ظاهرة وتكاد تكون منبسطة والبراعم بين المتوسط والكبير ولا تزيد عن حلقة النخ . مدارية ، حوافها واسعة ، مقطوعة الطرف — وأعمدة الأوراق لمساء ليس بها شع لونها أخضر خفيف ، نصال الورقة مستقيمة — أطرافها مائلة واتساعها متوسط ولونها ضارب إلى الأخضر المائل إلى الزرق القاتمة وثلاث الحافتين العلين مسننان .

#### كواديباتور (Cn ٢٨١)

مستقيم جيد القوة حسن الأشطاء طويل السيقان رفيها جدا بلون النبيذ كثيف الطبقة الشمعية ، طويل العقل اسطوانية ميل إلى الرقود قليلا جدا خال من الأخاديد والعقد تكاد تكون منبسطة ، متوازية وحلقة النخ واسعة ، مرتفعة قليلا لونها أخضر ثم يتغير إلى لون واحد والمنطقة الجذرية واسعة، متوازية ، خضراء ضاربة إلى الصفرة أو متناسقة اللون والجدور الأولية كبيرة ، قليلة ، مبعثرة ، غير ظاهرة ، في صفين أو ثلاثة — لونها ضارب إلى الأرجواني أو متناسق — والنديبة الورقية جرداء متصلة من الخلف —

والمنطقة الشمعية واسعة ، ظاهرة ، متقبضة قليلا — والبراعم مجتمعا متوسط — بضيئة ناقصة عريضة واصلة إلى حلقة النخ ، حوافها ضيقة جدا ، منبسطة على النصف العلوي فقط ، جرداء ، ليس لها خصلة قبة والأعمدة الورقية ملساء مغطاة بطبقة شمعية وملونة قليلا عند قاعدتها الخارجية فقط والنصال الورقية مستقيمة ذات قمم مائلة نوعا ، ضيقة لونها أخضر مغطى بطبقة شمعية — مسننة أسننا متجانسا دقيقا .

#### P.O.J. ٢٣٤

مستقيم — قوى — مفرع نوعا طويل الساق نحيلها لونها مائل إلى الخضرة القاتمة التي يشاهدها بعض الأحمر والعقل طويلة ، اسطوانية أو منسعة نوعا من الأسفل ، مستقيمة ، أخدودها لا يكاد يكون واضحا ، والعقد عريضة ، متضخمة وحلقة النخ عريضة ، ضاربة إلى الصفرة ، منبسطة والمنطقة الجذرية منسمة — والجدور الأولية مظلمة لا تكاد ترى والنديبة الورقية جرداء ، ضيقة ، منمتصة من الخلف — والمنطقة الشمعية واضحة غير متقبضة والبراعم صغيرة تفوق حلقة النخ ، مدارية ، تكاد تكون نصف كرية ، جرداء ، والأعمدة الورقية جرداء ، والنصال الورقية مفردة، كثيرة ، ضيقة، متديلة على الساق ومسننة قليلا .

#### (Hawaii) H ١٠٩

مستقيم ، جيد القوة حسن الأشطاء طويل السيقان ذو محيط جيد قرمزي مخضر أو أرجواني قائم ، يصير أحمر محمرا عند النضج — ذو طبقة كثيفة من الشمع الرمادي الذي يصبح قاعيا بمضى الزمن ، والعقل متوسطة أو طويلة ، ميالة إلى الرقود نوعا ، اسطوانية، ملتصقة قليلا في الجوانب ومتقبضة عند القاعدة تجاه البرعوم، يوجد أثر لأخدود أو لا وجود لأخدود مطلقا والعقد مائلة ، منبسطة أو مرتفعة قليلا ، وحلقة النخ عريضة ، منبسطة تقريبا ، خضراء أو منسقة اللون — والمنطقة الجذرية واسعة، مائلة ، لونها أخضر خفيف أو منسقة اللون والجدور الأولية كبيرة ، ظاهرة ، كثيرة العدد — في ثلاث صفوف أو أربعة ، أرجوانية أو ملسقة اللون — والنديبة الورقية جرداء ، متقبضة في الخلف — والمنطقة الشمعية عريضة ، منبسطة تقريبا ، غير ظاهرة والبراعم متوسطة الحجم ، واصلة إلى حلقة النخ، ممتلئة ، خضراء أو حمراء أو أرجوانية ، مدارية ، حوافها ضيقة ، مسنوبة ، جرداء ، أرجوانية ، مقعرة في الوسط ولكن تكون أحيانا حادة ، أعرض في الجوانب العلوية ثم تأخذ في أن تضيق تدريجيا وتنتهي في وسط البرعوم ، والخصلة القمية قصيرة والأعمدة الورقية ذات وبر ظهري غزير (خشي أكثر من شوك) والجوانب جرداء واللون أرجواني ضارب إلى الخضرة والقاعدة الداخلية مشربة قليلا بالأرجواني — والنصال الورقية مستقيمة ذات قمم مائلة عريضة، لونها أخضر قائم وحواها مسننة حتى القاعدة تسنينا دقيقا متجانسا .

مستقيم ، جيد القوة ، جيد الأشطاء ، طويل السيقان قويها جدا والساق سمراء مخضرة  
 مصفر أو أخضر قائم يشاه لون برنزي عند التعرض للشمس ، وليس مغلى بطبقة شمعية  
 والعقل متوسطة أو طويلة ، اسطوانية ، ملتصقة قليلا في الجوانب مائلة إلى الانحناء نوعا ما  
 أو ليست كذلك كاسية والأخدود خفيف أو ضيق عميق ممتد إلى أكثر من نصف العقلة  
 والعقد متقبضة قليلا ومائلة وحلقة الخو عريضة منبسطة أو مرتفعة قليلا أحيانا ، لونها  
 يختلف من أخضر فاتح حتى اللون المتناسق — والمنطقة الجذرية مائلة ، متوسطة الاتساع  
 ذات لون واحد — والجذور الأولية قليلة وكيرة — في ٢ — ٣ صفوف — لونها يختلف من  
 القرمزي نوعا إلى اللون المتناسق وهي غير ظاهرة والندبة القمية جرداء — متقبضة في الخلف  
 وبارزة في الأمام والمنطقة الشمعية ضيقة ، متقبضة قليلا ، ظاهرة ، والبراعم ذات حجم  
 متوسط ، تفوق حلقة الخو بمقدار الربع أو الثلث ، بيضية ناقصة أو شبه بيضية ، حوافها  
 عريضة مستوية على النصف الأعلى فقط — مجنحة ومقطوعة في الجوانب فتجعل شكل  
 البرعم قمميا — والخصلة القمية طويلة — والأعمدة الورقية خضراء في الداخل والخارج —  
 شائكة بفرارة في الخلف — جوانبها جرداء — والنصول الورقية مفردة ولها أطراف مائلة  
 دريضة جدا خضراء قائمة ذات غير أبيض ، حوافها مسننة تسنينا متسقا .

مستقيم ، جيد القوة حسن الأشطاء ، طويل السيقان قويها جدا والساق سمراء مخضرة  
 ينشأها طمخ أرجواني إذا تعرضت للشمس ، والطبقة الشمعية عظيمة والعقل طويله ،  
 اسطوانية ، عمودية على الساق — به أثر لأخدود أو أخدود ضيق ، منبسطة انبساطا قصيرا  
 والعقد متضخمة ومتوازية وحلقة الخو ضيقة ، تكون منبسطة وهي صغيرة وتأخذ في الاتساع  
 وتصير مرتفعة وهي كبيرة ولونها أخضر مصفر أو تكون ذات لون واحد — والمنطقة الجذرية  
 واسعة ، وبارزة قليلا ، لونها يختلف من أخضر خفيف حتى اللون المتناسق — والجذور  
 الأولية قليلة ، كبيرة مبعثرة ، مرتفعة ، في ثلاثة صفوف أو أربعة ، أرجوانية اللون ، والندبة  
 الورقية جرداء وملتصقة في الخلف — والمنطقة الشمعية ضيقة ، غير ظاهرة مدببة والبراعم  
 متوسطة الحجم ، بيضية عريضة القاعدة ، وأصلة إلى حلقة الخو ، وحواها ضيقة ، مثلثة الشكل  
 ذات وبر متباعد والخصلة القمية طويلة كثيفة — والأعمدة الورقية لها وبر غزير في الخلف  
 وذات زغب أسمر خشن وجوانبها جرداء ، خضراء والنصال الورقية منتشرة عريضة جدا  
 ( مثل ٢٧٢٥ P.O.J. تقريبا ) خضراء قائمة غير منبسطة — مسننة تسنينا دقيقا متجانسا  
 حتى القاعدة .

## \* ١٠ B.H. (١٢)

مستقيم أو مائل نوعا قوى ، قوى الأشطاء سيقانه طويلة وثخانتها متوسطة ولونها مائل  
 إلى الخضرة ولكن سرعان ما ينشأ لون قرمزي قائم مخطط وغالبا ما تكون به بقع ناصلة .  
 والطبقة الشمعية عظيمة . والعقل متوسطة الطول مائلة متقبضة نوعا — عريضة من أسفل  
 ومجنحة تجاه البرعم — والعقد متقبضة ، مائلة — وحلقة الخو عريضة على الأرجح غير أنها  
 غير واضحة — وهي متضخمة في الكتف الخلفي — والمنطقة الجذرية مائلة ذات لون واحد  
 أو أنفصل ، مدببة إلى الأسفل ، والجذور الأولية صغيرة لونها ضارب إلى الأرجواني —  
 على ٣ — ٤ صفوف — والندبة الورقية جرداء ملتصقة في الخلف والمنطقة الشمعية متقبضة قليلا  
 تظمها قليلا الطبقة الشمعية التي على العقل — والبراعم مدارية تقريبا ، تفوق حلقة الخو قليلا ،  
 حوافها ضيقة ، متجانسة ، كثيرا ما يكون لونها ضاربا إلى الأرجواني ، لها غطاء قى متباعد  
 الأجزاء — والأعمدة الورقية لها غطاء متفرق من زغب قصير ملتصق ، لونها أخضر أو هي  
 ذات لون خفيف جدا وعليها طبقة شمعية ضئيلة والنصال الورقية شبه مستقيمة ذات أطراف  
 مائلة ، مستوية ، أكبر اتساعها فوق الوسط ، لونها أخضر خفيف ، وهي مسننة تسنينا دقيقا .

## كشـف

بأسماء الموظفين الفنيين التابعين لقسم تربية النباتات  
الذين في الدرجة السادسة فما فوق



يستورد بنقلان أو ثلاث طن من الخارج وهذه يجب إنتاجها للحصول على نقاي كدية لتجارب

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| جناب الدكتور ج . تملتون .           | حضرة يوسف شبتاي افندى .      |
| » » براون .                         | » محمد بدر الدين افندى .     |
| » المستر ه . ا . هانكوك .           | محمد عفيفي حسين افندى .      |
| » الدكتور ج . فيلب .                | رياض نجيب افندى .            |
| » المستر روز نفليد .                | أحمد يوسف افندى .            |
| » المستر ف . دانكرلى .              | محمد محمود صالح افندى .      |
| حضرة أرمناك بديفيان افندى .         | محمود فهمى الكاتب افندى .    |
| » محمد عبد الديب افندى .            | محمود عبد الباقي افندى .     |
| » الدكتور محمد علي الكيلاني افندى . | أحمد زكى أبو النجا افندى .   |
| » محمود فائق افندى .                | محمد صادق افندى .            |
| » محمد عبد الله زغلول افندى .       | عبد الفتاح السيد افندى .     |
| » محمد سعيد أبو العطا افندى .       | فوزى ساويرس بسطا افندى .     |
| » الدكتور وديع شارويع افندى .       | الدكتور حسين المغيرة افندى . |
| » محمد عبد العزيز القشيرى افندى .   | أحمد زكى عبد الجواد افندى .  |
| » عبد الحميد جلال محرز افندى .      | سلم نظيف افندى .             |
| » محمود جوهر افندى .                | ابراهيم حمدى افندى .         |
| » عبد الحميد سويلم افندى .          | عبد العزيز مصطفى عمر افندى . |
| » أحمد منير افندى .                 | عثمان عبد الحافظ افندى .     |
| » عبد الغفار سليم افندى .           | محمد علي سليم افندى .        |
| » البيرونيستين افندى .              |                              |

## بعض الصفات المميزة عند الوصف




المقل مستقيمة الوضع والعين بضاوية الشكل  
لا تمتد قنبا حلقة النور



العين تمتد قنبا منطقة النور بمقدار  
ثلث حجمها والمنطقة الشمعية واضحة  
والخط المحوفاً أعلى العين بطول  
المقلة نظرياً

## بعض الصفات المميزة عند الوصف



- (من أعلى لأسفل) العقدة — منطقة النمو —
- الحلقة الجذرية — (أثر الدودة —
- المنطقة الشحمية — الجذور الأولية



العقل متقابلة الوضع

وزارة الزراعة

قسم تربية النباتات

# النشرة الفنية

رقم ١٦٩

ما يحتاج اليه قصب السكر من السماد بمصر  
خير مقدار ملائم في تجارب الآزوت

بقلم

أرثر هـ . روزنفلد

خبير زراعة قصب السكر

ترجمها

محمد عبد الحميد القمري افندى

(أوصت لجنة المطبوعات بوزارة الزراعة بطبع هذه النشرة ولكنها غير مسئولة عن الآراء المدونة بها )

طُبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة ٤ سنة ١٩٣٧

تباع مطبوعات الحكومة بصالة البيع بوزارة المالية ، أما المكاتبات  
الخامسة بهذه المطبوعات فيرسل رأسا الى قلم النشر بالمطبعة الأميرية

التمر ٣٠ مليا

## فهرس النشرة

صفحة

١	المقدمة
٢	اختيارات المطاعة
٤	نتائج قصب السنة الأولى (الجدول رقم ١)
٧	» الثانية ( رقم ٢ )
١٠	تجارب ملوى
١١	أرقام تفصيلية عن المحصول (الجدول رقم ٣)
١٤	اختيارات ثرات الصودا (الجدول رقم ٤)
١٦	اختيارات كوم امير
١٧	كوم امير قبل (الجدول رقم ٥)
٢٠	عظمور قبل (الجدول رقم ٦)
٢٢	الاسماجيلية (الجدول رقم ٧)
٢٥	نتائج تلخيصية (الجدول رقم ٨)
٢٦	بعض نتائج مشابهة في لوز ياقا
٢٧	تجارب على الثرات والسياناميد (الجدول رقم ٩)
٣٠	تجارب على مقدار الأزوت بهوما (الجدول رقم ١٠)
٣٣	الخلاصة
٣٥	المراجع

## الرسومات البيانية

2016.11.1

أولا	-	نجاوب نسب الأزوت بمولى - الفلاث	... ..	في مقدمة الرسالة
ثانيا	-	نجاوب نثرات الجبر بمولى - القيم القندية	... ..	١٤
ثالثا	-	بجودة القصب ونسب الأزوت بمولى ... ..	... ..	١٨
رابعا	-	نجاوب ثمرات الصودا - القيم القندية	... ..	١٥



## ما يحتاج اليه قصب السكر المصرى من الأسمدة

خبر نسب في تجارب الآزوت

تقدم صنع الآزوت التركيبي تقدما محسوسا باستمرار في جميع أنحاء العالم في خلال العشرين عاما الماضية وصادف بلوغ النهاية القصوى في إنتاجه بدء الأزمة الاقتصادية العالمية في سنة ١٩٣٩ فهبطت أثمان وحدة الآزوت بأكثر من النصف على حين أن استعمال الأسمدة الآزوتية قد بلغ المثلثين تقريبا ، في جميع أنحاء المعمورة .

وهنا يصبح السؤال عما إذا كانت صناعة السكر المتزايدة استفادت من هذا الهبوط ( ٥٠ ٪ أو أكثر ) في ثمن وحدة الآزوت ونتيج من ذلك تخفيض نسبي في مجمل تكاليف إنتاج القصب .

يظهر على العموم أن الجواب على ذلك يكون بالسلب قطعيا ، على الأقل في بلاد القصب القريبة من خط الاستواء ، ولا يزال المؤلف ( ٣٢ ) " يتذكر جيدا كيف أنه منذ بضع سنين ، وقت أن كانت الأسمدة الآزوتية غير العضوية ممكن شراؤها في لويزيانا بنصف ثمنها منذ سنتين فقط ، لاقى صعوبات في إقناع بعض من أكبر الزراع المصلحين أنه لم يكن لديهم حق في صرف المبالغ المعتاد صرفها لتسميد الفدان بمضاعفة الكميات .

ويؤكد الحاذقون الأكفاء من الزراع بالقطر المصرى أن كل غرارة من السباد بحرف النظر عما إذا كانت من الترات المحتوى على ١٥- ٪ من الآزوت أو من ترو سلفات النواذر أو الذرير الذى يحتوى على ٣٦ ٪ ، يزيد المحصول مائة قنطار على رغم قانون تناقص الغلة . وما تشهد به مزارعهم الخاصة من أن الإكثار من الآزوت كثيرا ما ينج عنه رداءة رقاد السبدان أو تأخير في النمو والنضج وقد يستلزم الحال قطع القصب لارساله الى المعامل وتكون النتيجة الحصول على محصول أردأ وأقل وزنا مما إذا كان التسميد بالمقادير المناسبة من الآزوت أى بمراعاة الاقتصاد . ويشاهد في بعض الجهات أن الفدان يعطى أربع غرارات من الترو سلفات أى أكثر من مائة كيلو من الآزوت وهى كمية تدعو الى الاستغراب في بلدة يمكث موسم النمو فيها من ثمانية أشهر الى ثمانية أشهر ونصف على الأكثر .

على أنه قبل انخفاض أسعار الأسمدة الحالى بسنين كان من المحقق على وجه العموم أن استعمال الأسمدة بكثرة يؤثر تأثيرا ضارا بجودة العصاره ، ولم يكن مسموحا عدة مسنين

قصبين ( أى متباعدة بنحو ٨٠ سنتيمترا ) — وبعد ذلك بأسبوع عملت القنوات ونظفت بطون الخطوط وغرست تقاوى الصنف P.O. ١٠٥ على الجفاف في صفين متصليين ، تالين في الأسبوع الأخير من فبراير ثم رويت الأرض بعد ذلك مباشرة . هذا وكل ما يعقب ذلك من خدمة الأرض ورعاها هو نفس ما سبق الكلام عليه في نشرة المؤلف الأخيرة الخاصة بتجارب المسافات في زراعة القصب ( ٣٣ ) الا فيما يخص التسميد — مع نفس الاعتراف بالشكر لمن شاركوه في إجراء التجارب وحصد المحصول وقد استعملت تروسلفات النشادر المحتوى على ٢٦٪ من الأزوت كأساس في اختبارات المطاعة لأنه كان المادة المنيعة استخدامه بوجه عام لتسميد قصب السكر هناك ووضعت ستة مقادير للفدان يتبدئ من غرارة ونصف أى ( ١٥٠ كيلو جراما ) نحو ٤٠ كيلو جراما من الأزوت ، للفدان وقد زيد على ذلك زيادات من نصف غرارة الى أربع غرارات أى ما يبلغ ١٠٥ كيلو من الأزوت للفدان واعدت هذه النهاية العظمى بوجه عام في مركز المطاعة ، وقد سمدت الأرض بثلاثة مقادير : الأولى في ٩ مايو سنة ١٩٣٣ والثاني في أول يونيو والأخير بعد ذلك بشهر . وقطع المحصول بعد ابتداء التجربة بسنة تماما ووضعت النتائج بالتفصيل كما هو وارد بالجدول رقم ١

باستعمال الأسمدة في الأراضي التي كانت تديرها الدائرة السنية القديمة . ولا شك أن هذا التأثير السيئ يزداد في البلاد التي موسم النمو فيها قصير كصير ولوزيانا أو الجمهورية الفضية عند ما يعطى الأزوت بغزارة أو متأخرا . فان ذلك لا يؤخر نضج القصب الأصل فقط ، بسبب وجود مقدار كبير من الأزوت في الوقت الذي فيه يجب أن يتبدئ في النضج ، بل أنه يشجع نمو الخلفة لدرجة أنها تبلغ حدا في الحجم لا في النضج ، يؤهلها لأن تضاف الى القصب الذي يرسل عادة الى المعامل .

ولتحديد ما يسميه جيرتس ( ١٤ ) في جافة ( كمال الاقتصاد ) في استعمال الأسمدة الأزوتية في عدة تربات ومراكز مصرية أو بعبارة أخرى وحدات الأزوت ، الوارد من جهات معينة ، التي تنتج للمزارع أعظم الأرباح التقديرية عن الفدان مقدرة بالقروش ، ما دام أنه من الواضح أن ليست هناك فائدة تجارية من الحصول على غلة متزايدة من استعمال الأسمدة بغزارة اذا لم تكن قيمة زيادة القصب تموض ثمن الأسمدة الإضافية وزيادة ، ثم للبحث أيضا في تأثير ذلك على كل من محصول القصب وسكره ، فلتقرير ما تقدم قد قام المؤلف في سنة ١٩٣٢ بإجراء عدد كبير من التجارب المكثرة الواسعة النطاق في كثير من الجهات الشهيرة بزراعة القصب في الوجه القبلي واستعمل فيها الأسمدة الأزوتية من مختلف المصادر بمقدار ٣٠ و ٤٠ و ٤٥ و ٥٠ و ٦٠ و ٦٥ و ٧٥ و ٨٠ و ٩٠ و ١٠٥ كيلوجراما للفدان . ولا تزال تجري جملة تجارب لمعرفة تأثير إضافة حامض الفوسفوريك الى النسب المختلفة للأزوت إلا أنه سيأتى الكلام عليها في مقال خاص بما أن الأزوت هو أهم العناصر السائدة المستعملة الآن في زراعة قصب السكر بصير ، ونحسن بحث موضوع مقادير مختلفة من الأزوت الوارد من مختلف المصادر ، بمفرده من الوجهة الاقتصادية بطريقة غير معقدة بقدر الامكان . وقد جعلت مساحة كافة القطع واحدة وهى أربعة قراريط وفي محصول هذه القطع ما يكفى لمنع تأخير العمليات في المعمل عند عصر محصول القطع المكثرة أو تحليلها وبهذا يتجنب الخطأ الناتج من محاولات غير مجدية يقصدها الوصول الى نتائج هامة من تحليل عينات صغيرة تمصر بالعصارات اليدوية . وقد كررت كل معاملة أربع مرات على الأقل وكان ترتيب القطع على غير نظام مدبر .

### اختبارات المطاعة

تجري تجارب حقل المطاعة التابع للوزارة في أرض صفراء خفيفة نوعا ما ، خصبة جدا متجانسة التركيب كانت مزروعة فولاً وذرة في السنة السابقة . وقد حرثت بالمحراث الحرار حرا جيدا في منتصف ديسمبر سنة ١٩٣٢ ثم حرثت ثانيا وزحفت في أوائل يناير سنة ١٩٣٣ ثم في أول فبراير قسمت الى أجزاء قيست بكل عناية — مساحة كل منها سدس فدان ومفصول بعضها عن بعض بفواصل عرضية ثم عملت الخطوط باعتبار تسعة خطوط في كل

الجدول

رقم ١

في بحيرة المطاعة

مقدار الآزوت

مقدار الآزوت - ٥

المنطقة ١١ - ٢٣ الى ٢٤ - ٢٥

البيانات				مقدار الآزوت			
معدل العائد بالطن		مقدار السكر		معدل العائد بالطن		مقدار السكر	
وزن السكر	معدل العائد بالطن	النقاوة	معدل العائد بالطن	وزن السكر	معدل العائد بالطن	النقاوة	معدل العائد بالطن
٤٥١٤	٣٥	٨٤٥	١٣٧٢	٩٦٤	٤٣٣٢٠	٦٩١٠	٣ - ١
	٣٨	٨٣٢	١٣٣٢			٦٦٦٠	١١ - ١
	٤٧	٨١٧	١٢٩٩			٧٥٤٠	١٨ - ١
	٤٤	٨٢٥	١٢٧٨			٧٧٥٠	٢٠ - ١
	٤١	٨٢٩	١٣٢٠			٧٢١٥	المتوسط
	٣٥	٨٢٦	١٣٢٤			٧٣٨٠	٥ - ١
٤٧٧٣	٣٩	٨٢٧	١٣٦٧	١٠٠٢	٤٥٠١٥	٧٦١٠	٩ - ١
	٣٣	٨١٣	١٣١٧			٧٣٧٠	١٤ - ١
	٤٧	٨٢٥	١٣٥٠			٧٧٠٠	٢٢ - ١
	٤٤	٨٢٥	١٣٤٠			٧٥١٥	المتوسط
	٣٢	٨٥٦	١٣٩٦			٧١٥٠	٤ - ٢
	٥٧	٨٠٦	١٣٦٥			٦٦٩٠	٧ - ٢
٤٤٨١	٥٧	٨١٩	١٣١٩	٩٥٩	٤٣٠٨٠	٧٦٢٠	١٥ - ٢
	٥٤	٨٠٨	١٣١٧			٧١٨٠	٢٣ - ٢
	٥٠	٨٢٢	١٣٢٤			٧١٦٠	المتوسط
	٤٥	٨٢٦	١٣٤٢			٦٨٧٠	٢ - ٣
٤٥٣٨	٣٣	٨٣٥	١٣٤٥	٩٩٥	٤٤٦٨٥	٧٥٦٠	١٠ - ٣
	٥٨	٧٩٣	١٣٣٦			٧٦٢٠	١٣ - ٣
	٣٨	٨٠٣	١٣٨٤			٧٣٦٠	٢٤ - ٣
	٤٤	٨١٤	١٣٠٢			٧٣٥٣	المتوسط
	٢٩	٨٤٨	١٣٧٢			٨٤٧٠	٦ - ٣
٤٧٠٦	٤١	٨١٣	١٢٩٢	١٠٢١	٤٥٨٨٥	٦٩٩٠	٨ - ٣
	٣٣	٨١٨	١٣٠٧			٧٩١٠	١٦ - ٣
	٥٦	٨١١	١٢٤١			٧١٢٠	١٩ - ٣
	٤٥	٨٢٣	١٣٠٣			٧٦٢٣	المتوسط
	٤٣	٨٢٤	١٣٢٨			٧٠٣٠	١ - ٤
٤٦٠٩	٣٧	٨٢٩	١٣١٦	١٠٠١	٤٤٩٨٥	٧٦٦٠	١٢ - ٤
	٥٠	٨٠٧	١٣٦٦			٧٤١٠	١٧ - ٤
	٣٠	٨٢٥	١٣١٧			٧٧٣٠	٢١ - ٤
	٤٣	٨٢١	١٣٠٧			٧٤٥٨	المتوسط
		٨٢٥	١٣٢٦				>
		٨١٩	١٣٠٤				>

ثلاث سميات أصغر  
ثلاث سميات أكبر

هذا وأن فوارق متوسط الغلات في مجموعات التجارب صغيرة جدا ليست ذات أهمية من ناحية تأثير استعمال المقادير الكبيرة من الأزوت لقصب السنة الأولى الذي يعقب الخضروات في أرض غنية إلا أنها ذات أهمية كبيرة في الدلالة على أننا أو ابتدأنا بنحو أو بغيره كيلوجراما من الأزوت للفسدان زدنا عن اللازم جدا ، وأنه في مثل هذه الظروف لا معنى لوضع أكثر من تحسين كيلو من الأزوت للفدان أو ببساطة أخرى أن أى مقدار يزيد على تحسين كيلو جراما من الأزوت للفدان الانجليزي لا يكون ممنا إلا ضياعه مهما كان نوع السداد . وهذه الدلالة في حد ذاتها هامة ويظهر أن خبرة جناب المسبور . روش ، مدير فاورقة السكر بنجع حمادى ، الطويلة تؤيدها فهو يرى أن في أحسن الأراضي هناك وهى الأرض التى تتألف في الجودة الأرضي الخصبة المطاعة تنتج أحسن غلة من تسميد قصب السنة الأولى باستعمال غرارة واحدة فقط من النتروسلفات أو ما يعادل أزوته نحو ٣٦ كيلوتقريبا للفدان من أى سماد آخر .

هذا وإن تأثير التسميدات الأثقل على محتويات القصب من السكر ليس واضحاً والفروق الخفيفة لا يعتد بها إحصائياً إلا أنه ما هو جدير بالانتماءات أن القصب المسمد بالتسميدات الثلاثة الخفيفة كان متوسط غناه بالسكر ربع درجة زيادة عن القصب المسمد بالتسميدات الثقيلة أى يحصل من كل طن منه على نحو ١٣ كيلوجرام من السكر زيادة عن القصب الآخر .

وبناء على ذلك كان مقدار سكر القطع المسمدة بقرارتين من النتروسلفات ٦٧ كيلو عن الفدان زيادة عما أنتجته القطع المسمدة بثلاث غرارات ونصف التى كان وزن عيدانها أكبر بقليل .

وكان ينتظر أن تكون النتائج من قصب السنة الثانية أعظم أهمية لأن أغلب الأزوت الذى نجم عن زرع الخضروات يكون قد استهلكته عيدان السنة الأولى وهو ما -صل فولا ، وكانت الأعمال الزراعية مشابهة لتلك التى أجريت في تجارب المسافات ( ٣٣ ) وقد قطعت عيدان السنة الثانية بعد محصول السنة الأولى بسنة تماما ووضع متوسط النتائج كما هو مفصل بالقسم الأول من الجدول رقم ٢

## جدول رقم ٢

مقدار الأزوت في تجربة المطاعة

جدول

مقدار الآزوت

متوسط النتائج

معدات السنة الثانية			
غرات آرسنات لمقدان	القطع (١ - ندان انجليزي)	نصب القدان بالطن المئري	
١١ <sup>١</sup> / <sub>٢</sub> (٣٩ كيلو آزوت) ... ..	١ - ٣ - ١١ - ١٨ - ٢٠	٢٩,٦٧٥	
٢ (٥٢ >) ... ..	٢ - ٥ - ٩ - ١٤ - ٢٢	٤٦,٤٧٠	
٢ <sup>١</sup> / <sub>٢</sub> (٦٥ >) ... ..	٣ - ٤ - ٧ - ١٥ - ٢٣	٤٧,١٧٥	
٣ (٧٨ >) ... ..	٤ - ٦ - ١٠ - ١٣ - ٢٤	٤٨,٢٥٥	
٣ <sup>١</sup> / <sub>٢</sub> (٩١ >) ... ..	٥ - ٨ - ١٦ - ١٩	٤٦,٧١٠	
٤ (١٠٤ >) ... ..	٦ - ١ - ١٢ - ١٧ - ٢١	٤٦,٦٦٥	
متوسط ثلاثة تسميدات أصغر ... ..			
متوسط ثلاثة تسميدات أكبر ... ..			
المتوسطات السنوية			
١١ <sup>١</sup> / <sub>٢</sub> (٣٩ كيلو آزوت) ... ..	١	—	٤١,٤٩٨
٢ (٥٢ >) ... ..	٢	—	٤٥,٧٤٣
٢ <sup>١</sup> / <sub>٢</sub> (٦٥ >) ... ..	٣	—	٤٥,١٢٨
٣ (٧٨ >) ... ..	٤	—	٤٦,٤٧٠
٣ <sup>١</sup> / <sub>٢</sub> (٩١ >) ... ..	٥	—	٤٦,٢٩٨
٤ (١٠٤ >) ... ..	٦	—	٤٥,٨٢٥
متوسط ثلاث تسميدات أصغر ... ..			
متوسط ثلاث تسميدات أكبر ... ..			

رقم ٢

في تجربة المطاعنة

المقطوعة ١١ - ٢٣ إلى ٢٤ - ٣٥

القدان بالطن وزن سكر	معامل أو دليل الجلار كوز	الفاوة	مقدار السكر	الفتاير
٤٦٠٢	٢,٣	٨٧,٣	١٤,٥٢	٨٨٣
٥٠٦٥	٣,٠	٨٥,٦	١٣,٦٤	١٠٣٤
٥٢٣٦	٢,٤	٨٧,١	١٣,٨٣	١٠٥٠
٥٤٠٥	٢,١	٨٦,٦	١٣,٩٩	١٠٧٤
٥١٨٥	٢,٤	٨٦,٥	١٣,٨٣	١٠٤٠
٥٠٨٦	٢,٦	٨٦,٢	١٣,٦٨	١٠٣٩
—	—	٨٦,٧	١٤,٠٠	—
—	—	٨٦,٤	١٣,٨٣	—
سوية للسنتين				
٤٤٥٨	٣,٢	٨٥,١	١٣,٨٦	٩٢٤
٤٩١٩	٣,٧	٨٤,١	١٣,٥٢	١٠١٨
٤٨٥٩	٣,٧	٨٤,٧	١٣,٥٤	١٠٠٤
٤٩٧٢	٣,٣	٨٤,٠	١٣,٥١	١٠٣٥
٤٩٤٦	٣,٥	٨٤,٤	١٣,٤٣	١٠٣١
٤٨٤٨	٣,٥	٨٤,٢	١٣,٣٨	١٠٢٠
		٨٤,٦	١٣,٦٣	—
		٨٤,٢	١٣,٤٤	—

ونجد في حالة القصب العقر تأثيرا للزيادة الأولى أى نصف غرارة من التروسلفات لأن القطع التى سمدت بغرارتين أنتجت تقريرا سبعة أطنان أى ( ١٥١ قنطارا ) زيادة في وزن العبدان وما يقرب من نصف طن زيادة في كمية السكر عن المسمدة بغرارة ونصف . ومع ذلك فإن ما زاد عن غرارتين لم ينتج نتائج يعتمد بها في وزن العبدان كالتى تحصل عليها في حالة عيدان السنة الأولى وكذلك في حالة الثلاث التسميدات الخفيفة كان متوسط وفرة السكر خمس درجة تقريرا زيادة عنها في تسميد القصب بالتسميدات الغزيرة . وكانت جميع الفلات والتحليلات أكبر في هذه الحالة عنها في حالة المحصول العروسي إلا فيما يختص بالقطع المسمدة بغرارة ونصف من التروسلفات فقد وجد أنها تحتاج الى وضع زيادة من الأزوت لمحصول السنة الثانية مقابل ما كان مذكرا في التربة من زراعة الحضرورات في السنة الأولى . ويظهر جليا أن المزارع الذى يضع أكثر من غرارتين من التروسلفات للفدان في مثل ظروف هذه التجربة التى أجريتها إنما يرمى جنبها مصريا في كل مرة يضيف فيها غرارة زيادة .

### تجارب ملوى

قد أجريت أيضا تجارب ملوى بمحقل حكومى في أرض صفراء خفيفة نوعا ما وطبيعتها مشابهة تماما لطبيعة الأرض التى عملت فيها التجارب بالمطاعة إلا أن مما يؤسف عليه أن القصب لم يمكن زرع لغاية مايو سنة ١٩٣٣ وهو ميعاد يعتبر متأخرا لاجراء أحسن اختبارات على الأزوت ولذلك خصصنا التجارب التى أجريتها لمحصول قصب السنة الثانية فقط واستعملنا فيها تترات الجير المحتوى على ١٥ في المائة من الأزوت وهو السماد الشائع استعماله بالمحلى واتبعنا نفس التفاصيل الخاصة تجهيز الأرض وخدمتها وربها التى اتبعت في تجارب المسافات ( ٣٣ ) ملوى واستخدمنا النسب الأربعة من تترات الجير وهى غرارتان وثلاث غرارات وأربع وخمس أى ٣١ و ٤٧ و ٦٢ و ٧٨ كيلو جراما من الأزوت للفدان ووضعناها على ثلاث دفعات الأولى منها في ٢٣ مايو سنة ١٩٣٤ أى ( بعد الدفعة المقابلة لها في تجارب المطعمة أسبوعين ) والثانية بعد ذلك بشهر والثالثة في ١٢ يولييه وقد قطع قصب السنة الثانية في ٨ و ٩ مارس سنة ١٩٣٤ أى بعد رى الأعقاب الرية الأولى بعشرة شهور تماما وتحصدا على النتائج المفصلة بتجدول رقم ٣ والرسومات البيانية رقم ١ و ٢ و ٣

### جدول رقم ٣

مقدار الأزوت المستعمل في تجربة ملوى

في تجربة ملوى

مقدار الآزوت المستعمل

( سماد - مقدار - ١٠ )

المطوية ٣ - ٨ الى ٩ - ٣٥				الناتجة	معدلات السنة			
وزن السماد الكلى	دليل الكاركونز أى النسبة المئوية للسكرز الماحول	النضارة	مقدار السكرز	الغلات بالطناطير	وزن قص بالطن المترى	وزن الميدان بالكلو فى كل قطعة	القطع	غراوات تيرات الجير للقدان
٢٠٥١	٥٠٠	٨٣٠٢	١٢٠٥٨	٩٢٠	٤١٣٤٠	٧٥٠٠	٤ - ١	٢ ( ٣١ كلو تيرات ) ... ..
	٥٠٠	٨٣٠٧	١٣٠١١			٨٥٧٠	٦ - ١	٢ ( ٣١ > ) ... ..
	٧٥٠	٨١٠١	١١٠٩٢			٦٨٢٠	٩ - ١	٢ ( ٣١ > ) ... ..
	٤١٧	٨٢٠٤	١١٠٨٠			٦٦٧٠	١٥ - ١	٢ ( ٣١ > ) ... ..
	٥٠٦	٨٢٠٦	١٢٠٣٥			٦٨٩٠	المتوسط	٢ ( ٣١ > ) ... ..
٢٣٢٧	٩٠٨	٧٨٠٢	١٠٠١٧	٩٥٠	٤٢٠٦٦٠	٧٩٧٠	٣ - ١	٣ ( ٤٧ > ) ... ..
	٨٠٥	٧٧٠٩	١٠٠٠٣			٦٧٩٠	٥ - ١	٣ ( ٤٧ > ) ... ..
	٩٠٠	٧٨٠٧	١٠٠٢٨			٦٣١٠	١٢ - ١	٣ ( ٤٧ > ) ... ..
	٧٥٠	٨٢٠٦	١٠٠٨٩			٧٣٧٠	١٤ - ١	٣ ( ٤٧ > ) ... ..
	٨٠٧	٧٩٠٤	١٠٠٣٤			٧١١٠	المتوسط	٣ ( ٤٧ > ) ... ..
٢٣٠٧	٩٠٠	٧٩٠٠	١٠٠١٣	٩٥٦	٤٢٠٩٤٥	٧٣٨٠	٢ - ٢	٤ ( ٦٢ > ) ... ..
	٨٠٤	٧٩٠٧	١٠٠٥٧			٦٥٤٠	٨ - ٢	٤ ( ٦٢ > ) ... ..
	٨٠٣	٧٨٠٨	١٠٠٢٨			٧٣٣٠	١١ - ٢	٤ ( ٦٢ > ) ... ..
	٨٠٦	٧٨٠٢	٩٠٨٨			٧٣٨٠	١٣ - ٢	٤ ( ٦٢ > ) ... ..
	٨٠٦	٧٨٠٩	١٠٠٢٢			٧١٥٨	المتوسط	٤ ( ٦٢ > ) ... ..
٢٢٦٣	٧٠٦	٧٨٠٨	١٠٠١٦	٩٩٥	٤٤٠٧٠٠	٧٧٣٠	١ - ٥	٥ ( ٧٨ > ) ... ..
	١٠٠٨	٧٤٠٢	٨٠٨٨			٧٢٠٠	٧ - ٥	٥ ( ٧٨ > ) ... ..
	٨٠٥	٧٩٠٤	١٠٠١٦			٧٦٧٠	١٠ - ٥	٥ ( ٧٨ > ) ... ..
	٧٠٤	٧٩٠١	١٠٠١٣			٧٢٠٠	١٠ - ٥	٥ ( ٧٨ > ) ... ..
	٨٠٦	٧٧٠٩	٩٠٨٣			٧٤٥٠	المتوسط	٥ ( ٧٨ > ) ... ..

هذا وأن الزيادات الطفيفة في وزن العبدان الناتجة من كل علاوة ١٥ كيلو من الأزوت لمي صغيرة جدا فلا أهمية لها من الوجهة الاحصائية حتى وفرض أنها وضعت موضع الاهتمام فإن قيمة العبدان الزائدة التي صار الحصول عليها بصرف النطر عن الانحطاط الجوهري في قيمة السكر لانطى مصاريف الأسمدة الإضافية كما يرى جليا في الرسم البياني رقم ٢

ولو أن الأساس في مقدار نترات الجير المستعمل كان أقل من المستعمل في اختبارات المطاعنة بنحو ثمانية كيلو جرامات من الأزوت عن الفدان فإن ذلك المقدار كان عاليا جدا للدلالة على درجة أحسن مقدار من الوجهة الاقتصادية ، إلا أنه كان من حسن الحظ وجود تجربة على نترات الصودا في ظروف مماثلة لظروف حقن التجارب بملوى التي تبين لنا القطع الغير المسمدة فيها وهي قطع المقابلة ( الضوابط ) أساسا ممتدا لتقدير الأرباح المالية التي نحصل عليها من استعمال نترات الجير . والمكررات التسع الغير المسمدة المستعملة ضوابط كان متوسط غلتها من القصب في السنتين الأولى والثانية ( ١٩٣٤ - ١٩٣٥ ) كما هو مبين عنها في الجدول رقم ٤ والرسم البياني رقم ٤ ، ٦٨٤ قنطارا من العبدان عن الفدان ويرى من دراسة هذه التجارب فيا على أن هناك فائدة من الوجهة الاقتصادية من استعمال النترات حتى غرارين لا أكثر .

#### الجدول رقم ٤

تجارب التسميد بنترات الصودا بملوى

متوسط نتائج قصب السنة الأولى ( ١٩٣٣ - ١٩٣٤ ) والسنة الثانية ( ١٩٣٥ - ١٩٣٦ )

الغزازات عن الفدان	وزن قصب الفدان بالقنطار (*)	زيادة المحصول الناتجة من التسميد الإضافي	الغزازات عن الفدان	
			بدون سماد	الضوابط
—	٦٨٤	—	—	—
١'٢	٨٨٦	٢٠٢	( ٢٣ كيلو نترات )	
٢	١٠٢٤	١٣٨	( " " ٣١ )	
٢'٢	١٠٢٩	٥	( " " ٣٩ )	
٣	١٠٥١	٢٢	( " " ٤٧ )	

(\*) متوسطات تسعة مكررات من قطع مساحة كل منها  $\frac{1}{27}$  من الفدان وقد أجريت هذه التجارب بمعرفة جناب استربريس وكل نترات شيل وحضرة محمد افندي محمود القائم بأعمال حقن تجارب الوزارة بملوى .

وعلى ذلك يمكننا أن نفرض دون إخطاء أن استعمال غرارين من نترات الجير ينتج زيادة في وزن العبدان تبلغ على الأقل ٢٣٦ قنطارا أى إحدى عشر طنا بالفدان فإذا قارنا هذا بزيادة الستة وثلاثين قنطارا في وزن العبدان نتيجة إضافة غرارين آخرين من هذا النترات ، انضح خطأ استعمال الأزوت بغزارة في مثل الظروف التي عملت فيها هذه التجارب ، انضاحا ساطعا جدا .

على أن تأثير استعمال الآزوت بكثرة على جودة القصب ومقدار السكر الناتج المهبط المتزايد المتجلى في الأرقام الموضحة بالجدول رقم ٣ والرسم رقم ١ و٣ يعمل هذه الأرقام عظيمة الأهمية . هذا وبناء على ما دللنا عليه تحاليل الضوابط في تجارب نترات الصودا وكذا القطع التي سممت بغزارة ونصف من نترات شيل من أن وفرة السكر في العبدان بلغت ١٢,٥٢٪ فإنه يمكننا أن نفرض من رقم ١٢,٣٥٪ المثل لمقدار السكر في تحليل القطع المسمدة بنترات الجير بأقل المقادير أن استعمال هذا السماد بمقادير لغاية نحو ٣٠ كيلو من الآزوت للفدان ، لا يؤثر تأثيرا سيئا على النقاوة أو مقدار السكر في العبدان . أما ما زاد عن هذا الحد فإن قيمته من حيث انتاج السكر في حالة قصب ملوى ، ولو أن قلة هذا الانتاج منسوبة جزئيا إلى تأخير مياد التسميد ، تقل لدرجة خطيرة بنسبة زيادة مقادير الآزوت حتى وصلنا إلى شذوذ عجيب ، ذلك بأن كل زيادة في الآزوت ينتج عنها زيادات بسيطة في وزن العبدان ولكن ينتج عنها أيضا نقص مقادير السكر المتحصل من القصب في المعمل. وما يدعو إلى القلق استمرار هبوط مقدار السكر والنفقاوة ومقدار السكر المتحصل من الفدان كلما ارتفعت من أقل مقدار في وضع السماد وهو المقدار الذي يحتمل أن يكون هو خير مقدار اقتصادي أى من غرارين من الجير ، حتى أكبر مقدار أى خمس غرارات ( ٧٨ كيلو من الآزوت ) بينا أكبر نسبة للسكر المختزل في النسب العليا تدل على أن العبدان بدلا من أن تستعمل الآزوت المتوافرة في النضج كانت تستخدمه في النمو الخضري . وقد أوضحنا فيما سبق ( ٣٣ ) إن الإنراط في وضع الأسمدة ، وكذا التأخير في استعمالها ، له تأثير في نضج القصب يشابه التأثير الناتج من الزراعة المتأخرة جدا في موسم (١) النمو القصير المدة في القطر المصري .

(١) ذكر المستر دودز ( ١٢ ) Dodds أخيرا أن في البلاد التي يزرع فيها القصب ذات المناخ الاستوائي جدا

حيث موسم النمو قصير ، قد يؤدي استعمال الأسمدة الأزوتية بغزارة إلى محصول قليل الاحتواء على السكر ، بسبب أنه يطيل مدة النمو ويؤخر النضج .



## اختبارات كوم امبو

بناء على اقتراح حضرة رضى قطاوى بك مدير عام شركة كوم امبو قد عملت تجارب على مقدار الآزوت في ثلاثة أنواع ممتازة من الأراضي في مزارع كوم امبو في أوائل سنة ١٩٣٤ وقد اختار الوكيل حضرة س. مزارعى ، الحقول التى تمثل أجناس الأرضى في نظارات كثيرة . ففى كوم امبو قبلى كانت الأرض طينية خفيفة خصبة جدا ومتجانسة التركيب . وفى عطمور قبل كانت الأرض مشابهة للسابقة ولكنها أقل خصبا . وقد أجريت التجارب بالإسماعيلية في أرض بين خفيفة طينية صفراء جيدة الخصب متجانسة التركيب ولكنها متخلطة تسمح بمرور المياه لدرجة كبيرة وعلى ذلك تحتاج الى ربات متكررة غزيرة وأقيمت الخطوط على البعد القياسى أى باعتبار تسعة خطوط في كل قصبين .

واستعمل القصب ١٠٥ P.O.I. في جميع التجارب . ثم أن طرق تجهيز الأرض وخدمتها وربها وقطع محصولها قد اتبع فيها ما هو متبع عمليا في كوم امبو في قصب السنة الأولى كما هو مبين بالتفصيل في تجارب المسافات ( ٣٣ ) وكذلك كان الحال فيما يخص بالدورة الزراعية فكانت الفلال والحضر تزرع دائما في الفترة التى بين مدق زراعة قصب . وفى كوم امبو قبل وعطمور قبل كان القول هو المحصول الذى سبق مدة الفرس . وفى الإسماعيلية زرع القمح بين الحضر والقصب .

هذا وفى عطمور قبل قد عملت التجربة وغرس القصب بالطريقة الجافة في ٢ فبراير سنة ١٩٣٤ وفى كوم امبو قبل في ٢٥ من الشهر نفسه وفى الإسماعيلية في نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس ، وكان كل ذلك في وقت مناسب ، وفى كل حالة رويت التجارب ( بوجا ) في اليوم التالى للفرس وقد بينت تواريخ الحصد في الجداول رقم ٥ ، ٦ ، ٧ التى فيها أثبتت النتائج التفصيلية لكل تجربة .

## جدول رقم ٥

مقدار الآزوت المستعمل في تجارب كوم امبو قبل

رقم ٥

في تجارب كوم أمبو قبل

الأرل			
مقطوعة في ١٩٣٥ ١٩٣٥ أبريل سنة			
مقدار الجلوكونز	النسبة المئوية للسكر في المحلول	السكر الذي في القصب	وزن القصب بالطن عن القدان
٣٣	٨٥٤	١٤٣٠	٥٤٠٠
٤٤	٨٥١	١٤٥٤	
٥٤	٨١٦	١٢٧٠	
٤٥	٨٣٢	١٣٣٠	
٤٤	٨٣٨	١٣٧١	
٣٩	٨٤٥	١٣٧٣	٥٨٩٤
٣٦	٨٥٢	١٤٥٣	
٥٣	٨١٦	١٣١٧	
٦١	٨٠٨	١٢٦٢	
٤٧	٨٣٠	١٣٥١	
٣٩	٨٣٦	١٣٤٠	٥٧٩٤
٥١	٨٢٦	١٣٠٩	
٥٥	٨٢١	١٢٩٢	
٥٠	٨٢٥	١٣٠٥	
٤٩	٨٢٧	١٣١٢	
٤٦	٨٣١	١٣٢٤	٥٨٩٥
٤٨	٨٢٦	١٣١٠	
٤٦	٨٢٨	١٣٢٣	
٤٩	٨٢١	١٣٤٥	
٤٧	٨٢٩	١٣٢٦	
٣٢	٨٦٣	١٤٨٦	٥٧٩١
٥١	٨٢٢	١٣٢١	
٦٧	٨٠٣	١٢٣٨	
٥٠	٨٣٧	١٣٢٥	
٥٠	٨٣١	١٣٤٣	
٤٧	٨٢٥	١٢٩١	٥٩٦٣
٧١	٨٠٠	١٢١٣	
٤٠	٨٦٩	١٥٠٤	
٤٤	٨٣٢	١٣٨٣	
٥٣	٨٣٢	١٣٤٨	
—	٨٣٢	١٣٤٥	
—	٨٣١	١٣٣٩	

الجلود

مقدار الآزوت المستعمل

نصب الد

وزن القصب بالقطار		القطع (٤ فراريط)	غرامات من النيتروجينات عن القدان
عن القدان	عن القطعة		
١٣١٠٩٥	١٩٢٧٦	٢ — أ	١ (٢٩ كيلو آزوت) ...
	٢٠١١٦	١٢	...
	٢٠٥٩٦	١٧	...
	٢٠٧٤٢	٢١	...
	٢٠١٨٣	المتوسطات	١ (٢٩ كيلو آزوت) ...
١٣١١٩٧	٢١٧٩١	ب — ٤	٥ (٣٩ كيلو آزوت) ...
	٢٢٢٤٤	٨	...
	٢١٩٩٥	١٥	...
	٢١٤٣٥	٢٣	...
	٢١٨٦٦	المتوسطات	٥ (٣٩ كيلو آزوت) ...
١٣٨٩٦٧	٢٢٢٤٤	ج — ٥	٢ (٥٢ كيلو آزوت) ...
	٢٠٨٤٠	٩	...
	٢٢٥٧٠	١٣	...
	٢٠٣٢٤	٢٢	...
	٢١٤٩٥	المتوسطات	٢ (٥٢ كيلو آزوت) ...
١٣١٢١٤	٢٠٣٠٧	د — ٦	٥ (٦٥ كيلو آزوت) ...
	٢٢٩٢٩	٧	...
	٢٢٢٦٢	١٦	...
	٢١٩٧٨	٢٠	...
	٢١٨٦٩	المتوسطات	٥ (٦٥ كيلو آزوت) ...
١٣٨٩١١	١٩٢٣٥	هـ — ١	٣ (٧٨ كيلو آزوت) ...
	٢٥١٢٤	١٠	...
	٢٢٢٤٩	١٤	...
	١٩٣٣٣	٢٤	...
	٢١٤٨٥	المتوسطات	٣ (٧٨ كيلو آزوت) ...
١٣٢٧٤١	٢١٦٨٥	و — ٣	٥ (٩١ كيلو آزوت) ...
	٢٤١٢٠	١١	...
	١٩٣٩٦	١٨	...
	٢٣٢٩٣	١٩	...
	٢١٢٢٤	المتوسطات	٥ (٩١ كيلو آزوت) ...
متوسطات ثلاث تسميد أصفر			...
» » أكبر			...

في تجارب عظمور قبلى

مقدار الآزوت

منقولة في ٢٥ و ٢٦ مارس سنة ١٩٣٥

نسبة الجلو كوزر لنسبة النوية للكروز المحول	الغارة	الوفرة سكرول في القصب	وزن البندان بالطن عن الفدان
٢٠٦	٨٧٠١	١٤٧٨	٣٧٧٠
١٠٩	٨٨٠٨	١٥٩٠	
٢٠٠	٨٨٠٦	١٦٧٣	
٢٠٣	٨٨٠٥	١٦٢٤	
٢٠٤	٨٨٠٣	١٥٩١	
١٠٩	٨٨٠٩	١٦١٦	
١٠٨	٨٨٠٩	١٥٩٣	
٢٠٦	٨٧٠٣	١٥٤٥	
٢٠٣	٨٨٠٢	١٦١٢	
٢٠٠	٨٨٠٣	١٥٨٢	
١٠٨	٨٨٠٦	١٥٩٦	٤٣٧٢
١٠٨	٨٨٠٧	١٥٩٩	
٢٠٠	٨٩٠٠	١٦٢٣	
٢٠٣	٨٨٠٥	١٥٩٥	
٢٠٠	٨٨٠٧	١٦٠٣	
١٠٩	٨٧٠٩	١٥٤٣	
١٠٧	٨٧٠٨	١٥٨٩	
٢٠٢	٨٨٠١	١٦٣٨	
٢٠٣	٨٨٠٤	١٦٠١	
٢٠٠	٨٨٠١	١٥٩٣	
١٠٨	٨٨٠٣	١٥٤٦	٤٤٦٢
١٠٦	٨٨٠٧	١٥٨٧	
٢٠٤	٨٨٠٦	١٦١٣	
٢٠٢	٨٧٠٦	١٥٥٧	
٢٠٠	٨٨٠٣	١٥٧٦	
١٠٨	٨٨٠٥	١٦٠١	
١٠٨	٨٧٠٤	١٥٣٣	
٢٠٢	٨٧٠٨	١٥٩٥	
٢٠٥	٨٦٠٩	١٥٣٠	
٢٠١	٨٧٠٧	١٥٦٥	
	٨٨٠٤	١٥٩٥	٤٤٢٦
	٨٨٠٠	١٥٧٨	

عبدان قصب السنة الأولى

وزن القصب بالقطار		القطع ( أربعة قرار بط )	غزارات ترسلفات عن الفدان
عن القطعة	عن الفدان		
٨٣٩,٢٩	١٥٤,٦٧	٢ - أ	١ ( ٢٦ كيلو آزوت ) ...
	١٦٩,٣١	١٢	
	١١٦,١٣	١٧	
	١١٩,٤٢	٢١	
	١٣٩,٨٨	المتوسطات	١ ( ٢٦ > ) ...
	١٧٨,٣٦	ب - ٤	١ ( ٣٩ > ) ...
	١٦٠,٢٢	٨	
	١٧٥,٢٠	١٥	
	١٣٥,٠٧	٢٣	
	١٦٢,٢١	المتوسطات	١ ( ٣٩ > ) ...
٩٧٣,٢٧	١٩٠,٥٨	ج - ٥	٢ ( ٥٢ > ) ...
	١٨١,٥٥	٩	
	١٧٥,٣٣	١٣	
	١٦١,٧٣	٢٢	
	١٧٧,٣٠	المتوسطات	٢ ( ٥٢ > ) ...
	١٩٠,٦٢	د - ٦	٢ ( ٦٥ > ) ...
	١٨٥,٤٢	٧	
	١٠٦,١٨	١٦	
	١٨٠,٠٠	٢٠	
	١٦٥,٥٦	المتوسطات	٢ ( ٦٥ > ) ...
١٠٣٩,٠٦	١٨٣,٤٢	هـ - ١	٣ ( ٧٨ > ) ...
	١٦٧,٠٢	١٠	
	١٧٨,٢٢	١٤	
	١٦٤,٠٥	٢٤	
	١٧٣,١٨	المتوسطات	٣ ( ٧٨ > ) ...
	١٤٦,٤٩	و - ٣	٣ ( ٩١ > ) ...
	١٧٨,٨٩	١١	
	١٦٩,٧٣	١٨	
	١٦١,٦٩	١٩	
	١٦٤,٢٠	المتوسطات	٣ ( ٩١ > ) ...
٩٨٥,٢٠			
متوسطات ثلاث أسميدات أصفر			
> > أكبر			

الجدول

مقدار الازوت

نصب الس

غراوات الترسقات عن القدان	القطع (ع قراريط)	وزن الميدان بالقطار	
		من القطعة	عن القدان
١ (٢٦ كبر آزوت) ... ..	٢ - ١	١٤٨٠١٨	٨٩٣٤٧
١٢	١٢	١٧٢٠٠٠	
١٧	١٧	١٦٠٠٧٦	
٢١	٢١	١١٤٠٧١	
١ (٢٦ >) ... ..	المتوسطات	١٤٨٠٩١	
٥ (٢٩ >) ... ..	٣ - ٤	٣٣١٠٢	٩٠٣٤٦
٨	٨	١٤٤٠٤٥	
١٥	١٥	١٦٢٠٨٠	
٢٣	٢٣	١٦٤٠٤	
٥ (٢٩ >) ... ..	المتوسطات	١٥٠٠٥٨	
٢ (٢٩ >) ... ..	٥ - ٦	١١٤٠١٨	٩٢٦٥٢
٢ (٢٩ >) ... ..	٦ - ٧	١٨٦٠٤٤	
١٣	١٣	١٣٧٠٢٥	
٢٢	٢٢	١٧٩٠٨٢	
٢ (٥٢ >) ... ..	المتوسطات	١٥٤٠٤٢	
٢ (٦٥ >) ... ..	٤ - ٥	١٢٨٠٢٦	٩٧٢٦٦
٧	٧	١٥٤٠٧٥	
١٦	١٦	١٨٤٠٥٨	
٢٠	٢٠	١٨٠٠٨٥	
٢ (٦٥ >) ... ..	المتوسطات	١٦٢٠١١	
٣ (٧٨ >) ... ..	١ - ٢	١٢٠٠٥	٩٨٨٣٣
١٠	١٠	١٩٠٠٥٨	
١٤	١٤	١٥٨٠٨٠	
٢٤	٢٤	١٨٩٠٤٦	
٢ (٧٨ >) ... ..	المتوسطات	١٦٤٠٧٢	
٢ (٩١ >) ... ..	٢ - ٣	١٦٤٠٧٥	١٠٧٧٥٢
١١	١١	١٩٠٠٨٠	
١٨	١٨	١٨٢٠٠٠	
١٩	١٩	١٨٠٠٨٠	
٣ (٩١ >) ... ..	المتوسطات	١٧٩٠٥٩	

متوسطات ثلاث تسميديات أصغر

» » » أكبر

رقم ٧

في تجارب الاسماعيلية

مطلوبة في ٢٤ و ٢٣ مارس سنة ١٩٣٥

وزن الميدان بالطن عن القدان	الوفرة (السكرور الذي في القصب)	النسبة	نسبة الحلو كوز (النسبة المئوية للسكرور المحول)
٤٠١٤	١٥٠٨٥	٨٧٠٠	٢٠٨
	١٥٠٣٧	٨٦٠٦	٢٠٧
	١٥٠٨١	٨٨٠١	٢٠٩
	١٥٠٨١	٨٨٠٥	٢٠٦
	١٥٠٧١	٨٧٠٦	٢٠٠
٤٠٣٥٩	١٥٠٩٨	٨٨٠٤	٢٠٤
	١٥٠٤٣	٨٧٠٢	٢٠٨
	١٤٠٢٠	٨٤٠٥	٢٠٣
	١٥٠٤١	٨٧٠٨	٢٠١
	١٥٠٢٦	٨٩٠٥	٢٠٣
٤١٠٦٢	١٦٠٢٧	٨٨٠٨	٢٠٣
	١٥٠٦٨	٨٧٠٦	٢٠٠
	١٥٠٣٨	٨٨٠٧	٢٠٣
	١٤٠٨١	٨٥٠١	٢٠٤
	١٥٠٥٤	٨٧٠٦	٢٠٠
٤٣٠٧٠	١٥٠٥٧	٨٧٠٣	٢٠٩
	١٦٠٢٤	٨٨٠٧	٢٠٧
	١٥٠١٧	٨٦٠٣	٢٠٥
	١٥٠٠٤	٨٥٠٣	٢٠٤
	١٥٠٥١	٨٦٠٩	٢٠٤
٤٤٠٥٠	١٦٠٥٨	٨٩٠١	٢٠٣
	١٤٠٠٩	٨٥٠٠	٢٠٧
	١٥٠٦٥	٨٧٠١	٢٠١
	١٥٠١٤	٨٧٠٣	٢٠١
	١٥٠٣٧	٨٧٠١	٢٠٨
٤٨٠٤١	١٥٠٤٥	٨٧٠٦	٢٠٦
	١٤٠٩٩	٨٧٠١	٢٠٣
	١٥٠٤٠	٨٧٠٥	٢٠٦
	١٤٠٦٤	٨٦٠١	٢٠١
	١٥٠١٢	٨٧٠١	٢٠٩
	١٥٠٥٠	٨٨٠٢	
	١٥٠٣٣	٨٧٠٠	

وبتين من النتائج الموضحة بالجدول رقم ٥ أن غرارة واحدة من التروسلفات أنتجت محصولا جيدا للغاية وزنه ١٣١١ قنطارا من القصب بالفدان في كوم امبو قبلي وأن نصف غرارة اضافيا أعطى زيادة تذكر من الوجهة الاقتصادية تزيد عن مائة قنطار . وأن ما زاد عن غرارة ونصف (٣٩ كيلو من الأزوت) لم يأت بفائدة في المحصول . وفي عظمور قبلي (الجدول رقم ٦) انتج استعمال غرارة ونصف ١٣٤ قنطارا من القصب بالفدان زيادة عما أنتجته غرارة واحدة بينما أن نصف غرارة أخرى من التروسلفات أعطى زيادة في المحصول تبلغ ٩٠ قنطارا زيادة عما أنتجه استعمال غرارة ونصف . ثم أن استعمال غرارتين أنتج أكبر مقدار من القصب بالفدان وكل ما أضيف أكثر من غرارتين نتج عنه محصول أقل مما ذكر بقليل .

وفي الأسماعيلية يتبين من الجدول رقم ٧ أن غرارة واحدة من التروسلفات أنتجت من الوجهة التجارية خير عائدة فكل نصف غرارة إضافي إلى ثلاث غرارات أعطى زيادة ثابتة في محصول القصب ولكن هذه الزيادة لم تبلغ نصف طن بالفدان وذلك لا يفى بمجن السباد الاضافى هذا وأن الزيادة البالغة ٨٩ قنطارا من العيدان التي نتجت من اضافة نصف الغرارة إلى الغرارات الثلاث تكون هامة لو أنها كانت في النسب السفلى أى في مقادير السباد الصغيرة ولكن لما كانت مقادير الأسمدة الإضافية لفأية ثلاث غرارات لا تاتى بفائدة تجارية فمن المجازفة جدا إضافة ثلاث غرارات ونصف انتظارا لزيادة مرضية في المحصول عند ذلك المستوى العالى .

أما من جهة تأثير المقادير الكبرى من الأزوت على جودة القصب فلإننا نرى أنه كما حصل تماما في تجارب المطاعنة التي زرع القصب فيها وسند في أحسن الأوقات لم يظهر تأثير يعتد به في أية تجربة من تجارب كوم امبو ولو أنه من المهم ملاحظة أن في كل منها كانت أجزاء العيدان الناتجة من القطع الثلاث المسمدة تسميدا ثقيلًا كان متوسط السكروز والنقاوة فيها أقل بقليل منه في القطع الثلاث المسمدة تسميدا خفيفا وربما يمكن الحصول على أحسن صورة لنتائج كوم امبو من درس متوسط النتائج في الثلاث التجارب الملتخصة في الجدول رقم ٨

## جدول رقم ٨

### مقدار الأزوت في تجارب كوم امبو نتائج الثلاثة الاختبارات معا

غراتات تروسلفات فقدان	وزن القصب بالقنطار من الفدان	وزن القصب بالطن المترى عن الفدان	الوفرة (سكروز القصب)	النقاوة	نسبة السكروز المحصول (السكروز المحلول)
١ (٢٦ كيلو متر) ...	٩٨١٠٢٤	٤٣٠٩٥	١٥١١	٨٦٠٦	٣٠٤
١ (٣٩ >) ...	١٠٦٢٠٩٠	٤٧٠٧٥	١٤٩٠	٨٦٠٩	٣٠٣
٢ (٥٢ >) ...	١٠٩٣٠٣٣	٤٩٠١٢	١٤٩٣	٨٦٠٣	٣٠٣
٣ (٦٥ >) ...	١٠٩٢٠٧١	٤٩٠٠٩	١٤٩٠	٨٦٠٠	٣٠٤
٣ (٧٨ >) ...	١١٠٥٠٥٠	٤٩٠٧٠	١٤٨٥	٨٦٠٢	٣٠٣
٣ (٩١ >) ...	١١٣٠٠٠٤	٥٠٠٧٧	١٤٧٥	٨٦٠٠	٣٠٤
متوسط ثلاث تسميدات أخف	...	...	١٤٩٨	٨٦٠٦	...
متوسط ثلاث تسميدات أثقل	...	...	١٤٨٣	٨٦٠١	...

ويتضح من هذا الجدول أن إضافة نصف غرارة من التروسلفات إلى المفسدات الأسماسى وهو غرارة واحدة أنتجت زيادة أربعة أطنان من القصب بالفدان بينما أنه طبقا لقانون تناقص الايراد قد أنتجت زيادة غرارة أخرى من التروسلفات أقل من نصف الزيادة الاضافية التي أنتجتها الإضافة في المرة الأولى . ويتضح كذلك أن خير الانتاج المطلق يتفق مع أحسن التسميد تجاريا كما هو الحال في تجاربنا الأخرى إذ أنه من الوجهة الاقتصادية لا توجد زيادة يعتد بها في محصول القصب من تسميد الفدان بأكثر من ٥٢ كيلومن الأزوت بالفدان الانجليزي . ولذا فان نتائج الاختبارات المنومة التي أجريت في كوم امبو تعتبر مقوية للبيانات السابق الحصول عليها في اختبارات المطاعنة وملوى بمعنى أن الزارع الذي يستعمل أكثر من ٥٢ كيلو من الأزوت للفدان في تسميد حقوله المزروعة قسبا يفقد هبسا من الكمية الاضافية . هذا وان تجانس نتائج هذه التجارب المبعثرة في مختلف الأنحاء المتباعدة في طرز من التربة مختلفة وفي أحوال جوية مختلفة قد يكون فيه بيان للطريقة المثلى لدى الزارع في التسميد من الوجهة الاقتصادية المادية المحضة . وقد جرت العادة في الوجه القبلي

باستعمال أربع غرارات من التروسلفات أو خمس أو ما يعادلها من الأزوت في مواد أخرى (ماية كيلو للفدان) فإذا أضيفت غراران للفدان زيادة عن اللازم في تسميد ٢٠,٠٠٠ فدان كما هو المحتمل جدا تراهي لنا أن في هذا الوجه من أوجه زراعة القصب في مصر ما يحتمل أن يتحصده فيه ٣٠,٠٠٠ جنيه أو ٤٠,٠٠٠ جنيه في السنة ويتحقق المثل القائل بأنك "إذا أقصدت جنبها فقد ربحته".

### بعض نتائج في لوزيانا مماثلة لما سبق

إن في طرز التربات المهمة المخصصة لزراعة القصب في مواسم النمو القصيرة بسبب الجو وحتى في الطرز المزروعة بها على وجه الخصوص نماذج قصب P.O.J. يوجد من التشابه بين الأحوال المصرية في إنتاج القصب ، وبين لوزيانا الشبه الاستوائية ما يكفي لتسويغ البحث بوجه الاختصار في التجارب التي أجريت بلوزيانا على مقدار الأزوت مع ملاحظة أن في تلك المنطقة الغربية يزرع القصب دائما بغزارة أقل من النصف مما هو متبع هنا (٣٣) فان متوسط المسافة بين الخطوط تبلغ ١٧٠ سنتيمترا مقابل ٨٠ سنتيمترا في مصر وأنه بناء على ذلك يلزم أن الرطل الواحد من الأزوت هناك ( ٤٥٤ جراما ) يجب نظريا أن يكون له ما للكيف منه في مصر تقريبا ، من حيث انخفاض نسبة الانبات ومقدار المحصول . ثم أنه نظرا لما هو بار عمليا بوجه عام من حرث محصول من الخضر في الأرض قبل غرس القصب بلوزيانا فإنه من النادر استعمال السماد لمحصول السنة الأولى ولذا فان مقارنتنا يلزم أن تكون على نتائج تسميد محصول السنة الثانية بالسمدة الكيماوية .

في مدة الخمس السنوات السابقة نجى المؤلف الى القطر المصري في سنة ١٩٣٢ قد أجرى عددا وافرا من التجارب في منطقة القصب بلوزيانا على مقدار الأزوت واستعمل في ذلك سمدة من مصادر مختلفة ، ومن بيانات هذه التجارب قد عمل متوسط الأرقام عن محصول عشرين تجربة مختلفة ( منها ١٣ تجربة استعمل فيها ترات الصودا الشيلي ، ٧ تجارب استعمل فيها أحسن أنواع سينايد الجير الذي يخزى على ٢١ ٪ من الأزوت ) . وكانت الأراضي التي أجريت فيها هذه التجارب من الأراضي الرسوبية من النوع المشابه جدا لأحسن أنواع أراضينا الجارية زراعة القصب بها وأسفرت النتائج عن ما هو موضح بالجدول رقم ٩ :

### الجدول رقم ٩

مقدار الأزوت في تجارب لوزيانا - نتائج تلخيص عن نوعي الاختبارين (١) (٢)

وزن السكر المتحصل من الفدان ، مئارا بالرطل	وزن الفدان بالطن	زيادة على الضوابط	تجارب المعالجة				السكر المتحصل من الفدان ، مقدارا بالرطل
			الفدان	زيادة على الضوابط	مكرر	الغزوة	المكسب

#### ( أ ) نيترات الصودا في ١٣ تجربة :

الضوابط بدون سماد	...	...	...	...	...	...	...
١٤,٣٧	...	...	...	...	...	...	...
٢٠٠ ( ٣١ نيترات )	...	...	...	...	...	...	...
٣٠٠ ( ٤٦ )	...	...	...	...	...	...	...

#### ( ب ) السينايد في ٧ تجارب :

الضوابط بدون سماد	...	...	...	...	...	...	...
١٦,٩٧	...	...	...	...	...	...	...
١٠٠ ( ٢١ آزوت )	...	...	...	...	...	...	...
٢٠٠ ( ٤٢ )	...	...	...	...	...	...	...
٣٠٠ ( ٦٣ )	...	...	...	...	...	...	...

(١) متوسط نتائج ثلاث سنين في زراعات قصب P.O.J. في السنة الثانية (الغمر) .

(٢) محدوبة باستعمال قانون جاره ، قانون وثيركارب Winter Corp يفرض أن نسبة الاستخراج ٧٥ ٪ ونسبة صلاحيته على حسب تقدير مكتب الاعلاء ١٠٠ ٪ / ٣٧٠

فتموسطات نتائج التجارب كانت في الاتجاه مشابهة لدرجة مدهشة لمتوسطات نتائج الاختبارات التي أجريتها بالقطر المصري. ففي اختبارات النترات أنتجت غرارة واحدة من السباد زيادة في العيدين متوسطها ٦١/٢ طن ، ١٣٠٠ رطل تقريبا من السكر بالفدان في لوزيانا تفوق محصول الضوابط والمفارز. بينما أن الزيادة الإضافية التي تقس على طن في العيدين ومائة رطل من السكر بالفدان وهي الزيادة التي نتجت من إضافة ثلث غرارة لا تسوِّغ التثني الذي صرف في تلك الإضافة .

وفي تجارب السياناميد قد أنتجت غرارة واحدة ربما متوسطه ٥١/٢ طن من العيدين ونصف طن تقريبا من السكر بالفدان زيادة عن المتوسط في قطع ( الضوابط ) بينما أن الربح الناتج من الإضافة المالية وهي إضافة غرارة من السياناميد أقل من نصف الربح الناتج من إضافة الغرارة الأولى كما هو الحاصل في تجاربنا ولكنه لا يستهان به من الوجهة الإحصائية والاقتصادية . ثم أن الزيادة الضئيلة التي نتجت من الغرارة الثالثة لا تسوِّغ أيضا ثمن السباد المضاف علاوة .

و لاحظ أيضا أن في كلتي التجريبتين أسفرت النتيجة عن نقص في جودة القصب كلما أضيف الآزوت إضافات بالملاوة متتالية .

هذا وبعبء دراسة هذه النتائج قد استنتج المؤلف ( ٣٠ ، ٣١ ) ما يأتي :

( أولا ) إن إضافة ٣٠ — ٤٠ رطلا من الآزوت للفدان في لوزيانا يظهر أنها تقريبا النهاية العظمى من الوجهة التجارية ، في ظروف هذه التجارب .

( ثانيا ) إن إضافة ١٥ — ٢٠ رطلا من الآزوت إلى ما يمكننا أن نسميه بالنسبة القياسية في هذه التجارب وهو ٣٠ — ٤٠ رطلا لم تات تجاريا بفائدة وأنا نرى من الوجهة التجارية فائدة ثابتة حتى ٣٠ — ٤٠ رطلا من الآزوت للفدان في لوزيانا وكذا علاوة ثابتة في وزن العيدين من إضافة ١٥ — ٢٠ رطلا من الآزوت ولكنها أقل حثا من نتائج استعمال ٣٠ — ٤٠ رطلا

( ثالثا ) قد أثبتنا نهائيا لدرجة ما أن يتنج من التسميد بمقدار ٣٠ — ٤٠ رطلا من الآزوت ربح ثابت قدره ١٥٠ — ٣٠٠ ٪ من الاستثمار .

ولا يعرف المؤلف سببا غير ذلك في زراعة قصب السكر من وقت حرق الأرض إلى وقت شحن المحصول يؤدي إلى زيادة الغلة بهذه النسبة المئوية الهائلة المحققة . وما يزيد عن ٤٠ رطلا أو — ٣٥ رطلا يؤثر تأثيرا سحيقا على السكر ويخفض مقداره .

وقد تأيدت هذه الاستنتاجات تأييدا كليا بسلسلة التجارب الواسعة على مصادر الآزوت التي اشترك في إجرائها قسم خصب الأراضي بالولايات المتحدة — مكتب الأراضي ومطعة التجارب بلوزيانا .

وفي ربيع سنة ١٩٣٠ وضع تصميم لإجراء تجربة واسعة النطاق قام بها جنابا المستر أونيل والمستر بيو ( ٢٥ ) في بلدة يازو حيث الأرض صفراء رملية ناعمة وهي من أحسن أنواع أراضي لوزيانا لزراعة القصب على مفرق من هوما . وقد وضعت فيها بمقادير ٢٠ ، ٤٠ ، ٦٠ ، ٨٠ رطلا من الآزوت للفدان الإنجليزي من الأسمدة المعتاد استعمالها بوجه عام وهي السياناميد وسلفات الأمونيا وتترات الصودا وتترات الجير والكالوريا . وقد عملت التجربة في قطع مزدوجة استغرقت سنتين خصصت السنة الأولى منهما لقصب السنة الثانية والأخرى لقصب السنة الثالثة .

وفي سنة ١٩٣٣ قام المستر هرست والمستر أرنيل والمستر بيو ( ١٨ ) بتجربة مماثلة في نقطة أخرى على نفس هذه الزراعة حيث كان قائما بها زراعة طيبة من قصب ٢١٣ P.O.J. الذي استعمل في التجارب السالفة وقد كررت كل عاملة أربع مرات .

واستخلص هؤلاء المحربون من نتائج السنوات الثلاث أنه لا أنضابية لمصادر من مصادر الآزوت على مصدر آخر ، وأن الآزوت نفسه كعامل ليست أهميته كاهمية المقدار المستعمل منه ، ومن ذلك الحين أصبحت زراعة التجارب متشابهة من حيث التجربة على اختلاف المقادير التي تستعمل من الأسمدة المختلفة ولدينا من هذه التجارب التي أجريت بكل عناية مجموعة عظيمة الأهمية تلخص نسب مختلفة من الآزوت في خمس تجارب أجريت في ثلاث سنوات وقد رأى المؤلف أن يحصل على متوسط النتائج عن مقادير الآزوت في كل حالة من هذه الأحوال الخمسة فينبه في الجدول رقم ١٠

وبما أنه يندر أن يبقى القصب الآن بمصر بعد السنة الثانية فإن الأرقام الدالة على العمر الأول سنة ١٩٣٠ قد بينت بتفصيل أوفى منه في القصب التالي ( المرفق الثاني )

الجدول رقم ١٠ — مقدار

متوسط نتائج خمسة

(١) أرقام تفصيلية عن قصب السنة الثانية

وزن الأرز بالطن من كل فدان الخيلزي	وزن العبدان بالطن من كل فدان الخيلزي			تجاريات
	المحصول	الزيادة	بركس	
لا شيء	٢٠٨	—	١٥٦٩	
٢٠	٢٦٠	٥٢	١٥٩٦	
٤٠	٢٩٢	٨٥	١٥٨٠	
٦٠	٢٨٧	٧٩	١٥٤١	
٨٠	٢٢٣	١١٥	١٤٩٤	

(ب) نتائج تلخيصية لقصب الس

وزن الأرز بالطن من كل فدان الخيلى	قصب السنة الثالثة — ١٩٣١				وزن السكر بالطن من كل فدان الخيلى
	وزن الميدان بالطن من كل فدان الخيلى		وزن السكر بالطن من كل فدان الخيلى		
	المحصول	الزيادة عن الضوابط	المحصول	الزيادة	
لا شيء	١٩٠	—	٣١٩٨	—	١٤٦
٢٠	٢٤٩	٥٩	٣٧٩٦	٥٩٨	١٩٢
٤٠	٢٥٤	٦٤	٣٩٦٥	٧٦٧	٢١٥
٦٠	٢٤٠	٥٠	٣٧٣٥	٥٢٧	٢٤٠
٨٠	٢٦٢	٧٢	٣٨٠٥	٦٢٧	٢٣٦

الآزوت في تجارب هوما بلويزيانا

مصادر للآزوت

من صنف (P.O.J.) سنة ١٩٣١

وزن السكر المحصل من فدان الخيلزي مقدرا بالطن					العقارة	
مقدار السكر المحصل من طن قصب مقدرا بالآرطال	القنطرة	سكر	مقدار السكر المحصل من طن قصب مقدرا بالآرطال	المحصول	الزيادة عن الضوابط	
١٣٢١	٨٤٢٠	١٧٩١	٢٧٢٥	—	—	
١٣٦٠	٨٥٢١	١٨٥٧	٤٨٢٦	١١٠١	—	
١٣٣٥	٨٤٤٩	١٨٠٧	٥٢٩٩	١٥٧٤	—	
١٢٥٤	٨١٣٨	١٦٧٠	٤٧٩٨	١٠٧٣	—	
١١٧٢	٧٨٤٥	١٥٢٨	٤٩٢٥	١٣٠٠	—	

الناتجة والسنة الرابعة (P.O.J.)

سنة الرابعة — ١٩٣٢						متوسطات ثلاثة محاصيل	
وزن العبدان	وزن السكر بالطن	وزن العبدان بالطن	وزن السكر بالطن	وزن العبدان بالطن	وزن السكر بالطن	وزن العبدان بالطن	وزن السكر بالطن
بالفدان الخيلزي	بالفدان الخيلزي	بالفدان الخيلزي	بالفدان الخيلزي	بالفدان الخيلزي	بالفدان الخيلزي	بالفدان الخيلزي	بالفدان الخيلزي
الزيادة	المحصول	الزيادة	المحصول	الزيادة	المحصول	الزيادة	المحصول
—	٢٥٤٦	—	١٨١	—	٣١٥٦	—	٣١٥٦
٤٧	٣٦١٩	١٠٧٣	٢٣٢٤	٥٣	٤٠٨٠	٩٢٤	٤٠٨٠
٦٩	٣٨٦٣	١٣١٧	٢٥٤	٧٣	٤٣٧٦	١٢٢٠	٤٣٧٦
٩٤	٤٠٠٣	١٤٥٧	٢٥٦	٧٥	٤١٧٥	١٠١٩	٤١٧٥
٩٠	٣٧٤١	١١٩٥	٢٧٤	٩٣	٤١٦٤	١٠٠٨	٤١٦٤



والتشابه بين نتائج هذه التجارب وتجارب المؤلف على السميد بالسياناميد التي كانت فيها المقادير الإضافية من الآزوت واحدة تقريباً (الجدول رقم ٩ ب) ظاهر لدرجة مدهشة ففي تجارب المؤلف أنتجت المشرون رطلاً الأولي من الآزوت زيادة في وزن العبدان قدرها خمسة أطنان ونصف و ٩٤٠ رطلاً من السكر بالفدان الانجليزي عن أرقام الضوابط، مقابل ٣٠٣ طن و ٩٢٤ رطلاً في التجارب الحالية بينما ان العشرين رطلاً من الآزوت الإضافية في الدفعة الثانية أنتجت زيادة قدرها ٢٣٣ طن في وزن العبدان و ٣٣٤ رطلاً من السكر في تجارب السياناميد ، مقابل طنين و ٢٩٦ رطلاً في تجارب هوما .

أما من جهة تأثير الكميات الكبيرة من الآزوت في تركيب السكر وكميته بالفدان الانجليزي فانه يلاحظ أن نتائج هوما ( موسم النمو الحقيقى بلوزيانا ) يقل شهرًا على الأقل عن موسم النمو في المطاعة أو كوم امبو ( تمائل تماثلًا بين نتائج تجاربنا في ملوى (الجدول رقم ٣) من ناحية أن أعظم مقدار من السكر وهو ١٣٢٠ رطلاً بالفدان الانجليزي في هوما صار الحصول عليه من الأجزاء المسمدة بأربعين رطلاً من الآزوت للفدان الانجليزي وأن كل ما زاد على هذه الكمية نتج عنه تقليل السكر بالفدان وأن الزيادة في وزن العبدان انما هي زيادة لا يعبأ بها من الناحية الاقتصادية ، ويقول أولئك الباحثون ” إنه يظهر مما تقدم ان كل اضافة تزيد عن ٤٠ رطلاً من الآزوت للفدان الانجليزي ضئيلة من الوجهة الاقتصادية “ .

وبناءً على السميد الذى يتبعه زارعو القصب بلوزيانا ( محطة التجارب التفصيلية منشور رقم ١٥١ سنة ١٩٣٣ ) قد وضع على أساس أول كمية اعتبرت عملياً أنجع تسميداً للفدان الانجليزي ألا وهى ٣٦ رطلاً من الآزوت . وقد استعمل النوع من الأسمدة الذى يعطى الكمية اللازمة من الآزوت ويكون أقل ثمنًا من غيره .

## الخلاصة

نظرا الى هبوط أثمان الأسمدة الآزوتية بسبب التقدم الهائل في الصناعات التركيبية في العشرين سنة الفائتة ، فقد وجد لدى زراع القصب ميل عام في جميع الأنحاء الى انفاق ما كانوا يتفقدون على تسميد الفدان الانجليزي وتسميد الأرض بمقادير أكبر بكثير مما كانوا يستعملون من قبل .

ثم انه في كثير من الجهات التي يزرع فيها القصب يظهر أن هذه العادة قد أدت الى استعمال الأسمدة بمقادير تفوق كثيراً أحسن ما يصلح استعماله تجارياً أى بالمقادير التي تتكلف أكثر من قيمة الزيادة التي يتحصل عليها في العبدان والسكران وجدت . هذا وفي الجهات شبه الاستوائية كالديار المصرية ولوزيانا والجمهورية القصبية حيث مواسم النمو محدودة بسبب الجوف قد يصير تجاوز أحسن مقدار اقتصادياً تجاوزاً يزيد عنه في المناطق الحارة فعلاً وقد رؤى من المستحسن تعيين مقادير الأسمدة الأزوتية اللازمة استعمالها في مناطق زراعة القصب المختلفة بمصر وكذا في مختلف أنواع التربة استعمالاً يهود على زراع القصب بأعظم فائدة لمسا أفقعه من النقص على الفدان .

وللوصول الى هذا الغرض قد وضعت عدة تجارب مكررة واسعة النطاق منذ عدة سنوات بملوى والمطاعة وكوم امبو بكيفية بها صار تحديد قيمة مقدار الآزوت في تراكيبه المختلفة من الناحية الاقتصادية تحديداً مناسباً يختلف من ٣٠ الى ١٠٥ كيلو للفدان . وقد وصل هذا المقدار في المطاعة الى غرارين من تروسلفات النوشادر ( ٥٢ كيلو من الآزوت ) للفدان بما أنه لم يمكن الحصول على محصول أزيد اذا استعمل أكثر من ذلك (الجدول رقم ١ والجدول رقم ٢) والى غرارين من ترات الجير ( ٣١ كيلو من الآزوت ) للفدان في ملوى (الجدول رقم ٣) حيث أنتج ذلك أحسن محصول من القصب من الناحية الاقتصادية . مع ملاحظة ان اضافة غرارة واحدة من النترات علاوة على ذلك قد نتج عنها نقص مقدار السكر بالفدان نقصاً مرعباً بسبب التأثير السيئ الناتج من استعمال الآزوت بغزارة على نصيب القصب ومقدار السكر في العصور .

وفي كوم امبو عملت تجارب مماثلة من كل وجهة لتجارب المطاعة في ثلاث نظائرات مختلفة إلا فيما يخص بالمقدار الأساسى حيث كان أقل كمية ( غرارة واحدة من تروسلفات النوشادر بدلاً من غرارة ونصف ) وقد أسفر متوسط نتائجها عن اتجاه مشابه تقريباً الى اتجاه اختبارات المطاعة القريبة منها ( راجع الجدول رقم ٨ ) .

## BIBLIOGRAPHY

1. AGEE, H. P.—Fertilization for Soil Amendment and Maintenance. Repts. H.S.P.A. Agr. Mtg., L., Indu., 1931.
2. ALEXANDER, W. P.—Influence of Nitrogenous Fertilizers on Sucrose Content of Sugar Cane. Hawaiian Planters' Record, XXXII, 1928.
3. BOONERO, G.—Groot de suikerindustrie geld weg bij de toepassing van Kunstmest. Arch. v. d. Skrind. Ned.-Ind., 1933, No. 15, pp. 501-12.
4. BOWLES, SIDNEY J.—Fertilizer Recommendations for Sugar Cane. Sug. Bull., XI, No. 13, pp. 5-6, 1933.
5. CLIFF, A. P.—Manuring of Sugar Cane in North Bihar. Ind. Ja. Agr. Sci., I, p. 652-12, 1931.
6. COATES, FREDERICK and SALAZAR.—La. Pte. and Sugar Mfr., LXXX, p. 421., 1928.
7. CROSS, W. E.—Has the Sugar Industry been Throwing away Money on Fertilizers? Int. S. J., XXXV, 1933.
8. DEERE, NOEL.—Cane Sugar, p. 99. Ldn., 1921.
9. DEMANDT, R.—Optimum Nitrogen Fertilization for P.O.J. 2878 (Trans. Tit). Arch. Suikind. Ned. Ind., XXXIX, Deel III, Meded. 12, pp. 561-81, 1931.
10. DEMANDT, R. V.—Philippine Agriculturist, XX, p. 139.
11. DODDS, H. H.—The Manuring of Sugar Cane. Empire Jn. Exptl. Agr., I, 4, 1933.
12. DODDS, H. H.—Notes on Some Fertilizer Experiments Harvested in 1934. Proc. Agr. Cong. Sou. Af. Sug. Technol. Assn., IX, Durban, 1935.
13. EARLE, F. S.—Sugar Cane and its Culture. N.Y., 1928.
14. GEERTS, J.M.—Meded. v. h. Proefsta v. d. Java. suikind. Landbouwkund. serie, No. 5, 1920.
15. GRACE, KHALIL and ENAN.—An Analysis of the Factors Governing the Response to Manuring of Cotton in Egypt. Min. Agr., Tech. Bull. 152. Cairo, 1935.
16. HEDLEY and BEATER.—Absorption of Plant-Foods by Sugar Cane. Proc. Agr. Cong. Sou. Af. Sug. Technol. Assn., VII, 1933.
17. HONIG, P.—De aschbestanddelen van suikerriet. Arch. Skrind. Ned.-Ind., 10, p. 135, 1931.
18. HURST, O'NEAL and BREUX.—Nitrogen Requirements on Sugar Cane... in Louisiana. Sug. Bull., XI, No. 13. N. Orleans, Ist. April 1, 1933.
19. KERR, H. W.—FAIRM Fertility Trials. Qnsland. Bur. Sug. Expt. Stas. Farm. Bulls. 1 and 3, 1931 and 1932.
20. KUNGE, GERARDO.—Politica de Irrigacion. La Vida Agricola, XII, 1935.
21. LOPEZ-DOMINGUEZ, F. A.—Sugar Cane Soil and Fertilizer Research in Peru. Proc. Cong. Intern. Soc. Sug. Cane Techs., IV., Bull. 78. S.J., 1932.
22. MARTIN, J. P.—Sugar Cane Growth in Nutrient Solutions. Haw. Pltr's Rec., XXXIX No. 2, pp. 79-96, 1935.
23. MITSCHELIICH, E. A.—Physical Properties of Soils and Crop Yields (Trans. Tit.). Publ. Inst. Belge Amelior. Betterave III, No. 3, pp. 93-102, 1935.

هذا ولوجود مقدار كبير من التشابه في الأرض والأحوال الجوية والصنعية بين البلدين شبه الاستوائية الذين يزرع القصب فهما فقد قابلنا بين عدة نتائج من التجارب التي أجريت على مقدار الآزوت في لوزيانا (راجع الجدولين رقم ٩ و رقم ١٠) والنتائج التي حصلنا عليها من تجاربنا بالقطر المصري وظهر من النتائج في جميع الأحوال اتجاهات متماثلة

وتناسق نتائج هذه التجارب في المساحات المختلفة التي يزرع بها القصب في مصر مما قد يشير إلى السبيل الموصل إلى اقتصاد في مقدار ما ينفقه زارعو القصب اقتصادا يتردد بين ٣٠,٠٠٠ - ٤٠,٠٠٠ جنيه سنويا .

## كشـف

### باسماء الموظفين الفنيين التابعين لقسم تربية النباتات الذين في الدرجة السادسة فما فوق

حضرة البيرونيشتين افندى .	جناب الدكتور ج . تجمتون .
» يوسف شيناي افندى .	» المستر س . ه . براون .
» محمد بدر الدين افندى .	» » ه . ا . هانوك .
» أحمد أحمد يوسف افندى .	» الدكتور ج . فياب .
» محمد عفيفي حسين افندى .	» حضرة أرمناك بديفيان افندى .
» أحمد زكى أبو النجا افندى .	» محمد محمد الديب افندى .
رياض نجيب افندى .	جناب المستر ف . دانكرلى .
محمد محمود صالح افندى .	حضرة الدكتور محمد على الكيلانى افندى .
محمود فهمى الكاتب افندى .	» محمود فائق افندى .
محمود عبد الباقى افندى .	» محمد عبد الله زغلول افندى .
محمد صادق افندى .	» حسين ثابت افندى .
عبد الفتاح محمد السيد عطائه افندى .	» محمد سعيد أبو العطا افندى .
فوزى ساويرس بسطا افندى .	» الدكتور وديع شاربوم افندى .
الدكتور حسيني ابراهيم المغير افندى .	» محمد عبد العزيز القشيري افندى .
السيد حلمى حماد افندى .	» عبد الحميد جلال محرز افندى .
أحمد زكى عبد الجواد افندى .	» محمود جوهر افندى .
ابراهيم حمدى افندى .	» أحمد منير افندى .
سليم نظيف افندى .	» عبد الحميد سويلم افندى .
	» عبد الغفار سليم افندى .

24. MOIR, W. W. G.—HAWAIIAN Soils and Fertilizer Research. Cong. Intl. Soc. S. Cane Technol., IV, S. Juan, 1932.
25. O'NEAL AND BREAUX.—Soil Fertility Investigations... Louisiana. La. Exp. Sta. Bull. 222, 1931.
26. PARDO, J. H.—Utilization of Certain Nitrogen Compounds by Sugar Cane. Intl. Sug. J., XXXIV, 1932.
27. ROSENFIELD, ARTHUR H.—Ensayos con Abonos. Rev. Indatl. y Agric. Tucumán, II, 1911, and V, 1915.
28. ROSENFIELD, ARTHUR H.—La Estación Experimental de la Sociedad Nacional Agraria de Peru. Lima, 1929.
29. ROSENFIELD, ARTHUR H.—La Estación Experimental de Java. Bol. Pan.—Amor. Un. No. 68, 1930.
30. ROSENFIELD, ARTHUR H.—Results of Some Co-operative Fertilization Tests. Sug. Bull., VI, 15, 1928; VII, 9, 1929; VIII, 11 and 16, 1930; IX, 9 and 18, 1931.
31. ROSENFIELD, ARTHUR H.—Fertilizer Experiments in Louisiana. Intl. Soc. Sug. C. Technol., IV, Bull. 95, S. Juan, 1932.
32. ROSENFIELD, ARTHUR H.—Wasteful Sugar Cane Fertilization. Intl. Sug. Jour., XXXV, 1933.
33. ROSENFIELD, ARTHUR H.—Optimum Sugar Cane Planting Date in Egypt. Min. Agr., Tech. Bull. 156, 1935. The Spacing of Sugar Cane in Egypt and Elsewhere. *Ibid*, 1936.
34. SAINT, S. J.—Report of Agr. Chemist. Rept. Dept. Sci. and Agr. Barbados. 1929-1930, p. 76.
35. SAINT, S. J.—Manual Experiments on Sugar Cane, 1928-1932. Agric. J. Barbados, Oct., 1932.
36. SMITH, A. K.—Use of Cyanamid as Source of Nitrogen for Sugar Cane in Louisiana. La. Exp. Sta. Bull. 237, 1933.
37. SPENCER, G. L.—Handbook for Cane Sugar Manufacturers. N.Y., 1917 *et seq.*
38. STUBBS, W. C.—Cultivation of Sugar Cane. N. Orlans., 1900.
39. TURNER, P. E.—Manual Experiments with Sugar Cane. Trop. Agr. IX, p. 177, 1932, and X, p. 60, 1933.
40. WILLIAMS AND FOLLET-SMITH.—Field Experiments with Sugar Cane. Br. Guiana Dept. Agr. Bull. 1, 1933.



FIG. 1.—Fertilization at the optimum rate yields large dividends

شكل ١ — التسميد بأفضل مقدار يأن عوائد كبيرة



FIG. 2.—Leaving the Matruh experimental zone (Feb. 1935)

شكل ٢ — تخرج الحقل التجريبي بالمنطقة ( فبراير سنة ١٩٣٥ )




FIG. 3.—Checking up on Kom-Ombo plantings. (Photo Mirrahi.)

شكل ٣ — الكشف على القصب في مزارع كوم أومبو

نسبة الآزوت في تخارب ملوى — تأثير زيادة الآزوت في محصول القصب والسكر  
٢٥ - ١٩٣٤

MALLAWI RATE OF NITROGEN EXPERIMENTS  
Effect of Increasing Nitrogen on Yield of Cane & Sugar  
1934-35




بيان القيمة النقدية لأقصى التسميد في تجارب ملوحي ١٩٣٥ - ١٩٣٤

GRAPH SHOWING MONETARY VALUE OF MAXIMUM

MANURING OF SUGAR CANE AT MALLAWI

1934-35



1 Kgrs Sugar Cane = 25 P.T

100 Kgrs N.L. = 70 "


Shaded space represents cost of manure

من القنطار ومن القصب = ٢٥

من ال ١٠٠ ك.ع من نترات الجير = ٧٠

الجهات المظلة تبين ثمن السماد

تأثير الزيادة في جودة القصب ١٩٣٥ - ١٩٣٤ في الآزوت (١٥ ١/٢) نترات الآزوت في الأعطاء للقمحيات





# NOTES OF SODA EXPERIMENTS AT MALLAWI


## MONEY VALUE

Average Results for First 355, 340 Second, and 354 551 Cane

# ناتج الصودا في تجارب ماولي

## القيمة المادية

متوسط النتائج الأولى (355-340) والثانية (354-551) قصب



1 1/2 Sacks = 300 kgs

2 Sacks = 200 kgs

3 Sacks = 300 kgs

Control = 2305

وزارة الزراعة

قسم تربية النباتات

# النشرة الفنية

رقم ١٧٣

ما يحتاج اليه قصب السكر من السماد في مصر  
تجارب التسميد بالأسمدة الفوسفاتية بكوم امبو

تأليف

المستر آرثر . ه . روزنفيلد

المدير الفني في القصب

ترجمها الى العربية

سليم نظيف افندي

المساعد الفني بقسم تربية النباتات

(أوست بطبعتها لجنة المطبوعات بوزارة الزراعة ولكنها غير مسئولة كهيئة عن الآراء المدونة بها)

طبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة ، سنة ١٩٣٧

تباع مطبوعات الحكومة بحالة البيع بوزارة المالية . أما المكاتبات  
الخاصة بهذه المطبوعات ترسل وأسا الى فلم النشر بالمطبعة الأميرية

الثمن ٢٠ ملجاً



## المحتويات

الصفحة

الموضوع	١
المقدمة	١
بعض الابحاث السابقة في المناطق المتدلة (المدارية)	٣
الأرجنتين (الجمهوريّة الفضية)	٣
لوزيانا	٤
الابحاث التي عملت بمصر	٧
أنواع التربة ونمط الأرض وزراعتها	٨
المظاهر المرتبطة لتأثير الهوسفات على القصب النامي	٨
طرق الحصاد والمحصول	٩
بحرى كراميو (جدول رقم ٣)	١٠
العباسية (جدول رقم ٤)	١١
شرق الرطامة (جدول رقم ٥)	١٣
حوض سبعة قبل (جدول رقم ٦)	١٤
النتائج السلبية في الثلاث نظارات	١٥
النتائج الإيجابية لحوض سبعة قبل	١٧
النتائج	١٨
الملخص	١٩
المراجع	٢١

## ما يحتاج اليه قصب السكر من السماد في مصر

بحث

للدكتور . آرثر . ه . روزنفيلد خبير قصب السكر

### تجارب التسميد بالأممدة الفوسفاتية بكم أمبو

” إن زيادة استعمالنا للأممدة الفوسفاتية في مناجنا الميادي لابد وأن يتجمعه زيادة في محصول قصب السكر — بصرف النظر عما تحتويه التربة التي تزرع فيها من خامس أكسيد الفوسفور (فو ٢/٥) — هذه أسطورة قديمة في زراعة القصب، على الرغم من أنه توجد تجارب إيضاحية قليلة أو ربما لا توجد مطلقا، تؤيد هذا. ولقد أوضح باحثو هاواي النظام (٢٩ ٢٢٤ ٢٢١) أن الزيادة من وضع الفوسفات للتربة قد تقابل بارتفاع كميات الفوسفات في عصير القصب، وبذا تسهل عملية الترويق ويسهل تدرج العمليات. ويمكن هذه النتائج المرضية أمكن الحصول عليها دائما من وضع الفوسفات للأراضي المحتاجة لعنصر الفوسفات — التي توجد بوفرة جدا في المساحة التي تزرع قصبيا في مصر — حيث من المحتمل أن خامس أكسيد الفوسفور كان العامل الغذائي المحدد وأن الفوسفات المضافة فقط هي التي أنشأت من جديد التوازن في عناصر غذاء النبات. الشيء الرئيسي في عمليات البناء العادية.

وكذا فإن أبحاثنا أخرى في هاواي على الفوسفات والبوتاس الموجودة في عصارات قصب مأخوذ من قطع (رموز) التجارب والحقول، والتي تشمل عددا كبيرا من هذه الاختبارات في أراضي شركة أوها (Oahu) تظهر لنا بصفة جازمة أنه في حالة نصح نبات القصب بميل نسبة محبو يانه من حامض الفوسفوريك الى الارتفاع، بينما تنخفض محبو يات البوتاس ويوضع مواد (Moist) (٢٩) — الذي أجرى بعض الأبحاث الدقيقة في هذا السبيل هذا الاتجاه بمخاليله لأجزاء ساق القصب المختلفة (الثالث العلوى، الثالث الأوسط — الثالث الأسفل) حيث إنه من المعقول أن يقال أن الجزء السفلي من القصب النامي أكثر تضجعا من الجزء العلوى. فمثلا في متوسط اعشرين ثود مأخوذة من قصب كاليدونيا القديم Colodonia ذو اللون الأصفر والتي عمرها ٢٢ شهرا — كان متوسط نسب محتويات الثالث العلوى والثالث المتوسط والثالث الأسفل من خامس أكسيد الفوسفور هي على التوالي ٠.٠١٧، ٠.٠٢٣٦، ٠.٠٤٠. بينما كانت نسبة أكسيد البوتاسيوم هي ٠.٠٨٧، ٠.٠٦٦، ٠.٠٥٥٦ على التوالي أيضا.

وفي باقي الأراضي والمنحدرات الحجرية .. الخ ، قد تكون نسبة خامس أكسيد الفسفور المنخفضة هي العامل الغذائي المحدد في إنتاج الفسب ، ولكن قليلا جدا ما وجد الكاتب مثل هذه الحالة في الأراضي الرسوبية بصرف النظر عن أنها تحت ظروف الأمطار أو نظام الري العادي ، دون التفات إلى أن هذه الأراضي كانت على جانب من الحمضية أو القلوية الخفيفة الجمهورية الفضية (الأرجنتين) : حينما أنشئت محطة تجارب السكر في تاكمان

(Tacuman Sugar Experiment Station) منذ ربع قرن مضى كان أول ما اهتم به إجراء تجارب التسميد وقد كانت هذه التجارب من النوع العلمي على الأزوت والفوسفات والبوتاسا كل بمفردها ، ثم على مخلوط من كل اثنين من هذه العناصر . ثم أخيرا على مجموع العناصر الثلاثة (مختلطة) . وقد كانت الكمية المتبعة إعطاؤها للهكتار في كل حالة هي ٥٠ كيلو جراما من الأزوت . ومن كل من السممين الآخرين ٥٠ كيلو جراما . وقد أجريت تجارب أيضا على إعطاء نصف هذه الكمية ونصفها وثلاثة أضعافها .

ويجد في جدول رقم ١ أن نتائج الأزوت بمفرده + حامض الفوسفوريك هي عبارة عن متوسطات أربع سنوات ثلاث تجارب متشابهة على قصب تلك البلاد المخطط ذو اللون الأرجواني (البلدي عندنا) --- أي مجموع أي عشر محصولا مختلفا اجتازت دورة واسعة من الاختلافات الجوية (٣٣) . وكان مصدر الأوزت هو السداد العضوي القديم من الدم الجاف ، ومصدر خامس أكسيد الفوسفور ، هو سو برفوسفات الكلسيوم .

## جدول رقم ١

متوسط نتائج اثنى عشر محصولا بالأرجنتين

### التحليلات الكيميائية للعصارة

العناصر	محصول الحبوب	متوسط وزن البود	المواد الصلبة	السكر	القوة	السكر المحصول	محصول السكر
طن	جرام	١٦٠	١٦٠	١٣٠	٨٣	١١٣	٢٢٦٠
أزوت ... ..	٢٩٠١١٧	٦٤٠	١٦٠١	١٣٠٤	٨٣٠٣	١١٣	٢٢٦٠
أزوت + فوسفوريك	٢٥٠٠٩	٥٦٠	١٣٠٥	١٣٠	٨٣٠٢	١٠٦	١٨٧٠

+ عامل كثيرا ما يستعمل في تاكمان ، يحصل عليه ضرب كذا ١٠ سكور × القوة .

++ باعتبار الناتج من ٧٠٪ من مجموع وزن القصب .

وقد درس باحثون كثيرون المحتويات المعدنية لعصير القصب وعصارات المحاصيل أخرى ووصلوا إلى نفس النتائج التي استخلصها ما كول وويلدون (٣٢) (Me Cool & Weldon) من بينهم تشير على عصارة حبوب القمح الصغيرة حيث يقولون : -  
" أن المحتويات الفوسفاتية للعصارة أظهرت ميلا عاما إلى الزيادة كلما تقدم عمر النبات وبالعكس فإن المحتويات البوتاسية كانت أقل في النباتات الأخيرة " .

ولم ينجح فيرت (٤٤) (Verret) بمراجعة تجارب هاواي - أن يجد أقل علاقة بين درجة العصارة والتسميد بمحاصل الفوسفوريك كما أن لي (١٦ و ١٧) (Lee) فشل أيضا في ذلك بعد إجراء تجاربه الدقيقة القلدين . وقد سرت نفس النتائج على أبحاث فرناندز جارسيا (٩) Fernandez Garcia في بورتوريكو وكذا على أبحاث سانت (٣٩) (Saint) في مار نادوس . بينما أورى كونور وأبوت (٥) Connor & Abbott أن درجة المحصول تتحسن بإضافة ذلك المركب السام إلى الناقص في التربة .

ويظهر أن لافرم من هذه النتيجة حيث أننا ننظر تحسنا في كل من المحصول أو درجة هذا المحصول من إضافة الفوسفات إلى أراضي قصب السكر وذلك في حالة ما تكون تلك الأراضي محتاجة لخامس أكسيد الفوسفور الفعال ، كما أننا نحضر ماديا بوضع حامض الفوسفوريك في الأراضي التي ليست في حاجة إليه . ونعود فنذكر ما أورده موار (٢٩) Moir المشهور بأبحاثه في هذا الشأن فنقول : -

" قد تمكنت درجة المحصول من إضافة كميات من هذا العنصر - حمض الفوسفوريك - الذي يعزى نقصه إما إلى نقص في الكمية أو أنه غير فعال وعرف ذلك بالمقابلة لأرض أخرى أو بإضافة المواد المعدنية ، وبقطع التحسن في الدرجة عند نقطة خاصة تصبح عندها الكمية المضافة عاملا عكسيا أو مضرا بالنسبة إلى عدم التوازن الناشئ .

ويقول موار (Moir) أيضا إن هناك نتائج لتجارب متعددة توضح التأثير الضار (السام) الناتج عن وضع كميات كبيرة من الفوسفات - ففي مصنع بيونير (Pioneer Mill) مثلا حيث ينتج ٣٠٠ رطل أو أكثر للفدان أنتجت أقل من ٢٠٠ رطل في تجارب كثيرة ، واستنتج من ذلك " أن القصب لا يختلف كثيرا عن المحاصيل الأخرى في تحسن درجته بالنسبة لتوازن العناصر الغذائية " .

### بعض الأبحاث السابقة في الأقاليم المدارية

لقد ووجه الكاتب في أثناء سنوات دراسية كثيرة على هذا الموضوع في الأقاليم المدارية ، بإدلة ثابتة على مثل هذه التأثيرات السامة أو المخطئة ، الناتجة عن وضع كميات كبيرة نسبيا من السوبر فوسفات في أراضي القصب الرسوبية المشابهة لأراضي الوجه القبلي التي تحتوي عادة على ما يكفي من حامض الفوسفوريك الجاهز لإنتاج المحاصيل الاعتيادية .

وبينا هذه الأرقام في صالح الأزوت وحده إلا أنها قد لا تكون قاطعة في مجموعها ، وذلك بالنسبة لمخطا الكبير غير المسموح به في التجارب ، في محصول السنة الثالثة والرابعة للقطع ، إذ كان هناك ميل دائم يدل بوضوح على عدم التحسن لا في غلة القصب ، ولا في غلة السكر ، ولا في متوسط الحجم الفردي للعيان ، أو نوع العصارة الناتجة عن التسميد بمحضر الفوسفوريك مع الأزوت ، تحت ظروف هذه التجارب .

### لوزيانا :

لقد وجد الكاتب . بعد أن رجع إلى لوزيانا سنة ١٩٢٦ تخير مستشارا لربطة قصب السكر الأمريكية . وبعد غياب سنة عشر عاما . نفس نظام تسميد القصب الذي كان شامسا في أثناء عمله الأول هناك عدا أن المواد المركبة الصناعية حلت محل المواد العضوية بكثرة شائعة ، وذلك في عهد الدكتور كرتستاز (٤١) — (Dr W.M. Carter Stubbs) وكذا كانت إضافة ٣٠ إلى ٤٠ رطلا من حامض أكسيد الفوسفور للفدان لم تزل متبعة في جميع زراعات القصب ، وذلك زيادة عن التسميد الأزوتي العادي . وفي غضون ذلك ، قد حدث تغيران أساسيان في زراعات القصب لابد وأن يكونا قد أثرا تأثيرا حيويا نافعا في ميزان غذاء النبات الموجود بالتربة وهما : —

١ — حل محصول فول الصويا ( بيلكسي ) Biloxi Soya beans الكثير المحصول المنضج الجذور . محل محصول اللوبيا الرقيق الذي لا يمتثل المعاملة الرديئة والذي كانت تستعمل بكثرة كمحصول سمادي أخضر .

٢ — الفشل التام تقريبا لتسميد لوزيانا بالمخطط القنفذ (البدى) وصنف D.V.4 بالنسبة لإصابتها بمرض الموزايك ، والضرورة الواضحة لإحلال أصناف أخرى أكثر قوة ومناعة ضد المرض مثل أصناف قصب P.n.j الرفيعة .

وقد ظهر للؤايف من أول الأمر ، أن التغيير في محصول الدورة ليس فقط لتخزين كميات أكبر من الأزوت العضوى السهل التناول لمحصول القصب ، بل وأنه أشد قدرة على اجتذاب حامض الفوسفوريك من الطبقات الأرضية السفلى نتيجة لكبر حجم وطول جذور محصول فول الصويا إذا قورنت بوجه عام بجذور محصول اللوبيا .

ومن المقول أن للجامع البلدرية التامة التكوين لأصناف P.n.j القدرة على الاستفادة من الغذاء الباقي الموجود بالتربة أكثر من أصناف البدى التي تنقطع عن تكوين الجذور إذا ما أصيب النبات بمرض الموزايك إصابة شديدة .

ولقد أجريت بعض التجارب التعاونية البسيطة في مساحات كبيرة في جهات متعددة من الولاية ، وفي سنة ١٩٢٨ نشر الكاتب جميع أرقام التجارب الناجمة عن إضافة كميات مختلفة من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية لمحصول السنة الأولى وذلك لست زراعات مختلفة ، وقد كانت النتائج سلبية في كل حالة من الواجهة التجارية ( الاقتصادية ) .

ويرجع السبب في عدم موافقة التسميد إلى الحقيقة السابقة ذكرها وهى أن القصب دائما مايزرع في لوزيانا في الأرض التي حوت بها حديثا محصول جيد من فول الصويا .

وعلى ذلك فابتدأنا بفصل سنة ١٩٢٨ افتتحت تجاربنا على محصول السنة الثانية والثالثة ونظرا إلى أن محصول القصب في مصر نادرا ما يترك في الأرض بعد السنة الثانية ، فإن المحاصيل التي ندرسها الآن كانت محاصيل السنة الثانية هنالك ، وقد كانت مزروعة وأنواع من التربة الرسوبية تشبه تلك التي تنتج القصب في الوجه القبلى .

وبعكس النتائج التي حصل عليها من تجارب السنة الأولى ( البكر ) فقد ظهر أثرين وتجانس في تجارب الخلفة في سنى ١٩٢٨ و ١٩٢١ و ١٩٣٠ من إضافة ٣٠ إلى ٤٠ رطلا من الأزوت للفدان وذلك لجميع الأسمدة الأزوتية ، بينا أن إضافة حامض الفوسفوريك بكميات مختلفة لم تظهر أى تأثير مفيد في وزن أو صفات المحصول ، كما يرى من ملخص نتائج تجارب ثلاث سنوات لمصدرين سماديين مختلفين في جدول رقم ٢ ، فهى كلتا السلسلتين كان يوضع ٢٠٠ رطل من كل من سمادى تترات الصودا والسناميد للفدان . وفي كل الحالات كان محصول كل قطعة يعصر وحده ويحلل في مصنع سكر تجارى كما في حالة تجاربنا في مصر وبذا أمكن تقادى عقبة المحصول على بعثنا ألا وهى " العينة المثلة " .

## جدول رقم ٢

متوسط سنوى لتجارب ٣ سنوات في لوزيانا

## (١) ١٣ - تجربة على تترات الصودا :

المعاملة	محصول إكبر القصب بالعزل		تجارب المعالجة			أرطال سكر مائلة في الفدان*	
	المحصول	الإزادة الناتجة	المواد الصلبة	السكروز	الفاوة	المحصول	الإزادة الناتجة
بدون سداد ...	١٤,٣٢	—	١٥,٨٠	١٣,٢٤	٨٣,٨٠	٢٧٢٩	—
تترات ...	٢٠,٨٤	٦,٥٢	١٦,٠٣	١٣,١١	٨١,٧٨	٣٩١٥	١١٨٦
تترات + فوسفات	١٩,٩٦	٥,٦٤	١٦,١٦	١٣,٢٤	٨١,٩٣	٣٧٣٣	١٠٠٤

## (ب) ١٤ - تجربة على السياميد :

المعاملة	محصول إكبر القصب بالعزل		تجارب المعالجة			أرطال سكر مائلة في الفدان*	
	المحصول	الإزادة الناتجة	المواد الصلبة	السكروز	الفاوة	المحصول	الإزادة الناتجة
بدون سداد ...	١٦,٣	—	١٦,٣٥	١٣,٣٤	٨١,٥٩	٣١٦٠	—
سياميد ...	١٦,٣٦	٧,١٠	١٦,٠٣	١٣,٠٣	٨١,٢٩	٤٣٥٦	١١٩٦
سياميد + فوسفات	٢٤,٣٣	٧,٥٧	١٦,١٢	١٣,٩٩	٨٠,٥٨	١٤٢٥	١٢٦٥

وبما أن هذه النتائج استخلص الكاتب (٣٥) ما يأتي :

” ليس هناك تحسين معروف في المحصول أو محتويات السكر من جراء إضافة حامض الفوسفوريك مع أسمدنا الأزوتية . وأنه لمن الدلالة الواضحة والكافية ، بعد تجارب أربع سنوات ، أن تحكم بصفة قاطعة ضد الاعتقاد السائد السابق . وهو وضع ٢٠٠ رطل تقريبا من السوبر فوسفات للفدان . عدا في بعض أنواع الأراضي المختلفة التي لها خواصها . ولم تظهر فقط أية فائدة على العموم — وبالأخص الفائدة التجارية — من وضع حامض الفوسفوريك ، بل أنه في كل الحالات لم يحصل على أى دليل بأن له أى تأثير نظري في إسرار النضج ، الذى يزيد محتويات السكر “ .

\* استخلصت باستعمال قاعدة جاره وقر كروب (winter-carp) بانحد ٧٥٪ استخراج المعالجة ١٠٠٪ .  
نوع مصنع السكر .

والمعارة الآتية تدل على اتباع هذه النتائج في لوزيانا بتوسع وهي متفولة عن منهج (برناج) متجنى القصب بجنوب لوزيانا :  
” ودان النهر الأولى يجب الاقتصاد في أسميدها على الأزوت فقط فيما عدا الأراضي التي أوصحت التجارب لزوم استعمال الفوسفات بها “

وقد اتضح من تجارب حديثة بوشتر سوبا بواسطة مكتب الكيمياء بالولايات المتحدة ومحطة تجارب لوزيانا بواسطة أوين ، هرست ، برو\* — إمكان الحصول على ربح مرضى من وضع نصف الكية من السوبر فوسفات التي كانت توضع قبلا إلى الأراضي المسماة بالملية في لوزيانا Yazoo (أراضي رملية ناعمة جدا وخصبة غربية) . ويجب أن نقول إنه من المحتمل أنه بدم توالى استعمال الفوسفات في هذه الأراضي لمدة عدة سنين ، أن يكون قد نشأ عن ذلك نقص واضح في كميات الفوسفات المخزنة التي نشأت في زمن أتبع فيه وضع الفوسفات بكثرة زائدة .

## الأبحاث التي عملت بمصر

في خريف سنة ١٩٣٣ وبالمعارة الصادقة مع مدير عام شركة السكر رينيه قطاوى بك ومسبوس . جذبت الموظف بشركة وادى كوم امبو — عمل تصميم لأربع تجارب احصائية في شكل بسيط على قدر الامكان . بقصد البت في موضوع تأثير وضع كسبين (الكس ١٠٠ كيلو جرام) من سوبر فوسفات الكلسيوم ١٦,٥٪ مع كمية الأزوت العادية التي توضع عادة وذلك في جملة نظارات مختلفة تشتمل على أنواع من التربة تتدرج من جيدة جدا إلى أضعف الترات في هذا التفنيش الفصيح .

وقد اشغلت كل تجربة على اثنتي عشرة منطقة مساحتها ربة قراريط (١/٢ فدان) وأعطيت كل منها كمية السماد العادية (٣,٢٥ شوال من ترو سلفات الأمونيا ٢٦٪ أزوت أى ٥٧ كيلو جراما من الأزوت للفدان) لمحصول السنة الأولى (البكر) وأربعة شوالا (١١٧ كيلو جراما من الأزوت) لمحصول السنة الثانية (الحلقة الأولى) كما أعطيت كل واحدة متبادلة منها معدل ٣٣ كيلو جراما من خامس أكسيد الفوسفور للفدان وذلك بوضع شوالين من السوبر فوسفات بين الخطوط قبل الزراعة مباشرة ، وكذا بعد حرا الأرض في مايو لمحصول السنة الثانية .

وقد انفق على جعل مساحة القطعة ١/٢ فدان نظرا لأنه رأى أنها تمثل مساحة من الأرض تكفي لإنتاج كمية كافية من القصب ، وبصير من الملائم تسليمها لمصنع سكر كبير حديث دون تعقيد كثير ، وتأخير في عمليات المصنع ، حيث بالتجاوز عن كميات بسيطة لمحصول



القطع الذي يبلغ من ٥ إلى ١١ طنا لكل قطعة صار من الممكن تسليم محصول كل مكر (قطعة) للصنع كوحدة قائمة بذاتها . وبهذا الخصوص يود المؤلف أن يعرب عن تقديره لمدير مصنع كوم امبو المسيو فافر ، وكذا وكيل شركة أراضي كوم امبو المسيو س . مزارح وذلك لتعاونهما الصادق ومباشرتهما لتسلم عربات قصب التجارب في كلامن المصنع والحقل .

ويلاحظ أنه وضع في ست قطع من كل تجربة ، فوسفات ، كما أن الست الأخرى لم يوضع بها ، فمثلا كانت المساحة في كل من قطع المقارنة والقطع الأخرى المعاملة (المسمدة) فدان واحد تماما حيث أن كل تجربة كانت مساحتها فدانين ، أي أن مجموع المساحة في الأربع القطارات كان ثمانية أفدنة .

### أنواع التربة وتحضير الأرض وزراعتها :

لقد تم اختيار أنواع التربة المختلفة للتجارب في مختلف القطارات تحت إرشاد مسيو مزارح . ففي نظارة سبعة قبلي ونظارة بحري كوم امبو ، كانت الأراضي المتخربة خصبة جدا ، غريبة ، ثقيلة ومتجانسة وفي النظارة الأولى كانت التربة أكثر تجانسا ، وفي نظارة شرق الزعامة ، كانت التربة خصبة طينية غريبة متجانسة ، بينما أقيمت تجارب نظارة العباسية في تربة غير متجانسة (كيميائية وطبيعية) طينية مدموكة جدا (قرموط) وأقل في مجموعها عن متوسط الخصب بالنسبة لكوم امبو .

وقد كان تدبير الأرض والزراعة والرى مطابقا في كل الحالات (للتجارب المسافات ٣٦) وذلك فيما يخص بكل نظارة ولا لزوم لاعادة التفاصيل هنا . ويمكن أن يقال أن حلقة هذه العمليات الفنية في كوم امبو لم تترك شيئا ناقصا ، وأكدت الحصول على معلومات جديدة بكل ثقة .

### التأثيرات المرئية للفوسفات على القصب النامي :

من الابتداء قد أظهرت قطع تجربة السبعة قبلي — حيث حصل على أحسن نمو للقصب — مختلفا واضحة في اللون ، فقد كان اخضرار القصب في القطع المسمدة بالفوسفات ، أدكن من القطع المسمدة بالأزوت وحده ، وكذا فقد كان ظاهرا أنها أسرع نموا أيضا ، حتى حاول شهر مايو حيث ظهر هذا الحقل التجريبي كوح شطرنجي مساحته

فدانان ، بداخله مربعات ذات ألوان متعاقبة من أخضر داكن الى أخضر مصفر ، وكان الأخير أقصر من القطع المسمدة بالفوسفات بمتوسط ٦ — ٨ بوصات . وبحلول النصف الأخير من يونيو ، بعد التسميد الأزوتي الثاني ، صار اختلاف اللون أقل ظهورا ، وبعد شهر آخر ظهر جميع القصب بلون أخضر داكن متناسق ، حيث كان قد أعطى له آخر دفعة من تروسلات الأمونيا بمعدل ١٠٠ كيلوجرام للفدان . فهذا دليل إما على قلة المدح من حمض الفسفوريك ، أو أن قابليته للاشتغال به أبطأ في هذا النوع من الأرض عن الأراضي الأخرى تحت التجربة ، أو أن الدفعة الأولى من الأزوت احتوت على جزء أكبر من مجموع ما أعطى للفدان وهو ٨٥ كيلوجراما زيادة على ١٣١ كيلوجراما التي أعطيت بالفعل في أول دفعة ، حيث إنه في منطقة العباسية بينما كان هناك فرق طفيف جدا في اللون فقد تلاشى سريعا ، كما أنه في النظارين الآخرين لم يشاهد مطلقا أي فرق في اللون أو النمو بين القطع المسمدة بالأزوت وحده ، وباقي القطع المسمدة بالأزوت والفوسفات معا ، ولم تذكر هذه المشاهدات بعناية عند فحص النتائج التفصيلية للمحصول المذكور في جداول رقم ٣ و ٤ و ٦ و ٧ .

### طرق الحصاد والحصول :

لما قطعت التجارب (في التواريخ المبينة في الجداول الخاصة بكل تجربة كان يعمل جميع المال في قطعة أو قطعتين سويا ، وذلك بعد قطع قصب النطاغات وتحديد كل قطعة بمفردها ، وابتدئ في تحميل القصب من كل قطعة في عربات ديكوفل خاصة بينما كان القطع جاريا في باقي القطع . ولم يترك أي جزء من القصب من أي قطعة لم يعمل أيفضي التابل في الحقل ، أي أن قصب كل مكر كان يعمل دائما في عربات ذات نمو خاصة ويشحن الى المصنع في نفس مساء يوم الحصاد . وقد خصص أناس معينون واسطة كذا الشركتين للإشراف على تحميل القصب في عربات خاصة لذلك ، وإرسال القطارات واستلامها في المصنع ، وكذا الإشراف على عمليات الوزن والحصير والتجليل . ويجب تهيئة هؤلاء الرجال ورؤسائهم على دقتهم وكفاءتهم على عمليات التسليم الدقيق لمساحة عظيمة من قصب هذه النباتات الكبيرة بدون الوقوع في أي تعقيد أو خطأ .

٢ - قصب السنة الثانية - حصد في ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٥

نمرة القطع ٤	محصول القصب للقطعة فقط	محصول الفدان طن	نسبة السكر %	النقاوة	السكر في الفدان كجم
أزوت	١١٣٥٦٨	٥١٠٢	١٢٠٨٨	٨٣٠	
أزوت + فوسفات	١١٤٦٥٤	٥١٠٥١	١٢٠٦٧	٨٢٥	

٣ - متوسطات السنتين :

أزوت	١٢١١٣٩	٥٤٤٢	١٢٠٨٢	٨١٧	٥٥٨٣
أزوت + فوسفات	١٢٠٨٣٢	٥٤٢٤	١٢٠٨٢	٨١٧	٥٥٦٥

جدول رقم ٤

تجربة السوبر فوسفات في العباسية

١ - محصول السنة الأولى (بكر) حصد في ٣٠ مارس سنة ١٩٣٤

(١) أزوت فقط

١	١٠٩٩١ +		١٥٠٣	٨٦٠
٣	١٨١١٦		١٤٨١	٨٦١
٥	١٥٠٧٥		١٤٠٦	٨٥١
٧	٢٢٣٥٦		١٢٩٤	٨١٠٩
٩	٢٢٥٠٢		١٤٥١	٨٦٣
١١	٢٢٥٥٦		١٣٨٥	٨٤٦
متوسطات	١٢٠٧٢٦	٥٤٢٤	١٤٢٠	٨٥١

لما جهزت هذه التجارب للحصاد ، لاحظ المسو مزارع أن كميات كبيرة من القصب كانت قد سرت من القطع الخارجية رقم ١ ورقم ٦ ومع أن القصب الذي حصد من هذه القطع أعطيت أرقامه في الجدول إلا أن هذه القطع حصدت عند حساب إنتاج الفدان الواحد ، أي أن متوسط المحصول للفدان بحسب من الحصة القطع التي لم تحس في كل حالة . ويشكر المؤلف المسو مزارع على ملاحظته الدقيقة للتجارب في أثناء نموها .

جدول رقم ٣

تجربة الاسميد الفوسفاتية في بحري كوم امبو

١ - قصب السنة الأولى (البكر) حصد في ١٧ مارس سنة ١٩٣٤

(١) أزوت فقط

نمرة القطع	محصول القصب للقطعة فقط	محصول الفدان طن	نسبة السكر %	النقاوة	السكر في الفدان كجم
١	١٩٦٢٢		١٢٣٩	٧٧٨	
٣	٢٢٢٧١		١٢٩١	٨٠٠	
٥	٢٢٧٣٣		١٢٥٠	٨٠٢	
٧	١٩٣٥٥		١٢٧١	٧٩٨	
٩	٢١٣٩١		١٢٢٨	٨٣٥	
١١	٢٢١٢٨		١٢٧٠	٨١٤	
متوسطات	١٢٨٧١٠	٥٧٨٢	١٢٧٥	٨٠٠٤	

(ب) أزوت وسوبر فوسفات

٢	٢٢٧٤٧		١٢١٥	٧٨٨	
٤	٢٠٩٣٨		١٣٦١	٨٢٠	
٦	٢٠٧٦٠		١٢٥٢	٧٨٦	
٨	٢١٤٤٤		١٣٥٤	٨٣١	
١٠	٢٠٦٤٤		١٣١٨	٨٢٤	
١٢	٢٠٤٧٧		١٢٨٤	٨١٣	
متوسطات	١٢٧٠٩٠	٥٧٠٦	١٢٩٧	٨٠٠	

(ب) أزوت وسوبر فوسفات

نمر القطع : ق	محصول القطن	محصول القطن بالطن	نسبة السكر	القارة	السكر في القطن
٢	١٤٩,٣٨		١٤,١٨	٨٥,٥	
٤	٢١٩,٤٢		١٤,٩٥	٨٦,٨	
٦	٢٠٥,٩٦		١٣,٧٤	٨٤,٨	
٨	٢١٨,٣٦		١٣,٣١	٨٣,٦	
١٠	٢١٢,٨٤		١٣,٧٦	٨٥,٠	
١٢	٢٠١,٧٥		١٢,٦٥	٨٢,١	
المتوسطات	١٢١,٢٩٠	٥٤,٤٩	١٣,٧٦	٨٤,٦	

٣ - محصول السنة الثانية حصد في ١٩ فبراير سنة ١٩٣٥

أزوت	١٠٤,٦٧	٤٦,٧٥	١١,٨٧	٨٠,٥
فوسفات	١٠٩,٩٣٩	٤٩,٣٩	١١,٥٣	٧٩,٧

٣ - متوسطات السنتين

أزوت	١١٢,٣٩٧	٥٠,٤٩	١٣,٠٤	٨٢,٨
فوسفات	١١٥,٦١٥	٥١,٩٤	١٢,٦٥	٨٢,٢

جدول رقم ٥

تجربة السوبر فوسفات في شرق الرغامة

١ - محصول السنة الأولى (البكر) حصد في ٢٤ مارس سنة ١٩٣٤

(أ) أزوت فقط

نمر القطع (٤ فراط)	محصول القطن بالكيلو جرام	محصول القطن بالطن	نسبة السكر	القارة	السكر في القطن
١	١٩٢,٩		١٣,٧٤	٨٣,٣	
٣	١٨٠,٠٤		١٤,٠٤	٨٤,٣	
٥	١٨١,٥٦		١٣,٦٢	٨٣,٢	
٧	٢٠٥,٦٤		١٤,٠٨	٨٤,٠	
٩	١٥٩,٧٨		١٤,٦٣	٨٤,٦	
١١	١٥١,٨٢		١٣,٦٥	٨٣,٢	
المتوسطات	١٠٧,٠٩٣	٤٨,١١	١٣,٩٦	٨٣,٨	

(ب) أزوت وسوبر فوسفات

٢	١٨٢,٥٣		١٣,٥٧	٨٣,٢	
٤	٦٠,٥٨٢		١٣,٢٣	٨١,٧	
٦	١٥٦,٢٠		١٣,٤٣	٧٩,٤	
٨	١٩١,٩٦		١٤,١١	٨٤,٦	
١٠	١٨٥,٤٧		١٣,٥٣	٧٢,٦	
١٢	١٣٣,٥٦		١٤,٢٢	٨٤,٢	
المتوسطات	١٠٥,٦٥٤	٤٧,٤٦	١٣,٥١	٨٢,٦	

٢ - محصول السنة الثانية حصد في ٢٨ مارس

أزوت	١٠٨,٦٨٧	٤٨,٨٣	١٣,٧٢	٨٣,٢	
أزوت + فوسفات	١٠٩,١٤٠	٤٩,٣	١٣,٩١	٨٣,٢	

٢ - محصول السنة الثانية حصص في ٢٨ يناير سنة ١٩٣٥

نمرة القطع (٤ فترات)	محصول القطعة	نسبة السكر في القند	الفاوة	السكر في القند	بكم
أزوت	١١٦٤,٥٤	٥٢,٣٢	١٠,٩٦	٧٧,٩١	
» - فوسفات	١٢٨٢,١٧	٥٧,٦٠	١٠,٧٤	٧٦,٩٦	

٣ - متوسطات السنتين

أزوت	١٢٩٢,٨٣	٥٨,٠٨	١٢,١٧	٨٠,١	٥٥٨١
» - فوسفات	١٤١٣,٣٣	٦٣,٤٩	١١,٦٧	٧٨,٩	٥٨٥٤

محصول كل قطعة مكررة في السنة الثانية

القطع	١٤٢	٣٤٤	٥٤٦	٧٤٨	٩٠١٠	١١٤١٢	محصول القند
أزوت فقط	١٨٧,٠٢	١٩٨,١٢	١٩٨,١١	١٩٧,٥٦	١٨٩,٠٧	٢٠٢,١٦	١١٦,٤٥
» وفوسفات	٢٠٩,١١	٢١٠,٨٤	٢١٧,١٦	٢١٢,٨٤	٢٢٠,٧٥	٢١١,٤٧	١٢٨,٢٢
الزيادة الناتجة من الوضع ... ..	٢٢,٠٩	١٢,٢٢	٢٨,٠٥	١٥,٢٨	٣١,٦٨	٨,٣١	١١٧,٩٦

النتائج السلبية في الثلاث النظارات :

لقد كانت نتائج تجارب نظارات بحرى كوم امبو ، والعباسية ، وشرق الزغامة متشابهة عمليا ويجب مناقشتها جميعا هنا . وبلا حظ ان السكر والفاوة في القصب زادا بتأخر الحصاد في كلا محصولي السنة الأولى والثانية ( البكر والخلفة ) . ففي سنة ١٩٣٤ كان ترتيب الحصاد على التوالى : بحرى كوم امبو ، فشرق الزغامة ، فالعباسية ، وتمشت صفات محصول القصب مع هذا الترتيب ، بينما في سنة ١٩٣٥ كان ترتيب الحصاد : العباسية أولا ، ثم بحرى كوم امبو ، ثم شرق الزغامة ، متمشيا مع المتوسط لدرجات القصب الذى تحسن كلما تأخرت تواريخ الحصاد . وهذا يؤكد ثانية قولنا المتكرر ( ٣٦ ) أنه يظهر أن طول فصل النمو هو أهم عامل مؤثر في درجة القصب في المناطق المدارية حتى الآن . وبينما سبنا الحصاد حتما بطول فصل النمو - اذا بقى هذا العامل ثابتا على ما هو عليه - فان كمية المحصول التى نحصل عليها ستبين لنا مباشرة حالة الأرض وغذاء النبات والرطوبة .

٣ - متوسطات السنتين

نمرة القطع (٤ فترات)	محصول القطعة	نسبة السكر في القند	الفاوة	السكر في القند	بكم
أزوت	١٠٧٨,٩٠	٤٨,٤٧	١٣,٨٤	٨٣,٥	٥٢٦٦
أزوت + فوسفات	١٠٧٣,٩٧	٤٨,٢٤	١٣,٧١	٨٢,٩	٥٢٩٢

جدول رقم ٦

تجربة السور بر فوسفات في السبعة قبل

١ - محصول السنة الأولى ( بكر ) حصص في ٣ أبريل سنة ١٩٣٤ :

١ - أزوت فقط

٢	٢٣٥,٨٧	١٤,١٤	٨٥,٦
٤	٢٣٩,١٦	١٣,١١	٨٢,٤
٦	٢٣٧,٧٢	١٤,١٣	٨٤,٦
٨	٢٤٢,٤٠	١٢,٩٤	٨٢,٤
١٠	٢٢٤,٢٢	١٣,٩٨	٨٣,٥
١٢	٢٤١,٧٣	١١,٩٨	٨٠,٠
المتوسطات	١٤٢١,١١	١٣,٣٨	٨٣,٠

ب - أزوت وسور فوسفات

٢	٢٤٩,١٦	١٣,٠٢	٨١,٢
٣	٢٤٧,٣	١٣,٤٩	٨٣,١
٥	٢٦٢,١٣	١٢,٢٩	٨١,٨
٧	٢٥٥,٧٣	١٢,٥١	٨٠,٦
٩	٢٦٥,٣٨	١٢,٣٣	٨٠,٥
١١	٢٥٢,٣٦	١٢,٠٠	٧٩,٥
المتوسطات	١٥٤٤,٤٩	١٢,٦٠	٨١,١

## (ب) أزوت وفوسفات

العنصر	مجموع الفوسفات في الفدان		السكروز	النسبة المئوية	السكر في الفدان
	طن	قنطار			
كروم أبو بحري	١٢٠٨٣٢	٥٤٢٤	١٢٣٨٢	٨١٥٧	
عباسية	١١٥٦١٥	٥٠٩٤	١٢٣٨٥	٧٢٥٣	
شرق الزعامة	١٠٧٣٩٧	٤٨٢٤	١٢٣٧١	٨٢٠٩	
المتوسطات	١١٤٦١٥	٥١٣١٧	١٢٣٠٦	٨٢٠٣	٥٣١٩

ويلاحظ أيضا أنه بينما أعطت قطع المقارنة متوسطا متساويا للحدود ، أدنى من القطع المسمدة بالفوسفات بكمية لا تذكر احصائيا ، وهي ثلث طن من الفوسفات للفدان فإن صفات قصب قطع المقارنة تتفوق على قصب القطع الفوسفاتية ، ولو بدرجة لا يمتد بها إلا أنها كافية لأن تعطي قطع المقارنة زيادة غير احصائية بمقدار ٣١ كيلو جراما من السكر للفدان . وأيضا لم تظهر إضافة حمض الفوسفك لك أي تأثير على نضج القصب ، بل سبغت من هذه الوجهة تماما .

وتتفق هذه النتائج تماما مع تلك التي حصل عليها مستر . روش في نوع حادى بعد مدة طويلة ، وعلى جملة أصناف مختلفة من القصب . الذي يكون من المستحسن أن تذكر بعض مستخلصاته التي نشرت في رسالة حديثة له (٣١) :

” قد يتأثر القصب قليلا أولا يتأثر بوضع سماد الفوسفات بمفرده . على الرغم من قلة احتواء التربة على خامس أكسيد الفوسفور ، ويتأثر قليلا فقط بحالات اختلاط الفوسفات مع الأزوت . ولكن لو تأملنا أن مصر قد أنتجت محاصيل وافرة من القمح منذ فروع عدة بدون استعمال الفوسفات وهو المحصول الذي يحتاج لفوسفور أكثر كثيرا من القصب . فإنه ينبغي ألا ندهش بالنسبة لتأثير خامس أكسيد الفوسفور الطفيف على القصب . ومن المعقول جدا أن يقال إن هذا المنصر ، ولو كان وجوده بكمية متوسطة . يجب أن يكون على حالة جاهزة تماما “ .

### نتائج السبعة قبل الإيجابية :

إن تحاليل جدول رقم ٦ — التي توضع النتائج التفصيلية لتجارب نظارة السبعة قبل . والتي يجب أن نذكر أن تربة هذه النظارة كانت أحسن الترات ، وأن تعريض التربة في القطع المسمدة بالفوسفات فيها كان جليا جدا وثابتا — لتظهر فرق احصائيا وميلا دائما نحو ارتفاع المحصول في كل قطعة سمدة بالفوسفات .

ويأخذ أرقام محصول السنة الأولى أولا ، يلاحظ أنه لا توجد فروقات احصائية مطافا بين نتائج المعاملتين ، لا في وزن المحصول ولا في صفاته ، للقصب الناتج في أى نظارة من هذه الثلاث النظارات . وفي بحري كوم أبو أعطت القطع التي سمدة بالفوسفات محصولا أقل بمقدار ١٧ قنطارا للفدان عن قطع المقارنة ، وهي كمية غير معترف بها احصائيا بينما كانت درجة القصب الناتج عن القطع المسمدة بالفوسفات أحسن من درجة القصب الناتج عن قطع المقابلة بنحو لا يعتد به . وفي شرق الزعامة ، كانت هنالك فروق لا تذكر في صالح قطع المقابلة تشبه الفروق التي أشرنا إليها ، بينما في العباسية — حيث كان هنالك رد فعل بسيط أو بالأحرى زائل بالنسبة للون — قد أنتجت القطع المسمدة بالفوسفات خمسة قناطير من القصب أكثر من قطع المقابلة وذلك بالنسبة للفدان ، ولكن قصب هذه القطع ( المقارنة ) كان أعلى بمقدار نصف درجة في كل من السكروز والذخاوة . وبمعنى آخر فنإبلى أن النتائج التي حصل عليها من الثلاث تجارب في السنة الأولى كانت سلبية ، وتظهر أنه لا حاجة للتسميد الفوسفاتي تحت الظروف السائدة هنالك .

وقد كانت نتائج السنة الثانية ومتوسط النتائج السنوية للسنتين في الثلاث نظارات ، مشابهة جدا لتلك . ولكن لم تكن هنالك أية حالة تبين منها أن درجة الذخاوة في القصب الناتج من القطع المسمدة بالفوسفات كانت أعلى من القصب الناتج من المقارنة . وبذا كان المتوسط السنوي لنتائج السكر من الفدان ( زيادة عن ٥ ربيع طن في كل حالة ) للقطع المسمدة بالأزوت فقط في جميع الثلاث التجارب أعلى دائما بقليل من القطع المعاملة ( بالفوسفات ) ، ومع أن هذا الفرق لم يكن احصائيا في أى حالة إلا أنه يبين أنه لا ضرورة لإضافة حامض الفوسفريك لهذه الأراضي تحت الظروف العملية السائدة . والجدول الآتي رقم ٧ يبين ملخص موجز لمتوسط النتائج السنوية لهذه الثلاث تجارب :

### جدول رقم ٧

متوسطات سلبية لمخولين في ثلاث تجارب سلبية

### (١) أزوت فقط

العنصر	مجموع الفوسفات في الفدان		السكروز	الذخاوة	السكر في الفدان
	طن	قنطار			
كروم أبو بحري	١٢١١٣٩	٥٤٢٤	١٢٣٨٢	٨١٥٧	
عباسية	١١٢٣٩٧	٥٠٩٤	١٢٣٨٥	٨٢٠٨	
شرق الزعامة	١٠٧٨٩٠	٤٨٢٤	١٢٣٨٤	٨٢٠٥	
المتوسطات	١١٣٨٠٩	٥١٣١٣	١٢٣٢٣	٨٢٠٧	٥٤١٠

## الملخص

هناك إيضاح تجريبي قليل أولا بوجود قطعي ، ما يثبت الفكرة الشائعة جدا وهي أن في استعمال الأسمدة الفوسفاتية بكثرة لابد وأن ينتج عنه فصب أكثر بهرط النظر عما تحتويه التربة التي يزرع بها الفصب من خامس أكسيد الفوسفور ، ولو أنت باحثين كثيرين في هاواي وجزائر الفلين وبورتوريكو وجزر الهند الغربية ... الخ أثبتوا النجبة الإيجابية من وضع هذا العنصر في التربة التي وجد أنت عدم كفايته ( نقصه ) فيها هي العامل المحدد في ميزان غذاء النبات .

وقد لا يحصل الكاتب في خلال دراسات سنين كثيرة على هذا الموضوع في المناطق المدارية على نتائج إيجابية اقتصادية من وضع الفوسفات لأراضي الفصب الرسوبية المشابهة لأراضي الوجه القبلي ، وكذا فإن سلسلة تجارب طويلة بالأرجنتين ولو يربانا أعطت نتائج سلبية باضطراد .

وقد أجريت أربع تجارب متشابهة في سنة ١٩٣٣ في أكثر ما يمكن من النظارات وأنواع الأراضي المختلفة التابعة لتفتيش كوم امبو الواسع ، وكانت مساحة كل تجربة فدانين وضع في واحد منها كبريت من سور فوسفات الكلسيوم ١٦٥ / زيادة ١٤ يعطى له عادة من السماد الأزرق . وقد عمل على انتخاب أنواع التربة التي تمثل سلسلة كاملة متدني باضعف التربة وتنتهي إلى أعظمها خصبا في المنطقة ، وذلك في نظارات تجري كوم امبو والعباسية وشرقي الرغامة والسبعة قبل .

وقد لوحظ من البداية اللون الداكن وسرعة النمو لفصب المسعدة الفوسفات عن قطع المقارنة في نظارة السبعة قبلي حتى يحلول شهر مايو ظهر الحقل كأنه لوحة شطرنجية . وكان اختلاف اللون جليا جدا لغاية آخر يوليو . وكان هناك تغير طفيف جدا في اللون في نظارة العباسية زالك مريعا بينما لم يلاحظ أي فرق في اللون في النظارتين الأخرتين .

وقد كانت النتائج في كل النظارات عدا نظارة السبعة قبل حيث كان اختلاف اللون واضحا جدا مطردة أطرادا سلبيا بينما في هذه النظارة الأخيرة أعطت القطع الفوسفاتية في كلا من قصب السنة الأولى ( حيث أعطت هذه القطع متوسطا فياسيا لاجصول الذي بلغ ١٥٥٠ فنتارا من القصب للفدان ) وقصب السنة الثانية ( الحقة ) زيادة تامة عالية عن قطع المقارنة بما يزيد عن ١٢٠ فنتارا للفدان .

وقد كان أعلى محصول في كل قطعة من قطع المقارنة أقل احصائيا من أقل محصول نتج عن أي قطعة عولت بالفوسفات ، وذلك في كلا محصولي السنة الأولى والثانية . بينما القطع المعاملة ( بالفوسفات ) اتجنت متوسطا يفوق المحصول العظيم — الذي ربما يكون قد فاق الرقم في حالة محصول السنة الأولى — الناتج من قطع المقارنة ، بمقدار ٥٥ طن في الفدان . وبينما نجد أن القطع التي سميت بالفوسفات في هذه الثلاث تجارب السابق شرحها لم تنتج في أي حالة محصول سكر يعادل الناتج من المقارنة بالنسبة للفدان ، فإنا نجد أن تلك القطع في نظارة السبعة قبل اتجنت متوسطا سنويا من محصول السكر أعلى بمقدار حوالي ٣ أكتاس للفدان من احسن ناتج من قطع المقارنة .

أما بخصوص تأثير الفوسفات على العصارات ، ولو أن فروق اللون مختلفة في قصب التجارب دلت على بعض النقص الفوسفاتي ( في الكمية أو درجة الاستفادة ) في التربة ، لم يكن هناك دليل ما على ما هو معروف من تأثير حامض الفوسفوريك على الضجج ، إذا ما حصلد الفصب في فصل جيد كما في سنة ١٩٣٤ ، أو بدريا جدا ، كما يتبين ذلك من تحليل سنة ١٩٣٥ . وبينما كانت الفروق في السكر والفاوة صغيرة جدا حتى لا يمكن اعتبارها احصائية فإن قصب قطع المقارنة كان أعلى بمقدار ١٢٦٠ درة في متوسط السكر والفاوة على التوالي . من قصب القطع المعاملة بالفوسفات .

## النتائج

يظهر أنه ما من شك هناك أنه بينما معظم أراضي القصب بالوجه القبلي لا تعطي نتائج إيجابية اقتصادية بوضع الأسمدة الفوسفاتية بها ، فإنه يتوقع أن نوع أرض تجربة نظارة السبعة قبل وما عاظها قد تعطي محصولا أوفر باستعمال هذه الأسمدة في صورة مضرة . وليس الحال هنا ، بل هو في حالة تقرير المنهاج السابق الأزرق . حيث لابد للزراع أن يتوصل إلى المتوسط الاقتصادي الكمية السماد التي توضع ( ٣٧ ) من هذا العنصر الضروري دائما . وقد يتحمل ضرورة الاتجاه إلى التسديد الموضعي في تلك الأراضي القليلة التي يوافق وضع حمض الفوسفوريك بها . ومن المحتمل أيضا أن توالى تغير اللون الذي لوحظ في تجارب نظارة السبعة قبل قد يتبع منه باتخاذ كطريقة بسيطة تمكنا من التقرير تقريبا إذا كان وضع مثل هذه الأسمدة مريح أو غير مريح . ولا تزال هذه النقطة تدرس يتوسع — كثيرها من النقط الأخرى مثل العلاقات الداخلية بين الوضع وكيسة السماد التي توضع من اللازوت وكذا حالة توازن اللازوت وخامس أكسيد الفوسفور في التربة — في المطاعنة ولوى مثلها درست في كوم امبو

## BIBLIOGRAPHY

- (1) AGER, H. P.—Fertilization for Soil Amendment and Maintenance. Repts. H.S.P.A. Anl. Mtg., L. Indu., 1931.
- (2) BOONER, G.—Gooit de suikerindustrie geld weg bij de toepassing Van kunstbemeisting. Arch.v.d. Skringd. Ned. Ind., 1933. No. 15, pp. 501-12.
- (3) BROWNE AND BLOIN.—Chemistry of Sugar Cane and its Products. La. Agr. Expt. Sta. Bull. 91, 1908.
- (4) BOWLES, SIDNEY J.—Fertilizer Recommendations for Sugar Cane. Sug. Bull., XI, No. 13, pp.5-6, 1933.
- (5) CONNOR AND ABBOT.—Unproductive Black Soils. Ind. Agr. Expt. Sta. Bull. 157, 1912.
- (6) DEERR, NORL.—Cane Sugar. Ludn., 1921.
- (7) DODDS, H. H.—The Manuring of Sugar Cane. Empire Jn. Exptl. Agr., I, 4, 1933. Notes on Some Fertilizer Experiments Harvested in 1934. Proc. Anl. Cong. Sou. Af. Sug. Technols. Assn., IX, Durban, 1935.
- (8) EARLE, F. S. Sugar Cane and its Culture. N.Y., 1928.
- (9) FERNANDEZ GARCIA, R. Informes Anuales de la Seccion de Química, Estn. Oxptl. Ins. de P. Rico, Informes Anles, 1924-5 and 1927-8.
- (10) FISKE AND SUBBUROW. Colorimetric Determination of Phosphorus. Jo. Biol. Chem., LXVI, 1925.
- (11) FRAPS, G. S.—Availability of Phosphoric Acid of Soil. Jour. Amer. Chem. Soc., XXVIII.
- (12) GRACIE, KHALIL AND ENAN. An Analysis of the Factors Governing the Response to Manuring of Cotton in Egypt. Min. Agr., Tech. Bull. 152, Cairo, 1935.
- (13) HEDLEY AND BEATER.—Absorption of Plant-Foods by Sugar Cane. Proc. Anl. Cong. Sou. Af. Sug. Technols. Assn., VII, 1933.
- (14) KERR, H. W.—Farm Fertility Trials. Qnsld. Bur. Sug. Expt. Stas., Farm Bulls. 1 and 3, 1931 and 1932.

ولم يكن هناك أى دليل في ية تجربة من هذه التجارب على ماهو مفروض من تأثير حامض الفوسفريك على النضج وذلك من تحاليل المصارة حيث كان الميل نوعا نحو انحطاط طفيف في محتويات السكر ولو أنه غير هام احصائيا .

والنتيجة التي وصلنا إليها ، هي أنه بينما معظم أراضي القصب بالوجه القبلى لا تحتاج لوضع حامض الفوسفريك بها فإنه يتوقع أن نوع الأرض الذى تمثله نظارة السبعة قبلى يهبط نتيجة مرضية باستعمال قليل من هذه الأسمدة ويظهر أن التسميد الموضعى قد يكون نافعا مع الأسمدة الفوسفاتية ويصير من الجائر الانتفاع من تغير اللون الذى لوحظ في تجارب السبعة قبل باتخاذ اختبارا حقيقيا بسيطا يمكننا به الحكم عما إذا كان وضع مثل هذه الأسمدة مريح أم لا .

وهذه النقطة الأخيرة لازالت تدرس بتوسع كغيرها من النفط مثل العلاقات الداخلية بين زمن الوضع وكمية السماد التي توضع من الأسمدة الأزوتية وكذا حالة توازن الأزوت — خامس أكسيد الفوسفور في التربة ، في المطاعنة وملوى مثابا درست في كوم امبو .

(31) ROCHS, R.—Report on Soil Work from Egypt. Cong. Intl. Soc. S. Cane Technol., IV, Bull. 100, 1932.

(32) ROSKINFELD, ARTHUR H.—Ensayos con Abonos. Rev. Indst. y Agr. Tucuman, II, 1911, and V, 1915.

(33) *do.* —La Estacion Experimental de la Sociedad Nacional Agraria de Peru. Lima, 1926. *Ibid* de Java. Bol. Un. Panamericana, No. 68. Wshgton., 1930.

(34) *do.* —Results of Some Co-operative Fertilization Tests. Sug. Bull. VI, 15, 1928; VII, 9, 1929; VIII, 11 and 16, 1930; IX, 9 and 18, 1931. Fertilizer Experiments in Louisiana. Intl. Soc. Sug. Cane Technol., IV, Bull. 95. Sn. Juan, 1932.

(35) *do.* —Wasteful Sugar Cane Fertilization. Intl. Sug. Jour. XXXV, 1933.

(36) ROSKINFELD, ARTHUR H.—Optimum Sugar Cane Planting Date in Egypt. Min. Agr. Tech. Bull. 150, 1935. The Spacing of Sugar Cane in Egypt— and Elsewhere. *Ibid*, 164, 1930.

(37) *do.* —The Manurial Requirements of Sugar Cane in Egypt. *Ibid*, 173, 1936.

(38) RUSSELL, E. J. Plant Nutrition and Crop Production. Univ. Cal. Press, 1926.

(39) SAINT, S. J.—Reports of Agr. Chemist. Repts. Dept. Sci. and Agr. Barbados, 1928-31. Manurial Experiments on Sugar Cane, 1928-1932. Agric. J. Barbados, Act., 1932.

(40) SPENCER, G. L. Handbook for Cane-Sugar Manufacturers. N.Y., 1917 *et seq.*

(41) STUBBS, W. C. Cultivation of Sugar Cane. N. Orlns., 1900.

(42) TURNER, P. E. Manurial Experiments with Sugar Cane. Trop. Agr. IX, p. 177, 1932, and X, p. 60, 1933.

(43) VANSTONE, E. Available Phosphate in Soils. Jour. Agr. Sci., XV, 1925.

(44) VERRET, J. A.—Effect of Phosphoric Acid and Potash on Quality of Cane. Haw. Pltrs. Rec., XXVII, 1923.

(45) WILLIAMS AND FOLLETT-SMITH.—Field Experiments with Sugar Cane. Br. Guiana Dept. Agr. Bull. 1, 1933.

(15) KLINGE, GERARDO.—Politica de Irrigacion. La Vida Agricola, XII, 1935.

(16) LEE, H. ATHERTON.—Annual Reports of Director of Resch. Proc. Anl. Conv. Philipp. Sug. Assn., 1928-30.

(17) *do.* —Fertilizer Constituent Tests. Sug. News, X, pp. 1-4, 1929.

(18) LOPEZ DOMINGUEZ, F. A.—Sugar Cane Soil and Fertilizer Research in Peru. Proc. Cong. Intl. Soc. S. Cane Technol., IV, Bull. 78. S. J., 1932.

(19) MAZÉ, P.—Influence, sur le Développement de la Plante, des Substances Minérales Résidus d'Assimilation. Compte Rendu, CXXVIII, 1899.

(20) MARTIN, J. P.—Sugar Cane Growth in Nutrient Solutions. Haw. Pltrs. Rec., XXXIX, No. 2, pp. 79-96, 1935.

(21) McALLEP AND BOMONTI.—Haw. Pltrs. Rec., XXVI, 136, 1922.

(22) MCCOOL AND WELDON.—Effect of Sodium Nitrate on Composition of Expressed Sap. Jour. Amer. Soc. Agron., XXII, 1930.

(23) McGEORGE, W. T.—Absorption of Fertilizer Salts by Haw. Soils. Haw. Expt. Sta. Bull. 35.

(24) *do.* —Study of Phosphates in Sugar Soils. H.S.P.A. Expt. Sta. Bul. 47, 1923.

(25) *do.* —Influence of Silica, Lime and Soil Reaction on Availability of Phosphates. Soil Sci., XVII, 1924.

(26) McNAUGHTON, E. J.—Conocimiento Científico de la Nutricion de Vegetals. La Henda., XXX, pp. 365-8, 1935.

(27) MITSCHERLICH, E. A. Physical Properties of Soils and Crop Yields (Trans. Tit.). Publ. Inst. Belge Amelior. Betterave, III, No. 3, pp. 93-102, 1935.

(28) MOIR, W. W. G.—The Plant Food Problem. Proc. 9th Anl. Mtg. Assn. Haw. Sug. Technol. Hndu 1930.

(29) *do.* —Hawaiian Soils and Fertilizer Research. Cong. Intl. Soc. S. Cane Technol., IV, Bull. 94. S. Juan, 1932.

(30) O'NEAL, HURST AND BREAUX.—Fertilizer Requirements of Sugar Cane on "Sandy Land." Sug. Bull., XII, No. 11, pp. 3-5. N. Orlns., 1st Mch., 1925.



باسماء الموظفين الفنيين التابعين لقسم تربية النباتات الذين  
في الدرجة السادسة فما فوق

أبحاث قصب السكر

# النشرة الفنية

رقم ١٩٥

تجارب على زرع قصب السكر

١٩٣٧ - ١٩٣٨

تأليف

جناب المستر آرثر هـ. روزنفلد

خبير زراعة قصب السكر سابقا

نقلها إلى العربية

عبد المجيد افندى القمري - قسم الدعاية والنشر

أوصت لجنة مطبوعات وزارة الزراعة بنشر هذه النشرة  
وهي ليست مسئولة إجماليا عن الآراء الواردة بها

دار الطباعة المصرية

سنة ١٩٣٩

تباع مطبوعات الحكومة بمصلحة البيع بوزارة المالية . أما المكاتبات الخاصة بهذه المطبوعات  
فترسل رأسا إلى قلم النشر بالطبعة الاميرية بولاق بالقاهرة

ثمان النسخة ٣٠ مليما

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| حضره يوسف شبتاي افندى .            | جناب الدكتور ج . بيلتوث .           |
| » البرونشتين افندى .               | » المستر س . هـ . روان .            |
| » محمد بدر الدين افندى .           | » » هـ . ا . حانكوك .               |
| » احمد احمد يوسف افندى             | » الدكتور ج . فيلب .                |
| » محمد عفيفي حسين افندى .          | » حضره أرمنالك بلديان افندى .       |
| » أحمد زكي أبو النجا افندى         | » محمد محمد الديب افندى .           |
| » رياض نجيب افندى .                | » الدكتور محمد علي الكيلاني افندى . |
| » محمد محمود صالح افندى .          | » محمود فائق افندى .                |
| » محمود فهمي الكاتب افندى          | » جناب المستر ف . دنكولى .          |
| » محمود عبد الباقي افندى .         | » حضره محمد عبدالله زغلول افندى .   |
| » محمد صادق افندى .                | » محمد سعيد أبو العطا افندى .       |
| » عبدالفتاح السيد عطا الله افندى . | » الدكتور روديع شرويم افندى .       |
| » فوزى ساوريس بسطا افندى .         | » محمد عبدالعزى القشيري افندى .     |
| » الدكتور حسيني ابراهيم المغيرة    | » عبدالحاميد جلال حموز افندى .      |
| » افندى .                          | » محمود جوهر افندى .                |
| » أحمد زكي عبد الجواد افندى .      | » أحمد منير افندى .                 |
| » سامي نظيف افندى .                | » عبد الحميد سويلم افندى            |
| » ابراهيم حمدي افندى .             | » عبد الغفار سليم افندى .           |

# المحتويات

## الصفحة

١	مقدمة
٤	الباب الأول : خير وقت لزرع القصب
٦	تجارب جديدة
٩	الريبع الشهيرة بملوى
١٢	و بالمطاعة
١٣	استنتاجات
١٦	الباب الثانى : تجارب المسافة في قصب السكر
١٧	النظام العام التجريبي
١٨	التجارب الأولى بالمطاعة وملوى
١٩	ملاحظات عارضة على تطبيقات الرى المتأخرة
٢٣	تجارب كوم امبو
٢٤	تجارب أخرى بملوى
٢٨	نتائج
٣٣	الباب الثالث : استعمال أطراف العيدان في الزرع
٣٤	تجارب في الجمهورية الفضية
٣٥	اختبارات في مصر
٣٨	نتائج

إن عوامل الزرع الثلاثة التي درست في هذه الفشرة — وهي ميعاد الزراعة وأفضل أبعاد للزراعة ونمط التقاوى — إنما هي أساسية للحصول اقتصادياً على إيراد جيد من زرع جميع المحاصيل الحولية في أية ناحية . ول هذه الاعتبارات أهمية قصوى في حالة قصب السكر فإن قيمته لا تتوقف على وزن المحصول الناتج لحسب بل أنها كذلك تتبع كثيراً كمية السكر الذي يحتويها وهذه الكمية بدورها تتأثر كثيراً خصوصاً في المناطق الشبه الاستوائية بطول موسم النمو والأحوال البيئية التي تميل إلى جعل النضج سريعاً بالضرورة في الموسم المبكر .

وفي الواقع أن إنتاج عيدان ذات وزن مرضي ومحتوية على مقدار جيد من السكر إنما هو في جميع المناطق الشبه الاستوائية مضمار ضد الوقت — ذلك لأن قصب السكر نبات يحتاج قياساً لتنام نموه ونضجه وقتاً أكثر بكثير من الوقت الذي يحتاجه في حالة توقف النمو أو تلف العود من جراء انخفاض درجات الحرارة . على أنه إذا كان موسم النمو ذا طول كاف لتقدم طبعي جيد ومعقول فإن هبوط درجات الحرارة سالفة الذكر في الخريف وأوائل الشتاء إذا اقترن بنقص في مقادير الرطوبة والأزوت الصالح يكون سبباً في النضج السريع ويجعل الزارع المصري قادراً كما تشهد به نتائج التجارب التي سيأتى ذكرها في الصفحات التالية على إنتاج محاصيل تضاهي كثيراً في المقدار والجودة محاصيل الجهات التي يزرع فيها القصب في المناطق الاستوائية (١)

هذا وبما أن فصل النمو لدينا كما تبين آنفاً محدود جداً طبيعياً وأنه لا يمكن للقصب الأقل تحسناً أن يترك موسماً آخر كما في المناطق الاستوائية ليزداد في الوزن والسكر. فمن الجلي أن كل ما يمكن عمله للانتفاع إلى أقصى حد بهذا الموسم القصير يزيد مادياً في احتمال الوصول إلى النجاح وقت قطع المحصول . وبما أننا لا يمكننا إطالة مدة التحسين متى حددت الطبيعة بانتهاء الموسم فمن الواضح أنه يجب زرع القصب مبكراً بما يكفي لجمعه باستفيد به بالنمو ، السريع جداً في جو الربيع .

(١) جناب المستر هـ . آرثر روزغولد — «مركتبة السكر» — المتوان لدى جمعية أفريقيا الجنوبية لرق العلم

أما من جهة المسافة فيلزم أن لكل نموذج من نماذج النبات والتربة والطقس يلزم بالضرورة وجود نهاية قصوى نظرية للغة الزراعية الممكن الحصول عليها — وبعبارة أخرى يجب أن يكون كل نموذج من التربة في أى طقس وفي أحوال كالية قادرة على إنتاج خير محصول من قصب كامل النضج مثلاً ولا يمكن الوصول إلى هذه النهاية القصوى إلا في خير الأحوال الجوية والرطوبة وكية الغذاء والزراعة — كما أنه لا يمكن الحصول على خير محصول إلا بعمل المسافة بين النباتات كافية بحيث تجعل كل نبات قادراً على الوصول إلى خير تقدم وعلى وحدة من المساحة تنتج أكبر عدد ممكن من عيدان كاملة التكوين — ويفهم من هذا أن قد تسفر المسافة القصيرة بين صفوف القصب لدينا عن وجود عدد كبير جداً من عيدان ناقصة التكوين قياسياً في حين أن قد تنتج المسافة الكبيرة جدا عيدان فردية فاخرة إلا أن قلة العدد لا تقوم بغلة وافية في الوزن لحسب كالفلة التي يمكن الحصول عليها من عدد النباتات القياسية التكوين — اللازم وجوده نظرياً بل أنه ينجم عنها تنبيه عظيم في إنتاج خلفه باستمرار (نبت قوى) تكون نتيجته صعوبة قطع محصول ذي متوسط معقول سناً<sup>(١)</sup> واحتواء على السكر — وقد أكد المؤلف الحالى مراراً حقيقة هي أن قطع مقدار كبير من هذه الشراذم المتأخرة Mamones في المناطق الشبه الاستوائية مهما جاد تكونها الطبيعي قد يكون أثره سيئاً في القصب لتأثيره في متوسط السكر ووزن القنوة كالأثر السيء للزراعة المتأخرة عن الموسم في الحقول.

وقد وصل الزارع المصرى باختباره إلى خير مسافة في حقوله القطنية وفقاً لما حدده أخيراً جنابا الدكتور لورنس بول<sup>(٢)</sup> و ج. تيلتن<sup>(٣)</sup> ودلت أبحاثنا على أنه قد وضع أساساً سديداً في تحديد المسافة للقصب تحديداً صحيحاً.

وبما أنه في أغلب المناطق الاستوائية يكثر استخدام الجزء العلوى من الساق للتفاوى فقد أجرينا بكم أمبو تجربة استخدمت فيها كتفاوى الأطراف التي تسببت عادة عند قطع المحصول كما أجرى ذلك في بعض اختبارات مماثلة منذ سنين في الجمهورية القبطية<sup>(٤)</sup>

1) How old is Ten - Months - old Cane? Facts about Sugar. xx, 1935  
2) Analysis of Agricultural yield. Phil. Trans., B., Vols. 206, 1915-16, & 208, 1918.

3) Watering & Sporing Excpets. with Egyptian Cotton. Min. Age, Tech. Bull. 112, 1932.

4) Rosenfeld, Arthur H.-Tops vs. Whole Canes for planting Sugar. N. Y., Jan., 1918.

وبالرغم من أن التجربة كانت كثيراً كشاهدة وأن الأطراف فقط كانت مستخدمة فإن النتائج فيها ما يمكن لتسويغ إجراء اختبارات جديدة يقارن فيها استخدام الثلث الأعلى للساق بدلاً من الأطراف الطرية فقط كتفاوى باستخدام السيقان بنهماها الجارى استعمالها بمصر.



## الباب الأول

### خير وقت لزراعة قصب السكر بمصر

قد ورد في نشرة بهذا العنوان في سنة ١٩٣٥ أن إنتاج قصب ذى محصول كبير الوزن وجيد الصفات في جميع المناطق الشبه الاستوائية يتوقف على الزمن بما أن موسم النمو قد حددته الطبيعة بصرامة وأن لا يمكن للقصب الناقص في التكوين أن يترك لمدة موسم آخر (١) ليزداد وزناً واحتواء على السكر كما هو متبع في المناطق الاستوائية .

وقد دلت التجارب التي أجريت في سنة ١٩٣٣-١٩٣٤ بالمطاعة وملوى التي فيها زرع القصب في أشهر متوالية من يناير إلى مايو ضمناً على أن المدة من منتصف فبراير إلى منتصف مارس هي خير وقت لزراعة القصب بمصر وأبانت النتائج القاطعة أن الزارع الذى ينتظر في زرع قصبه إلى منتصف مايو ( بعد أخذ محصوله الشتوى ) يحصل على غلة تقل عن الغلة التي يحصل عليها بترتيب دورته بطريقة يتمكن بها من الزرع في خير الوقت المقرر بجملة مئات من قناطير القصب عن الفدان .

فإذا كانت الفروق في الغلات الناتجة من محصول السنة الأولى منسوبة معظمها إلى وقت الزرع فاختلفت مباشرة تبعاً لطول موسم النمو (٢) يلزم حيثشأن أن لا توجد مثل هذه الفروق الظاهرة لإنتاجاً في محاصيل السنة الثانية ما دامت مواسم النمو متماثلة - وقد

(1) Rosenfeld, Arthur H. - Ministry of Agriculture Tech. Sci. Serv' Bull. 156.

(٢) قد بحث ل. د. كير L. D. Ckare في تأثير الأشواط المتأخر في تعداد القصب في الجريدة الزراعية لبيان البريقانية في المجلد الثامن - صفحة ٨٠ - يونيو سنة ١٩٣٧ واستخلص أنه من الواضح أن هذا التأثير يلزم أن يكون ناتجاً من أنه في وقت القطف يوجد مقدار كبير من السيقان غير ناضجة بالرغم من أن المحصول قد يكون معتبراً ناضجاً - وتكون النتيجة العملية نقص الثمن وقلة الغلة

وقع ذلك عند حصد محصول السنة الثانية لتجارب المطاعة في ٢١ فبراير و محصول ملوى في ٦ ، ٧ مارس سنة ١٩٣٥ ولم تكشف كلتا التجربتين عن فروق تذكر تعدادياً سواء في الغلة أو جودة القصب بالرغم من أنه في كلتا التجربتين وجد اتجاه ثابت نحو محصول حقلى وأعلى من القطع التي زرعت متأخرة منذ سنتين . وفى ذلك دلالة على وجود نمو جذرى أقوى في قصب الزراعات المبكرة - وتدل الأرقام الاجمالية التالية عن المحصولين بملوى بالجدول رقم ١ دلالة واضحة على صحة هذين الاتجاهين :

الجدول رقم ١  
التجربة الأولى للزرع الشهرى بملوى

مزرع في اليوم الخامس عشر من	قصب السنة الأولى - ١٩٣٤ (١)	قصب السنة الثانية - ١٩٣٥ (٢)
قناطير عن الفدان	قناطير عن الفدان	قناطير عن الفدان
المجموع : أقل من فبراير	المجموع : أقل من فبراير	المجموع : أقل من فبراير
فبراير ...	١٠٦٤	٩٦٠
مارس ...	١٠٠٤	٩٥٤
أبريل ...	٩١٠	٩١٩
مايو ...	٦٥٨	٩٠٠
المتوسط ...	٩٠٩	٩٣٣

(١) قطع في ١١ إلى ١٣ مارس (٢) قطع في ٦ ، ٧ مارس

وبحسن شرح هذه الأرقام باختصار - فبينما أنه في نتائج السنة الأولى كان كل نقص في الغلة بسبب تأخير الزرع من الأهمية القصوى يمكن ( تنظر الأرقام التفصيلية في النشرة رقم ١٥٦ ) وازداد شهرياً بتأخير الزرع - ففي قصب السنة الثانية لم تكن فروق الغلة بأى حال ذات أهمية تعدادياً بالرغم من وجود هذا الاتجاه الطفيف السالف ذكره . وهنا يجب أن

يذكر أن في حالة قصب السنة الثانية كانت الفروق في كل مرة أكبر منها في حالة محصول السنة الأولى - ومن هنا أثبتت مسألتنا خطأ التجارب ودرجة الاهمية تبعاً لذلك . على أن يلاحظ أن أكبر نقص في غلة قصب السنة الثانية يماثل أقل نقص في غلة قصب السنة الأولى.

### تجارب جديدة

بينما أن نتائج التجارب الأصلية كانت في الواقع مقنعة جداً فقد كان محققاً أنها تنطبق تمام الانطباق على نماذج التربة المستخدمة والأحوال الجوية التي كانت سائدة في المدة التي أجريت فيها . ولذلك تقرر ازدواج كلتا السلسلتين في نماذج من التربة مختلفة بأقامة اختبارات جديدة بمولى والمطاعة في سنين متعاقبة .

وقد أجريت تجارب مولى في تربة شجشج ( صفراء ) خفيفة نوعاً ومنتجات التركيب جداً ظاهرياً ولم يسبق زرعها قصباً مدة عدة سنوات . حرثت حرثاً جيداً طولياً وحرثت ثانياً عرضاً - بمحراث جرار - في ١٣، ٢٥ يناير سنة ١٩٣٥ نسيباً تم قصبت في أول فبراير وقسمت إلى أحواض في ٩ فبراير وأقيمت الخطوط وجعلت الأرض ست عشرة قطعة حسب الخريطة المرفقة بهذه النشرة وذلك في الأيام التي تلت . وقد سمحت هذه القطع جميعاً بسماد فوق فوسفات الجير و ( ١٦ ٪ من  $P_2O_5$  حمض الفسفوريك ) بمقدار ٢٠٠ كيلو جرام عن الفدان وزرعت أربع قطع بتقاوى من صنف P. O. J. ١٠٥ بالطريقة الرملية وذلك في ١٥ من كل شهر ابتداء من فبراير إلى مايو ضمناً

وعزقت جميع القطع ثلاث مرات كلما سمحت الحال وكانت قطعنا فبراير ومارس هما اللتان عزقتا الفرة الأخيرة في آخر مايو والقطع التي زرعت متأخرة عزقت في ١٠ يولييه وفضلاً عن مياه الزرع قد رويت قطعنا فبراير ومارس تسع عشرة مرة وقطع أبريل سبع عشرة مرة وقطع مايو أربع عشرة مرة فقط ورويت للمرة الأخيرة في ١٨ فبراير سنة ١٩٣٦ قبل البذر . في قطع المحصول في ١٤ مارس بثلاثة أسابيع ونصف أسبوع فقط - وقد سمحت جميع القطع بتراكم الجير ( ١٥ ٪ من الآزوت ) بمقدار ٣٠٠ كيلو جرام عن الفدان على ثلاث دفعات كانت الأخيرة منها للقطعة المزروعة في مايو متأخرة جداً بالضرورة

وقد ظهرت في مايو الفروق في الارتفاع والتكوين بين قطع فبراير ومارس في حين أنه في ٢٢ يولييه كانت زروع أبريل لم تزل دون الزروع المبكرة بكل وضوح وبخاصة قطع مايو . وفي نهاية موسم النمو لم يلاحظ وجود فرق كبير في الركيزة والارتفاع بين زروع شهر الثلاث قطع الأولى إلا أن زروع مايو كانت دون زروع الأخرى في تعداد

وشدة لغاية وقت قطع المحصول في منتصف مارس وكان النظام في قطع المحصول والأعمال الخاصة بالمحاصيل في مولى والمطاعة على مثال ما سبق وضعه تماماً في التجارب الأولى ولا يستعنا إلا أن نسدى أخلص الشكر للمرة الثانية لحضرات السادة الوارد ذكرهم في النشرة رقم ١٥٦ لاشتراكهم المعنى معنا والذي بفضل أمكننا القيام بكافة التفاصيل بهذه التجارب على النحو الذي سبق شرحه . هذا وإن نتائج التجربة الثانية بمولى قد فصلت بالجدول رقم ٢ تبسيطاً لظواهر النتائج لأنها لا تهملي الأولى في الاختبارين - ولم تذكر بيانات ومعمما متوسطات أرقام عن محاصيل السنة مطلقاً فروق تذكر تعدادياً في جودة القصب وينسب هذا بلاريب إلى طول موسم النمو وشدة شتاء عام ١٩٣٥ - ١٩٣٦ الاستثنائية .


## الجدول رقم ٢

تجارب الزرع الشهرية الثانية التي أجريت بحدوى قطعت حاصلها في ١٤ و ١٥ مارس سنة ١٩٣٦

الزيادة على مايو	الزيادة على مايو	متوسط تجارب سنة ١٩٣٤ و ١٩٣٦	الزيادة على مايو	القطعة من الددان		القيمة	القطعة (بهايات)	زرعت في
				أول من فبراير	المجموع			
٤٢	—	١١٠٤	٣٧	—	١١٤٤	٨٠٣٠ ٤٣١٠ ٤٣٣٠ ٩٠١٠	١ — ١ ٧ — ١ ١٠ — ١ ١٦ — ١	... ... ... ...
٤٢	—	١١٠٤	٣٧	—	١١٤٤	٨٣٦٠ ٨٣١٠ ٨٤٦٠ ٧٨٥٦	٢ — ٢ ٨ — ٨ ١١ — ١١ ١٢ — ١٢	... ... ... ...
٤٢	٧٤	١٠٣٠	١٧	٨٩	١٠٥٥	٧٩٤٤	... ... ...	... ... ...
٢٥	١٢١	٩٨٦	١٦	١٠٢	١٠٤٢	١٢٣٠ ٧٩٧٠ ٨١٩٠ ٨٠٦٠	٣ — ٣ ٥ — ٥ ١٢ — ١٢ ١٤ — ١٤	... ... ... ...
—	٣٢٥	٩٧١	—	٢٢٤	٩٠٠	٧٨٥٥ ٥٨٧٠ ٧٥٢٠ ٦٦٦٠ ٧٧٠٠	... ... ... ... ...	... ... ... ... ...

## تجارب الزرع الشهرية بملوى

إنتاج سقي ١٩٣٤ و ١٩٣٦ للقصب بالنظائر عن الددان



فبينما أتت جميع القطع بغلات عالية في محصول سنة ١٩٣٦ فإن ميل النتائج الى غلات واطنة بسبب قصر موسم النمو كان مماثلا لدرجة غربية لما تميل إليه أرقام سنة ١٩٣٤ كما يدل عليه المنحنى في الرسم البياني المرفق بهذه النشرة .

وقد أتت هذه الأرقام أيضا مؤيدة كل التأييد للضرورة الفاضية بالحقصول على أحسن النتائج من الزروع التي انتهت عملياتها في مدة لا تقل عن منتصف مارس . والفة التي قدرها ٥٠٠ قطار عن فقدان من القطع المزروعة في مايو إنما هي غلة جيدة للغاية بالنسبة لمديرية المنيا إلا أن قطع فبراير قد أنتجت زيادة في القصب قدرها ٢٧ ٪ وقطع مارس زيادة قدرها ١٧ ٪ . وهذا يدل للمرة الثانية على أن الزرع إذا أجرى عموما في أنسب وقت في منطقة القصب الشمالية فإن الوزن الذي يحصل عليه يوازي الوزن في المناطق الواقعة الى الجنوب — ذات الطقس الحار وإن نسبة زيادة غلة قطع فبراير عن غلة القطع المزروعة في مايو تبلغ في المتوسط نحو ٤٢ ٪ في محصولي السنتين الأوليين

أجريت تجارب المطاطة في سنة ١٩٣٦ و ٣٧ في زماء خارجا على أنصاف نماذج التربة تقريبا في حقول وزارة الزراعة<sup>(١)</sup> وهي تربة ضعيفة غير متجانسة ( طيعيا وكيميائيا ) — طيبة متساوية جدا فكانت تماما على قبض التربة الخصبة — الصفراء الخفيفة نوعا — المتجانسة التركيب تماما — وهي التي أقيمت عليها المجموعة الأولى من التجارب بالمطاطة — ولم : بت زرع القصب في هذا الحقل منذ عدة سنين والمحصول الذي كان قائما به هو القول

فبعد تصميم إجراء التجربة على هذا النوع الفقير جداً من التربة كان من المحقق تماما أن عدم انتظامه التام قد يجعل الخطأ التجريبي يتفاقم لدرجة تجعل النتائج غير كافية بأي تفصيل تعداديا — ذلك لأن جريسي وخلييل وعنان قد أبانوا بمجدارة في مؤلفهم : (Analysis of Factors Governing response to Cotton Manuring in Egypt)<sup>(٢)</sup>

• تفصيل العوامل التي تتسلط على رد فعل تسميد القطن بمصر ، عدم سداد التجارب في مثل هذه التراتب وأن الاختلاف الناشئ عن الخطأ كبير جدا لدرجة أن تأثير المعاملة لا يذكر تعداديا وأنه في الواقع لا يوجد اهتمام في إجراء التجربة ، على أنه بسبب أن هذه التجارب هي مشاهدات إلى حد كبير وأن في النتائج الغريبة للمجموعات الأولى شكاً وضحه

(١) بسدي أنؤلف ذكره لحضرة على أفندي فؤاد المفتش الذي كان منوطاً به العمل في هذا الحقل بالمطاطة لاشتراكه المتواصل في جميع الاطوار الخاصة بأعمال هذه التجربة

(٢) النشرة الفنية رقم ١٥٢ سنة ١٩٣٥ — وزارة الزراعة المصرية

الزارعون المجاورون وذلك بسبب أنها أجريت في تراتب تفوق متوسط تراتب المركز في الجودة إلى حد كبير قد تقرر انتخاب نموذج يكون حتما دون متوسط المنطقة لأقامة عليه تجارب سنة ١٩٣٦ - ٣٧ ثم عمل مجموعات سنة ١٩٣٧ - ٣٨ على نموذج متوسط من التربة ( هذا هو الجارى الآن بالمطاطة ) .

فكان تجهيز القطع وتصميمها وزرعها مماثلا عمليا للعمليات التي تقابلها والتي سبق شرحها في تجارب مايو سنة ١٩٣٥ - ٣٦ إلا أن الزرع كان بالطريقة الجافة في المطاطة وكان الري بطريقة البوغا ( الري بعد الزرع مباشرة ) وفي العادة إجراء الري في اليوم التالي وعزقت جميع القطع ثلاث مرات كما في مايو أيضا حيث ساعدت الأحوال على ذلك وقد عزقت زروع فبراير ومارس للمرة الأخيرة في ٢١ يونيو سنة ١٩٣٦ وزروع إبريل في أول يولييه وأما آخر القطع زرعاً فلم تعرق إلا في آخر الشهر .

ورويت زروع فبراير ثلاثا وعشرين مرة ونقص عدد الريات ربة في كل ذرة أعقبها وأعطيت الريبة الأخيرة في ١٥ يناير سنة ١٩٣٧ قبل قطع محاصيل التجربة بسبعة أسابيع على الأكثر — في ٣ مارس سنة ١٩٣٧ . وسمدت جميع القطع بنتر وسلفات النواشدر ( ٢٦ ٪ من الأزوت ) بمقدار ٣٠٠ كيلو عن فقدان على ثلاث دفعات متساوية كانت الأخيرة منها لزروع فبراير ومارس حيث طبقت في ٢٢ يونيو وهو أحسن وقت مبكر وكانت الدفعة الأخيرة لزروعات إبريل في ٣ يولييه في حين أن قد حل أيضا آخر هذا الشهر قبل أن تعطى الدفعة الأخيرة من السماد لقطع مايو .

ورغم المدوذا الكبير في التكوين بسبب اختلاف التربة السالف بيانه فقد لوحظ في مايو على العموم فرق في الارتفاع بين محاصيل القطع المزروعة في فبراير ومارس في حين أن قد ظهر في منتصف يولييه أن زروع إبريل إجماليا كانت لم تزل دون الزروع المبكرة وأن زروع مايو كانت على العموم أدنى من زروع إبريل — وهذا وفي حين أن هذه الفروق الواضحة كانت أقل ظهوراً قريبا من الجزء الأخير من موسم النمو فقد تمكن حضرة على أفندي فؤاد المفتش من التبليغ في نوفمبر أن ارتفاع القصب في القطع المختلفة تراوح من ٢٦ إلى ٣٦ متراً على حسب وقت الزرع ،

وقد فصلت نتائج قطع المحاصيل الذي أجرى في ٣ مارس سنة ١٩٣٧ في الجدول رقم ٣ وكذا متوسط الأرقام الخاصة بالمجموعة الثانية من التجارب بالمطاطة ( سنة ١٩٣٧ ) ويلي ( سنة ١٩٣٦ ) .



متوسطات التجارب الناتجة بالمطاعة وعلى وزن القصب بالتقارب عن القدران	أقل من فبراير	المتوسط	الحلاوة	تقاربات عن القدران		وزن القصب بالكيلو من القصب	القطع (متر من قصب)	زمن في ١٥ من
				أقل من فبراير	المجموع			
١٨	—	١١٠٧	١٤٢٧٥ ١٤٢٤٨ ١٥٠١٤ ١٤٢٣٣ ١٤٢٦٨ ١٤٢٨١ ١٣٥٥٧ ١٢٩٨٨ ١٥٠٢١	—	١٦٦١	٦٥٩٠ ٧٨٤٠ ٩٨٢٠ ٧٧٢٠ ٨٠٣٠ ٦٨٠٠ ٨٨٠٠ ١٢٢٠٠ ٥٥٠٠	١ — ٨ ١١ ١٤ المتوسط ب — ٥ ١٢ ١٥	فبراير فبراير فبراير فبراير فبراير مارس مارس مارس مارس
٩	٨١	١٠٢١	١٤٢٧٣ ١٥٠٢٤ ١٤٢٩٥ ١٣٢٨٠ ١٤٢٥٩	٨٧	٩٨٧	٧٣٨٠ ٦٦٧٠ ٦٥١٠ ٧٤٣٠ ٦١١٠	المتوسط ٣ — ١ ٩ ١٦	أبريل أبريل أبريل أبريل أبريل
٤	١٣٠	٩٨٧	١٤٢٦٢ ١٥٠٢١ ١٤٢٤٩ ١٣٤٥٠ ١٢٩٨١	١٥٨	١١١	٦٨٨٠ ٤٤٥٠ ٤٥١٠ ٣٧٨٠ ٦١١٠	المتوسط ٤ — ٧ ١٠ ١٢	أبريل أبريل أبريل أبريل أبريل
—	١٢٩	٩٢٨	١٣٤٧٧	٩٣	٩٧١	٧٢١٠	المتوسط	أبريل

ولم يكن من هذه النتائج ماله قيمة تذكر احصائيا كما كان المتوقع من اختلاف التربة الواضح في حقل حوض المرحلة التي أجريت فيها هذه التجارب إلا أن الاتجاه العام سائر في طريق التجارب السابقة من ناحية وقت الزرع في نماذج من التربة أكثر تجانسا فيمكن إذا اعتبارها حقا مؤيدة لها على الأقل . وقد أسفرت زرع فبراير نهائيا عن قصب أحسن غلة وحلاوة ( احتواء على السكر ) بدرجة طفيفة من ذلك في القطع المتأخرة زرعا فدل القصب المزروع في مايو على حلاوة أقل بدرجة ظاهرة منها في أية زراعة من الزراعات المبكرة

### استنتاجات

قد يؤدي فحص متوسطات المجموعة الثانية من تجارب المطاعة وملوى الى أحسن ما ينظر من زروعات القصب المتبرر ظاهريا أنه زرع في أنسب الأوقات فيما بين منتصف فبراير ومارس الى آخر وقت يتنظر وهو وقت الزرع في مايو . فهذه تسير في اتجاه مشابه لاتجاه النتائج المتحصلة من المجموعة الأولى ولكن لدرجة أقل وتكون الخلاصات هي الحصول على غلات كبيرة الى أقصى درجة من قصب السكر في الأحوال المصرية اذا كان الزرع في المدة من منتصف فبراير الى منتصف مارس وتكون النسبة المثوبة للربح الذي ينتج من زرع مايو أقل بطبيعة الحال إذ أن موسم النمو تقل مدته في حالة الزرع المتأخر

وهذه الاستنتاجات تؤيد تأييداً تاماً إذا درست نتائج محاصيل قصب السنة الأولى في مجموعتي تجارب التخطيط ملوى التي شرحت في الباب الخاص بمسافات القصب من هذه القشرة — من حيث وقت الزرع في كلتا هاتين المجموعتين — وقد أعيدت تجارب المسافة مرتين في كل شيء . وهي التجارب التي أجريت في سنة ١٩٣٣ ، ٣٤ ، وسنة ١٩٣٥ ، ٣٦ . ناس عدم النظام المدبر في نماذج من التربة مماثلة جداً ومعاملة في الاستنبات مماثلة كثيراً في جميع المراحل — عدا أن المجموعة المبكرة لم تزرع لغاية ٩ مايو في حين أن المجموعة الثانية وضع تصميمها في ١٨ مارس والجدول رقم ٤ يبين متوسط الأرقام عن محاصيل السنة الأولى نسبياً ( قطع كلا المحصولين في منتصف مارس ) .

ويرى من ذلك أن القصب المزروع في مارس أنتج غلة أوفر من غلة القطع التي كان زرعها متأخراً بمقدار ٣٤٦ قنطار من القصب وأكثر من ١ طن من السكر عن الفدان وقد أدرج في نشرتنا الفنية السابقة<sup>(١)</sup> في هذا الموضوع خطاباً من جناب المستر ديمنج Demulling مدير مصنع السكر بأبي قرقاص فيه بيان التحاليل التيسية التي أجريت في يناير سنة ١٩٣٤ للقصاب التي زرعت تعمل ملوى في مارس وأبريل ومايو وبينت أرقامها الصحيحة بالجدول رقم ٦

### الجدول رقم ٦

تحاليل قصب أبي قرقاص في أعمار مختلفة

مزرع في	الحلاوة (النسبة المئوية للسكر في القصب)	النقاوة	نسبة الجليكو (النسبة المئوية المحولة) (للسكر)
مارس	١٢٣٧٢	٨٧ر١	٤ر٠
أبريل	١١٣٣٤	٨٤ر١	٩ر٥
مايو	١٠٣٦٢	٧٩ر٣	١٠ر١

وقد يمكننا أن نأني بأحسن خلاصة للاستنتاجات التي وصلنا إليها خاصة بتجارب وقت الزرع بوجه عام بالاستشهاد بملاحظات جناب المستر ديمنج Demulling الخاصة بهذا البحث وهي : —

١. إن القصب الذي يزرع في الوقت المناسب إنما هو قصب يفوق كثيراً ذلك القصب الذي يزرع متأخراً. وفضلاً عن ذلك فإن القصب الذي يزرع في مارس يكون أطول ارتفاعاً وأكثر سمكاً من الذي يزرع في أبريل ومايو. ويؤخذ من هاتين الحقيقتين أن الزرع في الأوان ذو قيمة كبيرة لدى كل من الزارع والصانع وقد تعود الفائدة مادياً على الصناعة إذا أحيط بجميع زراع القصب علماً بهذه النتائج .

### الجدول رقم ٤

مقارنة الزرع المبكر بالزرع المتأخر في تجارب التخطيط بملوى قصب السنة الأولى

المحصول		مزرع	وزن القصب بالقناطير عن الفدان	البيانات الكيميائية	وزن السكر بالكيلو جرام عن الفدان		
		الغلة	النسبة المئوية للزيادة	الحلاوة	نسبة الجلوكوز	النقاوة	النسبة المئوية للزيادة
١٩٣٣-١٩٣٤	مايو	٨٣٧		١٠ر٨٢	٧٥ر٥	١٠ر٤	٢٧٠٨
١٩٣٥-١٩٣٦	مارس	١١٥٢	٣٨	١٢ر٨٢	٨٣ر٧	٥ر٣	٥٨٤٩
							١١٦

ومن الثابت أن نسب أكبر جزء من الزيادة العظيمة للغلة وقدرها ٣١٥ قنطار من القصب وأكثر من ثلاثة أطنان من السكر عن الفدان في محصول سنة ١٩٣٦ عن محصول سنة ١٩٣٤ إلى أنسب أوقات الزرع كما تحدد بالتجارب التي سبق أن أجريتها في المجموعة الثانية من اختبارات المسافة . والواقع أن هذه الغلات النسبية تتمشى مع الاتجاهات المبينة في التجارب الأولى التي أجريت بملوى خاصة بالزرع الشهري كما نوضح في الجدول رقم ١ - بمقارنة زروعات مارس ومايو الموضحة بعاليه فصل إلى ما هو مدون بالجدول الصغير رقم ٥

### الجدول رقم ٥

تجارب الزرع الشهرية بملوى

١٩٣٣ - ٣٤

مزرع في يوم		وزن القصب بالقناطير عن الفدان		وزن السكر بالكيلو جرامات عن الفدان	
١٥ من شهر	الغلة	النسبة المئوية للزيادة	الغلة	النسبة المئوية للزيادة	
مايو	٦٥٨		٢٤٠٢		
مارس	١٠٠٤	٥٣	٣٩٢٨	٦٤	

(الآخران هما القائمان بأعمال حتى المطعنة وملوى على التعاقب) (١). وذلك لاشتراك حضراتهم جميعاً ممناً اشتراكاً فعلياً في القيام بهذه التجارب في مراحلها العديدة

## النظام العام التجريبي

كان القصب الذي استخدم في جميع الحالات من الصنف المصري الحالى القياسي وهو ١٠٥ P. O. J. (٢) وقد أوردنا في صدر النشرة الفنية رقم ١٦٤ السالف ذكرها نصيباً نموذجياً غير مدبر لتجارب المسافات - وفي جميع تجاربنا قد اتخذت مساحة قدرها أربعة أقدام أو سدس فدان تماماً قياساً بالكرات الفردية كما سبق بيانه في تلك النشرة - ذلك لأن القطعة التي هذه مساحتها تنتج من القصب ما يكفي لسد طلمات المعامل بدون تعقيد أو تعطيل لأعمالها ويسمح بمصير كل القصب الناتج من تكرار وهذا يتفادى ذلك العامل المعقد أو بالأحرى ذلك العامل المبني على الغرض المحض ألا وهو الحصول على عينات مثله.

وقد جعل نظام قطع المحاصيل قياسياً أيضاً فكان يقطع كل يوم محصول عدد من القطع سبق تحديده. فتركز العمال جميعاً في قطعة واحدة ويعمل ناتجها على متون فوج من الجال أو على عربات الديكوفين بالسكة الحديدية (يكوم امبو) دون أن يسمح بتحميل أى قصب من القطع الأخرى. ولا يترك أبداً محصول أية قطعة ليلاً دون أن يعمل جميعه بمعنى أنه يعمل في عربات السكة الحديد وينقل الى معمل السكر ليلاً بعد التقطع حتى يمكن مقارنة جميع البيانات. ولا يجوز مدبرو المعامل باستشارتهم فيما يخص تنظيم الشرح ونسليمه فحسب بل أن كل منهم يبين مساعداً خاصاً لاسلام القاطرات المشحونة قصباً ووزنه ومراجعتهم ومراقبة العصر وأخذ عينات العصير والتحليل وما الى ذلك - فلم

(١) ويسدى المؤلف جزيل الشكر لحضرة الدكتور محمد على الكيلاني - معمم البيانات بالوزارة - وحضرات مساعديه سام افندى نظيف ، نجار افندى ، رشاد غنار افندى اقيام حضراتهم بمساعدات قيمة - ويعترف - لولا الاراء السديدة والاشتراك المشجع الذي قام به حضرات هنرى نرس بك مدير معمل السكر بأوسنت - ود بلنج بأبي قرقاص ، فافر بكوم امبو - لاستحلال الوصول إلى البيانات الكميائية الصحيحة البالغة جد الكمال من الدقة ولقلت نتائج هذه التجارب اهمية

(٢) انظر النشرة الفنية رقم ١٦٨ - مصر - سنة ١٩٣٦ - وزارة الزراعة - تأليف المستر ارنر روزنفلد - اختبارات وزن بعض اصناف مستوردة من قصب السكر

## الباب الثانى

### تجارب المسافة في قصب السكة

ورد في النشرة الفنية رقم ١٦٤ (١) لوزارة الزراعة بحث للسك تجارب التي أجريت على نطاق واسع وأعيدت خاصة بمسافات القصب في ملوى والمطاعة وكوم أمبو به بيان تفصيل للعلومات المتعلقة بالمحصول فردياً وإجمالياً عن قصب السنة الأولى الذي قطع في سنة ١٩٣٤ وقصب السنة الثانية الذي قطع في ١٩٣٥ وكانت النتيجة التي حصل عليها أن لم يكن في هذه الأرقام ما يكون من وراء تغيير الطريقة القياسية المتبعة في مصر عملياً بأى حال وهي زرع تسعة من خطوط القصب في كل قصتين ( مايقرب من ٨٠ سم ) بين الخطوط وهي الطريقة التي توصل إليها الفلاح بالتجربة بنفسه الدقة الاعتبارية التي توصل بها تدريجياً إلى معرفة أفضل مسافة في زرع حقوله القطنية (٢)

وتتولى هذه النشرة بحث قصب السنة الثالثة للتجارب الست الأصلية والسنتين الأوليين لمجموعة جديدة من تجارب شرع فيها بملى سنة ١٩٣٥ .

ولا يسع المؤلف إلا أن يقرر أنه مدين بالشكر لحضرة صاحب العزة حسين بك عنان السكرتير العام لوزارة الزراعة ( الذي كان وقتئذ مديراً لقسم الزراعة الفنية بالوزارة خلال السنين الأولى لهذه التجارب ) - ولحضرة صاحب العزة عبد الفتاح نور بك المدير الحالى لهذا القسم - ولحضرات حسن افندى خليفة وعلى افندى فؤاد ومحمد محمود افندى المفتشين

1) Rosenfeld, Arthur H.- The Spacing of Sugar Cane in Egypt and elsewhere. Cairo, 1936.

2) Templeton, J.- Watering and Spacing Expts. with cotton. Min. Agr. Tech. Bull. 112, 1932.

الخطوة الكبرى مع ملاحظة أنه يتعذر وجود أية عقبة في سير كافة الأعمال اليومية المتنوعة الخاصة بتسليم مقدار جسيم من العينات التي تؤخذ من آلاف الاطنان من القصب - وفي هذا دليل واضح على كفاءة معاملهم . وتفاديا لوقوع أى التباس بقدر المستطاع لا يشحن قصب خلاف قصب التجارب الناتج من حقول وزارة الزراعة أثناء قطع محاصيلها .

### التجارب الأولى بالمطاعنة وملوى

قد أجريت كل من التجارب الأولى في تربات صفراء خفيفة نوعا ذات تر متجانس تماما على ما يظهر وذلك في حقول وزارة الزراعة المختصة بها .

وقطع محصول قصب السنة الثانية بالمطاعنة في ٢٢ فبراير سنة ١٩٣٥ وأعطيت الأولى (الحلفة) بعد ذلك بشهر أى قبل موعد إعطائها في السنة السابقة أربعة أسابيع وأعطيت ربة ثانية بعد ذلك بأربعة عشر يوما وحرثت أواسط الخطوط حرثا تاما في خلال الأسبوع الأخير من ابريل وأعيدت إقامة حدودها وما إلى ذلك ، قبل الوقت الذى بدى فيه بزرع هذه القطع في سنة ١٩٣٤ بزمان طويل . وفي أول مايو كانت أول تطبيقه من السماد ( ١٠٠ كيلو جرام من النترو سلفات النشادر عن كل فدان ) موافقة للرربة الثالثة وقد أعطيت التطبيقان الساديتان الثانية والثالثة بنفس هذا المقدار في ٢٢ مايو وأول يولييه على التعاقب . وبلغ مجموع الريات في جميع القطع سبعا وعشرين رية كانت الأخيرة منها في ١٧ يناير سنة ١٩٣٦ قبل قطع المحاصيل في آخر هذا الشهر بأسبوعين فقط . هذا وبالنسبة إلى نقص مركز محصول السنة الثالثة نقصا كبيرا بمقارنته بمحصول السنة الثانية التي لم يكن العرق فيها ضروريا فقد عزقت خطوطا في منتصف يونيه ولم يمكن تبين فروق ثابتة في أى وقت من أوقات السنة سواء في المحصول أو ارتفاع وقوة القصب الذى زرع على مسافات مختلفة

وأعطيت الربة الأولى لقصب السنة الثالثة بملوى في منتصف ابريل سنة ١٩٣٥ وفي ٢٥ منه سمدت جميع القطع بفوق فسقات الجير بمقدار ١٠٠ كيلو جرام ( ١٦ ٪ من حمض الفسفوريك ) عن الفدان وحرثت أواسط وعزقت الخطوط . وبفضلا عن فوق الفسقات سمدت جميع القطع بترتات الجير ( ١٥ ٪ من الأزوت ) ثلاث تطبيقات متساوية

باعتبار ٣٠٠ كيلو جرام عن الفدان وعزقت للربة الثانية في الأسبوع الأخير من مايو وكانت المرة الأخيرة في ١٠ يونيه سنة ١٩٣٥ - وعدد الريات خمس عشرة رية كانت الأخيرة منها في آخر نوفمبر ١٩٣٥ فتم نضج القصب عند قطعه في ١٢ مارس سنة ١٩٣٦

### بعض ملاحظات عارضة على تطبيقات الري المتأخرة

أعطيت الربة الأخيرة لقصب السنة الثانية في هذه التجارب متأخرة عن موعدها في قصب السنة الثالثة بأكثر من شهرين وبمجرد النظر إلى التحاليل الكيميائية المبينة بالذئبة الفنية رقم ١٦٤ (١) يرى الفرق العظيم في الجودة بين القصب المروى ربا متأخرا المقطوع في سنة ١٩٣٥ وقصب السنة الثالثة الذى لم يرو ربا متأخرا في سنة ١٩٣٦ كما ينضج من الجدول رقم ٢ في هذا الباب وبأخذ متوسط الأرقام عن كل من هاتين السنتين استطلعنا الوصول إلى المقارنة الطريفة الآتية :-

#### الجدول رقم ١

تأثير الريات المتأخرة في جودة القصب بملوى

المحصول	أجل القصب	الري المنقطع	وزن القصب	الملاحة في القصب	النقاوة	مقدار الخليجوز	وزن القصب
من الفدان	من الفدان	من الفدان	من الفدان	من الفدان	من الفدان	من الفدان	من الفدان
١٩٣٥	السنة الثانية	أوائل فبراير	١٠٠٨	١١ ر ٨٤	٧٩ ر ٤	٨١	٤١٣١
١٩٣٦	السنة الثالثة	أواخر نوفمبر	١٠٥٥	١٣ ر ٥٨	٨٥ ر ٠	٥٣	٥٩٣٥

وقد لاحظ المؤلف مايلي عند بحث نتائج سنة ١٩٣٤ - ٣٥ الموضحة بالذئبة الفنية

رقم ١٦٤<sup>(١)</sup> التي ذكر فيها أن محاصيل السنة الثانية في تجارب المسافة قد رويت أربع عشرة مرة وأن الريبة الأخيرة لم تعط لغاية أول فبراير سنة ١٩٣٥ :-

و يحتمل كذلك أن نقص السكروز والنقاوة النسبية في قصب ملوى ( ومقادير الجليبيكوز التي تزيد بقدر ثلاث مرات عنها في قصب السنة الثانية الذي قطع مبكراً في المطاعنة ) الموضح بالجدول رقم ١١ قد يرجع جزئياً إلى إعطاء ماء الري متأخراً

ومن الغريب أن هذا الاستنتاج التجريبي يؤيده الجدول الصغير رقم ١ السالف الذكر وكذلك تنأيد الفائدة التي يمكن الوصول إليها من تأخير ماء الري بتقصير الفترات بين الريات حتى تم هذه الريات كلها في فصل الصيف مدة موسم نمو المحصول وفي الواقع لا يوجد في أشهر الشتاء نمو القصب لقرب الضج فلا يحتاج إذاً إلا لقليل جداً من ماء الري . أما قصب السنة الثالثة فقد أعطى رية واحدة وزيادة على السنة الثانية في هذه التجارب إلا أن الفترات قد تعدلت بطريقة جمعت جميع الريات تتم في الوقت الذي يمكن فيه الوصول إلى أقصى حد في التقدم من التطبيقات جميعها . وإن المؤلف واثق من أن أكثر الفترات التي تنكبد في ربي القصب شتاء إنما هي خسارة أكيدة تقع على كاهل الزارع المصري ولا نتيجة لها إلا نقص في الجودة دون أية زيادة تعوض ذلك في كمية إنتاج القصب عن الفدان كما في حالة تطبيق المحاصيل متأخراً ومقادير متجاوزة الحد وإننا نكرر في هذا المقام أن اقتصاد جنيهه هو اكتساب جنيهه .

ولدينا في هذه الحال النتيجة الحارقة لإعادة محصول السنة الثالثة حيث أنتج من السكر ١ ١/٢ طن للفدان أكثر من محصول السنة الثانية الجيد فكانت الزيادة ٤٤ ٪ ويرجع جزء كبير جداً منها إلى الوقت الملائم الذي أعطى فيه المياه . فهذه أرقام قيمة في الواقع

\*\*\*

وقد بينت بالجدول رقم ٢ متوسطات نتائج حصاد السنة الثالثة تفصيلاً عن قصب المطاعنة في آخر يناير وعن تجارب ملوى في منتصف مارس سنة ١٩٣٦ . وكذلك نتائج الثلاث المحاصيل الخلفيتين .

## الجدول رقم ٢

تجارب التخطيط الأصلية بالمطاعنة وملوى

عدد المحلوط من كل قصبين ( ٧٦١ م )	وزن القصب بالمقطار عن اعداد قصب السنة الثالثة المتوسط ١٩٣٦ ثلاثة محاصيل	الحلاوة النقاوة	مقدار الجليبيكوز السنة الثانية فسكروز في الحلاويكوز
قصب السنة الثالثة	اولا - المطاعنة	حصاد	١ - ٢ - ٣
٨ ( ٩٠ سم )	٩٤٩ ١٠٠٨	١٣٥٨٦	٨٦٠ ٣٢٦
٩ ( ٨٠ )	٩٢٩ ١٠١٩	١٣٥٨٩	٨٥٩ ٣٢٦
١٠ ( ٧٥ )	٩٦٠ ١٠٣٩	١٤٤١٧	٨٦٧ ٣٢٥
قصب السنة الثالثة	ثانياً - ملوى	حصاد	٣ - ١٢ - ١٩٣٦
٨	١٠٤٦ ٩٥٤	١٣٥٤٥	٨٤٨ ٥٢٧
٩	١٠٤٨ ٩٧٧	١٣٥٩٨	٨٥٣ ٥٢٣
١٠	١٠٧٠ ٩٦٩	١٣٥٣١	٨٥١ ٥٢٠
ثالثاً - المتوسطات السنوية للتجارب مجمعة ( ستة محاصيل )			
٨	٩٩٨ ٩٨١	١٣٥٩٥	٨٣٧ ٥٢٧
٩	٩٨٩ ٩٩٨	١٣٥٠٩	٨٣٨ ٥٢٦
١٠	١٠١٥ ١٠٠١	١٣٥٨٥	٨٣٨ ٥٢٩

وتدل نتائج السنة الثالثة في كل من ملوى والمطاعنة على أن أضييق مسافة قد أنتج أحسن النتائج لدرجة طفيفة كما في حالة قصب السنة الثانية<sup>(١)</sup> إلا أن الفروق صغيرة ( فكانت أقصى درجة أقل من ١ ١/٢ طن من القصب عن الفدان ) إلى حد أنها تعد خطأ تجريبياً فلا تذكر إحصائياً بأية وسيلة إلا في أنها لا تدل كذلك على أية فائدة اقتصادية من جراء تعديل المسافة القياسية في القصب المصري التي هي تسعة خطوط عن كل قصبين . وتدل متوسطات السنة المحاصيل ( القسم الثالث من الجدول رقم ٢ ) على زيادة ضئيلة لا يعتد بها في غلة القصب ( فإن أقصى درجة بين ٩٠ سم و ٧٠ سم . تأتي بأقل من طن من القصب

## الجدول رقم ٣

تجارب التخطيط بكم امبو — نتائج تخصبة للأربع التجارب

عدد المحطوط من كل هكتار (٠ م ٧ ١)	وزن القصب بالقنار من القدان		الحصول	النسبة المئوية للسكروز في القصب	مقدار الجليكوذ
	قصب السنة الثالثة	متوسط ثلاثة محاصيل	الفسادة	الفسادة	النسبة المئوية للسكروز في القصب
قصب السنة الثالثة	أولا — كرم امبو بحري	حصد	١١ — ١٣	١٤ — ١٦	١٧ — ١٩
٨	٩٤١٠٠٧	١٠٦٣٠٣٩	١٣٠١٥	٨٤٠٥	٣٠٤
٩	٩٩١٠١٢	١١٢٨٠١٤	١٤٠١٠	٨٤٠١	٣٠٦
١٠	٩٣٤٠٦٠	١٠٨١٠٨٣	١٣٠١٤	٨٤٠٣	٣٠٨
١١	٩٢٩٠٣٦	١٠٨١٠٦٨	١٤٠١٠	٨٤٠١	٣٠٤
قصب السنة الثالثة	ثانياً — العباسية	حصد	١١ — ١٣	١٤ — ١٦	١٧ — ١٩
٨	٨١٩٠٨٨	٩١٦٠٠٣	١٣٠١٤	٨٤٠١	٣٠٦
٩	٨٨٣٠٣٢	٩٦٥٠١٧	١٣٠١٩	٨٣٠٦	٣٠٦
١٠	٨٩٢٠٦٨	٩٩٨٠٧٩	١٣٠١٥	٨٤٠٩	٣٠٣
١١	٩٠٥٠١٠	١٠٣٠٠٦٤	١٣٠١٣	٨٣٠١	٣٠٤
قصب السنة الثالثة	ثالثاً — صباح قبل	حصد	١١ — ١٣	١٤ — ١٦	١٧ — ١٩
٨	٩٦٣٠٦٠	١١١٣٠٩٩	١٣٠١٥	٨٣٠٤	٣٠١
٩	٨٩٦٠٧٨	١٠٦٥٠٧٩	١٣٠١٣	٨٣٠١	٣٠٦
١٠	٨٧٧٠٣٧	١٠٥٦٠٩٤	١٣٠١٩	٨٣٠٩	٣٠٦
١١	٩٠٥٠٦٤	١٠٨٤٠١٧	١٣٠١١	٨٣٠١	٣٠٣
قصب السنة الثالثة	رابعاً — رغامة شرق	حصد	١١ — ١٣	١٤ — ١٦	١٧ — ١٩
٨	١٠٧٧٠١٦	١١٠٣٠٦٣	١٣٠١٤	٨٣٠٧	٣٠٨
٩	١٠٠٦٠١٧	١١٠٣٠١١	١٣٠١٤	٨٣٠٤	٣٠١
١٠	٩٣٤٠٣٣	١٠٧٠٠٤٥	١٣٠١٥	٨٣٠٦	٣٠٩
١١	١١٣٣٠٦٥	١١٣٩٠٥٧	١٣٠١٥	٨٣٠٣	٣٠٩
ملامح — المتوسطات السنوية للتجارب جميعاً عن الثلاث السنوات (١٣ محصولاً)					
٨	٩٥٠٠٣٥	١٠٤٨٠٧٦	١٣٠٢٧	٨٣٠٩	٣٠٤
٩	٩٤٤٠١٥	١٠٦٨٠١٥	١٣٠٣١	٨٣٠٨	٣٠٦
١٠	٩٠٧٠٢٢	١٠٥٣٠٧٥	١٣٠٣٣	٨٣٠٩	٣٠٦
١١	٩٦٨٠٣٨	١٠٨٣٠١١	١٣٠١٧	٨٣٠٤	٣٠١

لقد ان في حين أن الفائدة التي تنتج من المحطوط الأضيق مسافة عن التسعة المحطوط القياسية عن كل قصبين تقل عن سبعة أطنان ( ذلك لأن المسافة بين كل خطين تصبح أقل في حين أن المسافة القياسية قد أسفرت عن عصور جيد من أقصى درجة إلا أنه لا يمتد به إحصائياً بأي حال .

### تجارب كرم امبو

وُضع تصميم هذه التجارب أصلاً في باكورة سنة ١٩٣٣ كما بيّنا في النشرة الفنية رقم ١٦٤ في أربعة أقسام مختلفة وبعبارة بعضها عن بعض وفي نماذج من التربة من أحسنها إلى أردأها في هذا التفتيش المتأمر الأطراف في صباح جبال وكرم امبو أقيمت التجارب في ترات في خصبة جداً صفراء غريبة متجانسة التركيب وكانت التربة الأولى تفوق الأخرى قليلاً لتجانس رغم أن الترتيبين كانتا من الدرجة الأولى في الجودة . وتربة الرغاما شرق صفراء طينية متجانسة التركيب وخصبة في حين أن تجربة العباسية أقيمت عمداً في أحد نماذج أفقر الترات في هذه الرارع وهي تربة غير قياسية ( كيميائياً وطبيعياً ) طينية وزائدة القاسم وخصبها دون المتوسط من أراضي هذا القار . هذا وتكرر الشكر لحضرة المحترم سلامون زراحي<sup>(١)</sup> مفتش كرم امبو ولصاحب العزة وبنيه فتاوى بك المدير العام وحضرة سيمون زجودون بالمكتب العام بالقاهرة لما أبدوه من الاهتمام والاشتراك الصحيح معاني جميع أدوار هذه التجارب من أول عهدها .

وكان زرع قصب السنة الثالثة خلال سنة ١٩٣٥ مطابقاً تقريباً للقواعد القوية المبينة بالنشرة الفنية رقم ١٦٤ عن السنين السابقة التي كان أساسها خير وقت مبكر لجعل موسم النمو بالغاً أقصى حد . في جميع الحالات كانت عروة ( محصول ) قصب السنة الثالثة قد اتخذت الخطوط كبيرة بالنسبة إلى المحصولات الأكثر تكبيراً كما تبين من أرقام محصول سنة ١٩٣٦ الموضحة بالجدول رقم ٣ رغم أن النتائج النسبية في كل تجربة كانت مشابهة لتلك النتائج التي توصلنا إليها في قصب السنتين الأولى والثانية كما أن الفروق البسيطة في الغلات لا يمتد بها إحصائياً

(١) قد تفضل أيضاً الأستاذ مزراحي بإمدادنا بالصور الضمنية المرسومة في هذه النشرة

وبمحص البيانات التفصيلية في القيم الخامس من الجدول رقم ٣ نجد أن أرقام الغلة المتحصلة في المسافات المختلفة قد زادت زيادة كبيرة في كل من قصب السنة الثالثة وفي متوسطات الأربعة المحاصيل مدة الثلاث السنوات . وأنه لا يوجد اتجاه محدود . فقد أتى الزرع في كلتا الحالتين بأكثر أوزان في المحصول كلما ضاقت المسافات ولكن في قصب السنة الثالثة فإن زيادة المسافة على المسافة القياسية وهي تسعة خطوط في كل قصبين تسفر عن نحو طن من القصب للفدان في حين أن متوسط الزيادة السنوية في خلال الثلاث السنوات كان أكثر من ثلثي طن ومن الناحية الأخرى قد أتى القصب المزروع على أضيق المسافات بأقل متوسط تقريباً في جودة العنبر بالرغم من أن هنا أيضاً لا يمكن اعتبار الفروق الضئيلة ذات أهمية إحصائية .

وعلى كل فإذا اعتبرنا النفقة الإضافية والمساوى المختلفة لغرس القصب وزرعه باعتبار أحد عشر خطاً على كل قصبين كما ورد تفصيل ذلك بصفتي ٣١ و ٣٧ من النشرة الفنية رقم ١٦٤ فإن الزيادة الطفيفة السنوية للغلة التي تنجم من زرع القصب على مسافات متقاربة تكون أكثر من النفقة رغم أنها مع ذلك لا يعتد بها . ولهذا السبب فالتنتيجة واضحة وهي أن هذه السلسلة الواسعة النطاق من التجارب لم تسفر عن وجود ما يبعث إلى تغيير المسافة القياسية في غرس القصب أى على ٨٠ سم ، بين الخطوط في أى نموذج من نماذج التربة يكوم أمبو

### تجارب أخرى ملوى

كما قد تقرر في بدء سنة ١٩٣٥ بعد المداولة مع حضرة محمد محمود أفضى المراتب وحضرنا موضح قسم الزراعة الفنية بوزارة الزراعة أن تمام تجربة جديدة عن المسافة بمحقل ملوى بنفس المواصفات التي اتبعت في التجربة الأصلية إلا في أن الغرس في هذه التجربة الجديدة يكون في أحسن وقت ذات عليه تجاربنا ... فكذلك كانت الأرض التي انتخبنا خفيفة متوسطة - صفراء متجانسة ظاهرياً - تشبه في الجودة تلك التي أقيمت عليها التجارب الأولى بالرغم من أن هذه التجارب أجريت في قسم آخر من ذلك المحقل

ومع أن الحرثة الأولى لم تتم في سنة ١٩٣٣ لغاية ٢٣ إبريل فأنها في هذه التجارب قد أجريت بطريقة متتوية في منتصف يناير وحرثت الأرض المرة الثانية وزحفت في الأسبوع الأول من فبراير سنة ١٩٣٥ وفي خلال الأسبوع التالي قسمت الأحواض وقسمت القطع

وخططت على المسافة للصحيحة وعنى بمراقبة ذلك وسمدت جميعها في أوائل مارس بغرق نصفات الجير ( ١٦ ٪ ) باعتبار ٢٠٠ كيلو جرام للفدان وفي منتصف هذا الشهر غرست قطع هذه التجربة بالطريقة الربطة قبل ميعاد الزرع في السلسلة الأولى لتجارب المسافة التي أجريت في سنة ١٩٣٣ بشهرين تقريباً - وقد نثر قليل من التراب في بطون الخطوط ثم رويت القطع في الأسبوع الأخير من مارس وأعطيت ثمان عشرة رية إضافية وذلك لغاية آخر نوفمبر سنة ١٩٣٥ ثم أعطيت الرية الأخيرة خفيفة ( عشرون رية في مقابل سبع عشرة رية في سلسلة التجارب الأولى ) بعد فترة قطهر الترع السنوية ( الجفاف ) وهي الفترة التي لا يتوفر فيها ماء الري بشهر أو ستة أسابيع وذلك في ١٨ فبراير سنة ١٩٣٦ قبل حصد محصول التجارب بشهر واحد تماماً . هذا ورغم أن التبريد في الزرع أضاف شهرين تقريباً إلى موسم نمو التجارب الجديدة زيادة على مدة موسم النمو في تجارب السلسلة الأولى للزرع فقد احتاج الأمر إلى ثلاث عزقات فقط مقابل أربع في التجارب المبكرة - وهو سبب كبير لزرع القصب مبكراً قبل أن تجد الحشائش والأعشاب الوقت الكافي للنمو - كانت الأولى في منتصف إبريل ( مقابل الأسبوع الأول من يونيه ) والأخيرة في الجزء الأخير من مايو سنة ١٩٣٥ مقابل ٢٢ يونيه في تجارب غرس القصب الأولى . خدمت القطع الخدمة النهائية في منتصف يونيه . وسمدت جميعها بثلاث الجير باعتبار ٣٠٠ كيلو جرام للفدان على ثلاث دفعات ، متساوية كانت الأخيرة منها في أنسب وقت وهو ٢٢ يونيه سنة ١٩٣٥ قبل الدفعة المقابلة لها في تجارب غرس القصب سنة ١٩٣٣ بخمسة أسابيع . ولم تشاهد فروق ثابتة في الانبات والارتفاع أى القوة العامة بين الزرع على المسافات المختلفة طوال موسم النمو في سنة ١٩٣٥

وبما أن القطع كان بها خلفه فقد رويت في خلال الأسبوع الأول من مايو ( وهو وقت متأخر على الأرجح ) وبعد ذلك بأسبوعين عزقت بطون الخطوط وفتحت الخطوط . وسمدت القطع بثلاث الجير باعتبار ١٠٠ كيلو جرام عن الفدان أى ٦٥ رطلاً من الأزوت إجمالاً مدة الموسم - على ثلاث دفعات كانت الأولى منها في ٣ مايو سنة ١٩٣٦ والثانية بعد ذلك بشهر والأخيرة في ٤ يونيه - وفتحت الخطوط في ١٠ يونيه ، وخدمت خدمة نهائية وأقيمت حراف القنوات والقطع ولم تكن هناك ضرورة إلى العرق أكثر من ذلك ، وأعطيت ست عشرة رية تمت الأخيرة منها في ٢٠ نوفمبر . ولم تظهر كافي حالة قصب السنة الأولى فروق ثابتة في المحصول والارتفاع أى القوة في أى وقت من أوقات موسم النمو سنة ١٩٣٦ وقد فصلت في الجدول رقم ٤ نتائج محصول غرس القصب في منتصف فبراير سنة ١٩٣٦ وأرقام المحصول الخلفة المزروع في منتصف فبراير سنة ١٩٣٧ وكذا المتوسطات السنوية المجموعات التجريبية التي أجريت بملوى والمطابقة الشاملة لمجموع ثمانية محاصيل مختلفة

## الجدول رقم ٤

المجموعة الثانية لتجارب التخطيط بملى

أولا - قصب السنة الأولى حصد ٣ - ١٧ ١٩ - ٣٦

عدد الخلطوط في كل قصبين م ٧:١	القطع اربعة فرايط	وزن القصب بالكيلوجرام عرب القطعة	وزن القصب بالقناطير عن الفدان	الحلاوة النسبة المئوية للكروفي القصب	القنارة مقدار الجليكوذ
٨ (٩٠ سم)	١ - ١	٧٠٣٠		١٢٣٤	٨٢٢٢
٩	٤	٨٣٥٠		١٢٣٨٨	٨١٩
١٠	٦	٩٣٥٠		١٢٣٥٨	٨٢٢
١١	١١	٨٤٣٠		١٢٣٤٩	٨٦٢
٨ (٩٠ سم)	المتوسط	٨٢٩٠	١١٠٧	١٢٣٨٢	٨٣٢٣
٩ (٩٠ سم)	ب - ٣	٨٧٥٠		١٢٣١٥	٨٣٩
١٠	٥	٩٧٨٠		١٢٣٨٧	٨٣٤
١١	٨	٨١٠٠		١٢٤٤٤	٨٩١
١٢	١٠	٩١٣٠		١٢٣٧٧	٨٣٧
٩ (٩٠ سم)	المتوسط	٨١٤٠	١١٩٤	١٢٣١٨	٨٥١
١٠ (٩٠ سم)	ج - ٢	٩١٠٠		١١٥١	٧٩٣
١١	٧	٩٠٢٠		١٢٣٢٢	٨٥٥
١٢	٩	٨١٥٠		١١٥٣٢	٧٩٧
١٣	١٢	٨٣٥٠		١٢٣٢٢	٨٥٩
١٠ (٩٠ سم)	المتوسط	٨٦٥٥	١١٥٦	١٢٣٤٥	٨٢٧

ثانيا - قصب السنة الثانية حصد ١٨ فبراير سنة ١٩٣٧

عدد الخلطوط في كل قصبين	وزن القصب عن الفدان بالقطار قصب السنة الثانية متوسط محصولين	الحلاوة	القنارة	مقدار الجليكوذ
٨	١٠٤٧	١٠٧٧	١١٠١٦	٨٠٩
٩	١٠٤٣	١١١٨	١١٠٨٢	٨٣٢
١٠	١٠٥٣	١١٠٥	١١٠٥٧	٨١٦

ثالثا - المتوسطات السنوية لتجارب مجمعة بملى والمطاعة (ثمانية محاصيل)

٨	١٠٠٥	١٢٧١	٨٢٦	٦٣
٩	١٠٢٨	١٢٩٤	٨٣٩	٦١
١٠	١٠٢٧	١٢٦٢	٨٢٦	٦٤

إذا قبلت أرقام السنة الأولى بالبيانات التي تعاد لها عن حصد القصب العروس في المجموعة الأولى لتجارب المسافة في مارس سنة ١٩٣٤ كما هو مبين في الجدول رقم ١٠ بالفترة الفنية رقم ١١٤ (١) لوجد فيها تشابه غريب . ذلك لأن محصول الفدان في سنة ١٩٣٦ زاد زيادة مطردة في مقدار القصب وجودته على محصول السنة الأولى المتأخر في الزرع في التجارب المبكرة . هذا وبما أنه يبدو أن هذه الزيادة الظاهرة في غلة القصب والسكر عن الفدان تنسب كلها تقريبا إلى إطالة موسم النمو الناشئ عن التبريد في الفرس فقد درست تفصيلا في خلاصة هذا الباب الخاص بأنسب وقت لزراعة القصب في هذه الفترة

وعصارات قصب السنة الثانية في التجارب الحالية ( الجزء الثاني من الجدول رقم ٤ ) تُميل تأثيرات الصقيع القارس والدائم الذي حصل مبكراً في ديسمبر سنة ١٩٣٦ ويناير سنة ١٩٣٧ وهو العامل الأكبر في التلف مدة سنتين عديدة فلما أتى الصقيع فجأة عقب الدفء الزائد ، جو النمو ، أصبح القصب يحتفظا بنسبة الخضري ففارق نضجه البطيء العادي الذي يعقب في العادة ، نقصا تدريجياً في درجات الحرارة الجوية وماء الري

وإن الفوارق في مقدار وجوده القصب الذي أنتجه القطع التي زرعت على مسافات مختلفة لطيفة جدا ومتغيرة لا يعتد بها إحصائياً سواء أكانت في محاصيل السنة الأولى أو الثانية لتجارب الجديدة - ذلك لأن أقصى تغير بين متوسط الغلات عن المحصولين الجزء الثاني من الجدول رقم ٤ - الحانة الثالثة يقل عن طنين من القصب للفدان وبفحص متوسط النتائج السنوية للمجموعات الثلاث من تجارب بملى والمطاعة التي تشمل ثلاثة محاصيل مختلفة ( الجزء الثالث من الجدول رقم ٤ ) تظهر للعيان حقيقة : هي أن أرقام الفصائل متجمعة جداً لأن أقصى فارق بين غلات القصب لم يتعد ما يقرب من طنين واحد للفدان

وقد أسفر الفرس القياسي على ٨٠ سم . ثبات عن أحسن نوع في العصور من أول الأمر إلى آخره إلا أن درجة التفوق دقيقة جداً لا يعتد بها إحصائياً ، وكل ما غرس على



هذه المسافة يؤيد لما سبق أن أظهرته هذه التجارب من ناحية أنه يثبت أن لا فائدة في تغيير مسافتنا القياسية الحالية ألا وهي تسعة خطوط لكل قصبتين .

## نتائج

تؤيد هذه البيانات دراسة الجدول رقم ٥ الذى يشير إلى متوسط النتائج السنوية للعشرين محصولا من القصب المزروع على ٨، ٩، ١٠ خطوط لكل قصبتين قصب السنين الأولى والثانية والثالثة في التجارب الأربع التى أجريت بكم أمبو والتجارب الأصلية التى أجريت بالمطاعة وملوى وقصب السنتين الأولى والثانية وفي المجموعة الثانية بملوى

إحصاء رقم ٥

## الجدول

متوسط النتائج السنوية لجميع السبع  
(عشرون)

عدد الخطوط لكل قصبتين		٨ - ٩ (٩٠ سم)			
التجارب	الموقع	القناطر عن الفدان	الحلاوة	النقاوة	مقدار الجليكوز
٤	كوم امبو	١٠٤٨١٦	١٣٣٣٧	٨٢٢٩	٥٢٤
١	المطاعنة	١٠٠٨٠٠	١٣٢٨٢	٨٥٢٣	٣٢١
٢	ملوى	١٠٠٣٢٠٠	١٢٢٠٤	٨٠٢٨	٨٢٢
٧	المتوسط العام <sup>(١)</sup>	١٠٢٩٨٦	١٣٢٠٥	٨٢٢٦	٥٢٩

(١) محمل

## رقم ٥

التجارب على المسافة عن الأربع سنوات  
(عصرلا)

ب - ٩ (٨٠ سم)				ج - ١٠ (٧٠ سم)			
القناطر عن الفدان	الحلاوة	النقاوة	مقدار الجليكوز	القناطر عن الفدان	الحلاوة	النقاوة	مقدار الجليكوز
١٠٦٨٢٨٥	١٣٢٣١	٨٢٢٩	٥٢٦	١٠٥٢٢٧٥	١٣٢٣٣	٨٢٢٨	٥٢٤
١٠١٩٢٠٠	١٣٢٨٧	٨٥٢٥	٣٢١	١٠٣٩٢٠٠	١٣٢٨٦	٨٥٢٨	٣٢١
١٠٣٣٢٠٠	١٢٢٣٩	٨١٢٧	٧٢٨	١٠٢٣٢٠٠	١١٢٩١	٨٠٢٨	٨٢٢
١٠٥١٢٤٩	١٣٢١٣	٨٢٢٩	٥٢٩	١٠٤٢٢٨٦	١٣٢٠٠	٨٢٢٧	٥٢٩

وقد دلت المسافة القياسية بين الخطوط وهي ٨٠ سم . دلالة خفيفة على خير النتائج كية القصب وجودته إلا أن أقصى درجة فيما بين متوسطات الأرقام السنوية للمسافات الثلاث المختلفة لم تكن إلا طن واحد تقريباً من القصب سنوياً ، وأكثر من عشر درجة بقليل في الحلاوة ، وأقل من تلك درجة في النقاوة ، وهي فروق لا يعتمد بها لإحصائياً ولأنه أجرى عنها مثل هذا العدد الكبير من التجارب بل أنها تؤيد النتائج التي أمكن الوصول إليها في النشرة الفنية رقم ١٦٤ من حيث أن مقداراً كبيراً من البيانات التجريبية لم تُقَم مطلقاً الدليل على ضرورة تغيير اتجاه الطريقة القياسية عملياً وهي زرع نسمة خطوط شكل قصبتين أى الطريقة التي وصل إليها الزارع المصري بالاختبار وبنفس الدقة التي لم يتعمدها وهي التي بذلها في سبيل التقدم التدريجي لأنسب مسافة في زرع القطن .

## الباب الثالث

### استعمال أطراف عيدان القصب ( الزايع ) كتقاوى

لكل بلاد خصائصها في زرع القصب كما هو الحال في أكثر الأشياء الأخرى وتنسب هذه الخصائص في بعضها إلى ما تتطلبه التربة وفي بعضها إلى العادات المتبعة عملياً فقط ، ففي كوبا يترك القصب أعقاباً ( خلفه ) مدة عدة سنوات ، وفي جاوه لا تصرح الحكومة بزراعة الخلفه ( عُقر ) ، وفي مصر والجمهورية القصبية<sup>(١)</sup> تعتبر أطراف عيدان القصب علفاً طيباً للحيوانات الشغل ، وفي لوزيانا تحرق هذه الأطراف دون الاستفادة منها ، وفي جاوه وهوايى وكثير من البلاد التي تجود بها زراعة القصب تستعمل هذه الأطراف دون سواها للزرع ، وفي مصر ولوزيانا والجمهورية القصبية يستعمل للزرع من ٣ إلى ٤ طن من العيدان الكاملة عن الفدان ومنتكلم في هذا الباب عن هذه النقطة الأخيرة . وقد دلت التجارب المتكررة التي أجريت في جميع أنحاء المعمورة على أن الجزء العلوى من عود القصب ينبت أسرع مما في الجزء السفلى<sup>(٢)</sup> والأعقاب<sup>(٣)</sup> بصفة قاطعة حيث دل على ذلك زرع القصب من الأطراف منذ عشر سنوات حتى أنه لم يحصل توالد للقصب من جراء زرع الثلث الأعلى من العود كما رأى ذلك كثيرون من معارضى هذه الطريقة على أساس أن هذا الجزء من العود نظراً إلى عدم نضجه واحتوائه مقداراً قليلاً جداً من السكر لا ينتج بالطبيعة عيداناً حسنة النمو ومحتوية على نسبة كبيرة من السكر . وقد ذكر أخيراً<sup>(٤)</sup> جناب الدكتور أ. م. وارن A. M. Martin بحق أنه معروف بوجه عام أن الجزء الطرفى من العود أفضل في هذه الناحية من الجزء الأسفل وتحققت غالباً الأفضلية من حيث القوة . . . ( ينظر الرسم البياني ) .

1) Rosenfeld Arthur H. - Despunte vs Cavas Enteras. Revista Industrially agricola, Ano V. pp. 100-3, 1914.

2) Mc Martin, A. - Estudios Botanicos sobre la Cana de Asucar. El Mundo Aeuclarero, XXIV, p. 183, N.Y., 1936.---

3) Stubbs, W.C. — Sugar Cane. New Orleans, 1899.

4. Pathological Conditions affecting growth of Sugar Cane from Cutting in Natal. Prac. So. Af. sug. Technols Assn., 1937.

ويعرف كل من زرع قصب السكر أو صنع السكر أن الجزء العلوى من العود هو الذى يحوى أكبر نسبة من المواد الغريبة وأنه بناء على ذلك يقلل من نقاوة العصير فيتمتع كثيراً تشغله بمعمل السكر . ويمكن القول بعبارة أخرى انه فى المناطق الشبه استوائية إذا جزء عود من القصب تام التضج إلى ثلاثة أجزاء لوُجد أنه باستخراج عصير كل جزء وتحليله ابتداء من الجزء الأسفل للعود إلى الجزء الطرفى أن نقاوة العصير واحتواء السكر يقلان كلما اقترب من طرف العود وحينئذ تكون العادة التى جرت عليها جاوه وهاواى الخ من زرع الأطراف ( الزعازيع ) وعصر أهم جزء من القصب من ناحية إنتاج السكر عادة قوية ، ذلك لأنه ينتج من عصر هذه الجهات للجزء السفلى من القصب فى معمل السكر عصير ذو درجة عالية فى النقاوة وبسبب ذلك يسهل عمل التصفية والترويق والتبخير نسبياً فى حين أن الزرع قد أجرى من قصب رُمى منه جزء كبير باعتبار أنه قليل الأهمية بالرغم من أن الجزء الطرفى هو الذى يحتوى دائماً أكبر مقدار من أنواع السكر المحولة بسهولة ( الجليسكرز الخ ) التى تجهز ثانياً أكسيد الكربون والماء تجهيزاً تاماً وهما العنصران اللذان يعطيان القوة التى بها يبتدى البرعم فى الكشف (١).

وبناء على ذلك اعترف المؤلف مع مراعاة هذه النقط إجراء أبحاث جدية فى هذا الموضوع فى السنوات الأولى لمخطة تجارب السكر بحكومة توكومان بالجمهورية الفضية فأنقِيت قطعة من الأرض أحوالها واحدة فى جملتها وأعدت لهذه التجربة فزرع نصفها بعبدان من القصب كاملة والنصف الآخر بأطراف أخذت من رسالة أوراق وأطراف كانت واردة من أحد معامل السكر المجاورة لتستعمل غذاء للحيوانات هناك وإن انتقل لأطراف من رسالة العلف لم يكن منها عليلاً إلا أنه قد عمل ذلك لما فيه من إمكان إجراء مقارنة قيمة — ذلك لأن الأطراف التى زرعت كانت فى الواقع تلك التى كانت تلقى جانباً باعتبار أنها لا تصلح لشيء .

(١) كما كانت المواد السكرية بدائية سهلة التحول كلما استفاد منها البرعم بسهولة ثم إنه بسبب أن السكر يزاد أن يتحول إلى أنواع السكر المحولة قبل أن ينشأ النبات فمن المفوق استنتاج أن زيادة الاحتواء على السكر المحول فى الأطراف يظهر أثرها فى نبات براعم البحر الطرق للقصب . وفى الواقع قد أبان هـ . إفايز فى التقرير السنوى الخامس على عجلة أبحاث قصب السكر فى موريشس ( سنة ١٩٣٤ . صفحة ٤٦ ) أنه يوجد ارتباط سلبى هام بين احتواء السكر المحول فى قطعة التقاوى وعدد الأيام اللازمة للنبات . فكلما زاد احتواء أنواع السكر المحولة كلما قلت الأيام اللازمة للتزريع

فعمّلت التجارب من أعقاب السنة الأولى وشرع بعد ذلك أيضاً فى عمل مجموعته تجارب أخرى من قصب السنة الثانية .

فكانت النتائج فى جميع الأحوال متشابهة ، فالأطراف الطرية تأثرت طبعاً من جراء تعفنها نظراً إلى وجودها فى الأرض وقتاً طويلاً خصوصاً فى البلاد الشبه الاستوائية بالنسبة إلى الإنبات السريع الذى قد يحصل فيها وذلك أكثر من تأثر العبدان الكاملة حيث أن هذه الأخيرة أكثر مقاومة لذلك ، فأنت محصول من القصب غير متجانس نوعاً كانت نتيجته أن نقص متوسط الغلات عما أمكن الحصول عليه من العبدان الكاملة ( تقاوى ) بما يقرب من ١١ ٪ عن الفدان — فى التجربتين ( محصولان كل منهما عن السنة الأولى والسنة الثانية ) أنت الأطراف ( الزعازيع ) ( Bouts-Blancs ) بغلة متوسطها ٢٤٤ طناً من القصب للعمل مقابل ٣٧٤ طناً فى حالة العبدان الكاملة .

وبالعكس كان منظر القصب وجودته وقت الكسر متشابهين من أول مجموعتى التجربتين إلى آخرهما ، ويظهر أن تفوق الغلة فى حالة تقاوى الزرع القياسية منسوب كله إلى نمو الإنبات الناشئ من شدة صلاحيتها ، وكذلك كانت فوارق الغلة أعلى فى قصب السنة الأولى وكانت الأعقاب ( الخلفة ) فى قصب السنة الثانية معوضة إلى حد ما للنقص فى محصول السنة الأولى .

وبسبب أنه كثيراً ما كان يرجع إلى رأى المؤلف فى خلال الشهور الأولى عند ما كان بمصر بخصوص إمكان تعميم استعمال الأطراف كتقاوى فى هذا النقط مثل ما هو جارٍ فى البلاد الاستوائية قد تقرر إجراء تجربة لإيضاح ذلك بكم أمبو وتكرارها على المتوال نفسه الذى اتبع فى الجمهورية الفضية حيث سبقت دراسته ، وتستعمل فيها الأطراف كتقاوى بدلا من الثلث العلوى للعود الشائع استعماله فى المناطق الاستوائية .

ويتقدم المؤلف بالشكر إلى حضرة صاحب العزة ربيذ قضاوى بك مدير عام شركة كرم أمبو ووكيلها حضرة س. مزارحى لما قاما به من إبداء مقترحاتهما واشترآكهما فى العمل ، وبعد المداولة معهما قد انتخبت لهذه التجربة مساحة قدرها فدانان فى كرم أمبو يجرى تربتهما خصبة جد صفراء ، طميية ومتجانسة التركيب . وبعد تجهيز هذه المساحة تجهيزاً تاماً حسب ما هو جارٍ قاسياً بكم أمبو ، قسمت إلى اثنتي عشرة قطعة مساحة كل منها أربعة قراريط ( ٦ فدان )

وكانت عمليات التنجيز والرى والتسميد والخدعة وكذلك طريقة كسر محاصيل  
المكرورات المختلفة مماثلة لها في تجارب <sup>(١)</sup> المسافات بكم أمبو.

وقد شوهد كذلك أن الإنبات في حالة الاطراف كان أقل بدرجة خفيفة منه في حالة عقل العيدان الكاملة Boutures الشائعة، ومن جهة أخرى كان تنكشف القصب من كلا طرزي التقاوى من حيث الارتفاع واللون وما إلى ذلك مثبثا ظاهريا من أول الثلاث سنين للتجربة إلى آخرها. كما أنه لم تسفر التجليلات التي أجريت تحت إشراف جناب المستر م. فافر Favre بكمو ابو عن فوارق يعتد بها إحصائياً في جودة القصب الذي تنتج في خلال الثلاثة المحاصيل

وكسر قصب السنة الأولى في ١٨ مارس سنة ١٩٣٤ وقصب السنة الثانية في أول مارس سنة ١٩٣٥ وقصب السنة الثالثة في ١٠ فبراير سنة ١٩٣٦ وبينت النتائج بالجدول التالي :

الجدول رقم ٥

موضوعات الكتاب — ١٩٣٦		قسط سنة الفاع بالناظر ١٩٣٦		قسط سنة الفاع بالناظر ١٩٣٥		قسط سنة الأولى بالناظر ١٩٣٤		الطبع (٤ غزاريط)
الأطراف	المادي	الأطراف	المادي	الأطراف	المادي	الأطراف	المادي	
١٧٥,٨٦٦	١٧٦,٨٣٣	١٧٣,٥٣٣	١٧٣,٥٣٣	١١٩,٥٦٤	١١٥,٥١١	١١٩,٥٠٣	١٨٥,٠٠٤	٣,٩١
١٨٥,٥٣٣	١٨٧,٠٠٤	١٧٣,٥٥٤	١٧٧,٥٦٦	١٨٥,٥٣١	١٨٥,٥٢٩	١١٩,٥١١	٣,٣٣,٣٥٥	٤,٣٣
١٧٣,٥٣٣	١٨٥,٥٤٣	١٧٣,٥٣١	١٧١,٥٤٧	١٧٤,٥١٠	١٩٦,٥١١	١١٩,٥٥١	١٩٦,٥١١	٦,٥٥
١٧٠,٥٣٧	٢٠٢,٥٣٦	١٨٦,٥٣٣	١٨٦,٥٥٨	١٨٦,٥٥٣	٢٠٠,٥٣١	١٩٧,٥١٦	٢١٧,٥١٨	٨,٥٧
١٩٩,٥٣٦	١٩٩,٥٤١	١٨٧,٥٣٥	١٨٧,٥٣٣	١٩١,٥٣٩	١٨٨,٥١٦	٢٠٢,٥٠٤	٢٠٤,٥٠٤	١٠,٥١
١٥٥,٥٣٧	١٨٥,٥٥٣	١٤٤,٥٣٥	١٧١,٥٣٣	١٧١,٥١١	١٥٤,٥١٩	١٣٣,٥٠٤	١٨٥,٥٢٧	١٧,٥١١
١٧٠,٥٣٥	١١٦,٥٥٩	١٩٣,٥٤٤	١٠٠,٥٣١	١٠٥,٥٥٨	١١٣,٥٠٥	١١١١,٥١١	١١٥,٥٤٣	عرب الفنون

وقد أسفرت الكمية العظيمة التي حصدت من القلع التي استعملت فيها الأطراف للتقاوى عن نقص ٥٤ ٪ في المتوسط عما في التقاوى العادية وذلك عن السنوات الثلاث . مقابل ما يقرب من ضعف الفرق الذي أثبتته التجارب في الجمهورية القسبية ، ويمكن تقدير التعويض الناشئ عن زرع الحلفة بالفروق المثوية النسبية في الغلات السنوية ، فأنت الزراعة بتقاوى الأطراف في القصب العروس بمقدار ٦٦ ٪. أقل مما أنت به قطع المقابلة ( الضوابط ) في حين أنه نقص الانتاج في السنتين الثانية والثالثة بمقدار ٥٤ ٪ ، ٤ ٪ ، على التعاقب وبعبارة أخرى أنتجت الزراعة بالأطراف ٩٣ ٪ عما أنتجته الزراعة بالبيدات الكاملة في القصب العروس ٩٤ ٪ في قصب السنة الثانية ، ٩٦ ٪ في قصب السنة الثالثة .

### نتائج

تؤيد هذه النتائج تلك التي أسفرت عنها التجارب السابقة التي أجراها المسير مزراحي بالمطاعة سنة ١٩١٩ — ٢٠ وبكوم امبو (سيل) من نحو عشر سنوات ، التي دلت أن الزرع بالزرايع Bouts blancs لا يوصى باتباعه عملياً بمهروينا أنه قد يسفر استخدام الثلث الأعلى من العود بدلا من الأطراف اللينة الطرفية عن غلات تضارع الغلات التي تنتجها تقاوى البيدان الكالة المثبة قياسيا من ناحية وفرتها ، وقد يكون لدى المسير مزراحي كل الحق في أن يعتبر أن المتاعب والنفقات التي تنكب في تعميم هذا الطراز من تقاوى القصب ليكون عادة عملية لتزيد عن إقتصاد شيء زهيد من الثمن الضئيل للطن من تقاوى الثلث الطرفي على أنه جاري الآن عمل تجارب جديدة يستخدم فيها الثلث العلوي للعود كتقاوى بدلا من الزرايع نفسها كما في التجارب الحالية الأخيرة

ولإن استعمال الثلث الأعلى من العود كتقاوى يلزم أن يكون مربحا في أحوال مخصوصة ليست نادرة في بعض المناطق من الأراضي المصرية التي يزرع فيها القصب ، وفي الحالة التي فيها يزرع القصب متأخراً جداً (١) قد يكون احتواء (٢) السكر منخفضا للدرجة كبيرة في الوقت الذي فيه يلزم أن يرسل قصب السنة الأولى إلى المصنع ، فإذا أمكن إعداد الأرض للزرع في السنة الجارية أمكن للزارع زرع أطراف البيدان على مسافة أخفض عما هو متبع واستخدام الثلث الطرفي كتقاوى تزرع في الحال وكذا إرسال إلى المصنع قسبا محسنا للدرجة كبيرة من حيث الجودة من جراء إزالة هذه الأجزاء الغير الناضجة .


(١) روزنفلد — آرثر هـ. أنسب وقت لزراعة قصب السكر في مصر — لشرة الفينيفرم ١٩٦٥ سنة ١٩٣٥ لوزارة الزراعة  
(٢) يقول المستر ماك مورتن في هذا المقام هـ في حالة توافق موسم الزرع مع موسم المعمر يظهر أنه لا يوجد ما يمنع من إمكان إجراء الترتيب و لقطع طرف أكبر الاحتفاظ به للزرع . . . في إجراء ذلك لا يحصل على تقاوى أعلى جودة حسب بل يترتب عليه إرسال قصب أحسن نوعاً إلى المصنع




شكل ١ - بوعه ( ربة الزراعة )



شكل ٢ - العزقة الاولى



شكل ٣ - الحراثة بكوم امير بواسطة ماكينة فاولر



شكل ٤ - رؤية الحقل بعد الحراثة الأولى بالبخار





شكل ٥ - إعداد القاي في حقل التجربة



شكل ٦ - على اهبة الغرس




شكل ٧ - انتخاب قطع القناوى



شكل ٨ - نقل القناوى بواسطة الجمال




شكل ٩ — توزيع قطع الدواوى فى بطون الحشود



شكل ١٠ — تغطية القناوى بالنّاس



# مجموع المبيعات الدورية على شكل قوسية بيضاوية



وزارة الزراعة

قسم تربية النباتات  
( فرع أبحاث قصب السكر )

# النشرة الفنية

رقم ١٩٦

اختبارات أخرى  
على وزن محاصيل أصناف قصب السكر المستورد

بسم  
جناب الدكتور ارثر . ه . روزنفلد

خبر قصب السكر سابقا

نقلها من الانجليزية  
حضرات موظفي أبحاث قصب السكر

طُبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة ، سنة ١٩٣٩

تباع مطبوعات الحكومة بصفة البيع بوزارة المالية . أما المكاتبات الخاصة  
بهذه المطبوعات فتُرسل رأسا إلى علم النشر بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة

الثمن ٢٠ ملية

# اختبارات أخرى على وزن محاصيل أصناف قصب السكر المستورد

بسم

جناب الدكتور ارثر . ه . روزنفلد

خبر قصب السكر الحكوى

تقلاها عن الانجليزية

حضرات موظفى أبحاث قصب السكر

ذكر الكاتب فى رسالة سابقة \* ، مجلداً عن الانقلاب الكبير الذى حدث فى صناعة السكر خلال القرن الحالى فيما يختص بأصناف القصب . ونلخص باختصار تاريخ إدخال أصناف القصب فى مصر ، مبتدئاً بتاريخ استيراد القصب ١٠٥ P.O.J. ( قصب مصر الأساسى فى الوقت الحاضر ) من جاوه بواسطة جناب المسيو هنرى نوس بك سنة ١٩٠٢ وأخيراً وصف التجارب التى أجراها فى مزرعة الحكومة بالمطاعة على وزن محاصيل تسعة أصناف مستوردة تبشر بالنجاح أكثر من سواها مقارنة بالقصب ١٠٥ P.O.J. وعند قطع محصول أول سنة ( الفرس ) وجد أن القدان من الصنف ١٠٥ P.O.J. أنتج خمسة أطنان من القصب و ٣٥٠ كيلو جراماً من السكر أكثر من أقرب مزاحم له وهو زميله الصنف \*\* ( M ) ٣٦ P.O.J.

أجريت هذه التجارب هى ونظائرها التى أجريت فى مزرعة الحكومة بملوى ، فى أرض طمية متوسطة الخصب يبدو أنها تامة التجانس معدناً مع تكرار كل صنف ثلاث مرات وقد كان معدل التخطيط تسعة خطوط فى كل قصبتين ( حوالى ٨٠ سم ) .

\* اختبارات خاصة بوزن محاصيل بعض أصناف مستوردة من قصب السكر . النشرة الفنية رقم ١٦٨ لوزارة الزراعة .

القاهرة ١٩٣٦

\*\* لمرة أصل كل أصناف القصب المتزعم عنها هنا ، انظر رسالة الكاتب " زرية قصب السكر فى مصر " وهى النشرة الفنية رقم ١٦١ لوزارة الزراعة سنة ١٩٣٦ ، أو رسالته " النواحي الوراثية لبادرات قصب السكر والإصلاحات الخاصة بها " المنشورة فى العدد ٣٧ سنة ١٩٣٥ من ( جريدة السكر ) .

(٢) جدول ١ - التجربة الأولى في المطاعة

النسبة السكر في المائة من القدان	النسبة السكر في المائة من القدان	القصب في القدان		الصفة (*)
		طن	قنطار	
١٠٠	١٠٤٩	٤٧,١٣٣	P.O.J.	١٠٥
٣٦ (M)	٩٧٥	٤٣,٨١٣	P.O.J.	٣٦ (M)
٣٦	٩٢٩	٤١,٧٤٢	P.O.J.	٣٦
٩٧٩	٨٨٨	٣٩,٩١٤	P.O.J.	٩٧٩
٢٨١	٨٨٦	٣٩,٨٠٠	Co.	٢٨١
٢٣٤	٧٥٧	٣٤,٠٠٠	P.O.J.	٢٣٤
١٠٩	٦٧٧	٣٠,٤٠٠	H.	١٠٩
٢٧١٤	٤٨٣	٢١,٦٦٧	P.O.J.	٢٧١٤
١٠ (١٢)	٤٤٥	١٩,٩٧٣	B.H.	١٠ (١٢)
٢٧٢٥	٣٨٠	١٧,٠٥٢	P.O.J.	٢٧٢٥

\* تفسير الحروف الأول للأصناف P.O.J. محطة تجارب شرق جاوه Co. كوانج تونج  
H. هاراي (M) مينكا (مخطط) B.H. هجين برادوس

وبما في حالة قصب السنة الأولى سنة ١٩٣٥ فإن نظارة واحدة لهذا الجدول تبين أن قصب المقارنة الأساسي ١٠٥ P.O.J. قد فاق أيضا جميع الأصناف الأخرى في كل من محصول القصب والسكر للقندان، ولو أن مقدار تفوقه على صنفى \* (M) ٣٦ P.O.J. و ٢٨١ Co. لا يتجاوز ١٠ قنطارا من القصب للقندان.

وبالنسبة لزيادة جودة عصيره فإنه انتج مرة أخرى ٣٥٠ ك. ج. من السكر زيادة في كل قندان عن أقرب صنف منافس له وهو في هذه الحالة الصنف ٢٨١ Co. وكذلك كانت الفروق بين محصول صنفى ٣٦ P.O.J. المخطط والعادى لا يعتد بها من الوجهة الاحصائية ولو أنه كما حصل في المحصول السابق فإن التفوق العادى الطفيف في المحصول والمخطط في السكر لصنف ٣٦ P.O.J. (غير المخطط) قد انعكس بالقياس الى زميله المخطط الذى نتج منه كطفره وقد حافظت الأصناف ٢٧٢٥ P.O.J. و ٢٣٤ P.O.J. و ٢٨١ Co. على سمعتها كأصناف مبكرة النضج عالية في نسبة السكر بينما كان الصنف ١٠٩ H. مرة أخرى أقل الأصناف احتواء على السكر.

\* "M" = Minka الكلمة اليابانية التى تعادل بالانجليزية Striped أى مخطط.

نتائج محصول السنة الثانية (الخلفة) في المطاعة

قطع قصب السنة الأولى في آخر فبراير سنة ١٩٣٥، ولم ترو الخلفة إلا بعد شهرين تقريبا. وحرثت المخطوط في ١٠ مايو ثم أقيمت فواصل القطع من جديد الخ وبعد أسبوع وضعت أول دفعة من السباد (١٠٠ كج من ترو سلفات النشادر أى ٢٦ كج من الأزوت للقندان) مع ثاني رية. ووضعت ثاني وثالث دفعة من السباد بنفس النسبة في آخر مايو وفي الرابع والعشرين من يونيو على التوالى. بحيث أجريت العزقة الوحيدة لجميع المخطوط عند التسميد الأخير. ونظرا لتأخر حرث المخطوط، قد أمكن رى المحصول اثنتين وعشرين رية فقط - وهى أقل من عدد ريات محصول

السنة الأولى برتين - وقد أعطيت الرية الأخيرة في أنسب ميعاد وهو ١٨ ديسمبر سنة ١٩٣٥ وهو أكبر بمجوال سبعة أسابيع من موعد آخر رية لقصب السنة الأولى. وقد تبين جليا عند قطع الأصناف جميعها في أول فبراير سنة ١٩٣٦ أن التكبير في منع الرى نشأ عنه ارتفاع منتظم في نسبة السكر (جدول ١).

جدول ١ - التجربة الأولى في المطاعة

النسبة السكر في المائة من وزن القصب	النسبة السكر في المائة من وزن القصب	القصب في القدان		الصفة (*)
		طن	قنطار	
١٠٥	٩٦٨	٤٣,٤٦٦	P.O.J.	١٠٥
٣٦ (M)	٩٢٨	٤١,٦٨٠	P.O.J.	٣٦ (M)
٣٦	٩٠٠	٤٠,٤٤٠	P.O.J.	٣٦
٩٧٩	٨٧٢	٣٩,١٦٠	P.O.J.	٩٧٩
٢٨١	٩٢٨	٤١,٧٠٦	Co.	٢٨١
٢٣٤	٧٢٧	٣٢,٦٤٠	P.O.J.	٢٣٤
١٠٩	٥٦٩	٣٥,٥٤٦	H.	١٠٩
٢٧١٤	٣٠٧	١٣,٨١٤	P.O.J.	٢٧١٤
١٠ (١٢)	٣٨٣	١٧,٢٢٦	B.H.	١٠ (١٢)
٢٧٢٥	٣٠٧	١٣,٧٨٤	P.O.J.	٢٧٢٥

١ - قصب السنة الثانية (قطع في أول فبراير سنة ١٩٣٦)



وقد لوحظ مدى موسم الفؤان الأصناف الأربعة الأخيرة - H. ١٠٩ و H. (١٢) و B.H. ٢٧١٤ و P.O.J. ٢٧٢٥ كانت ظاهرة القصر وموقوفة النمو دليل على انها أصناف مناطق استوائية تقصر فترة النمو لدينا عن حاجتها وهذا يؤيد ما وصل إليه الكاتب نتيجة تجربته في هذه الأصناف بالبلاد نصف الاستوائية الأخرى .

### تجارب ملوى

بالنسبة لضرورة زيادة كمية تقاوبنا حتى تكفى لعمل تجارب ذات مكررات كالتي أقيمت بالمطاعة وذكرناها فيما سبق . لم يمكن إجراء تجربة مزرعة ملوى حتى سنة ١٩٣٥ وفيما عدا التبرير في تاريخ حرق حقل هذه التجربة لمدة شهر عنه في المجموعة الثانية لتجارب مسافات التخطيط في ملوى . ونقص عدد ريات قصب السنة الأولى رية واحدة فالتجارب باقية العمليات من تحضير الأرض والعزق والتسميد والرى ... الخ . كانت مطابقة عمليا لها في كل من زراعتي السنة الأولى والثانية من التجارب التي وصفت بالباب الخاص بتجارب التخطيط في النشرة الفنية الحديثة المعنونة "تجارب زراعة القصب" وأعطيت الريه الأخيرة لزراعة السنة الأولى قبل الحصاد (في ١٨ مارس سنة ١٩٣٦) بمدة شهر بالضبط ، ويرجح أن ذلك يفسر السبب في نقص نسبة السكر في أصناف ملوى عنها في أصناف المطاعة التي قطعت في وقت أبكر بحوالى ستة أسابيع ( انظر القسمين الأولين من الجدولين رقم ١ و ٢ ) .

وقد لوحظ في مستهل فصلى النمو أن الأصناف P.O.J. ٢٧١٤ و P.O.J. (١٢) و B.H. ١٠٩ و H. كانت أبداً نمواً وأقل طولاً من الأصناف الأخرى . ولو أن من الغريب أن مدى الخلاف كان أقل في ملوى ذات المناخ الأكثر اعتدالاً لوقوعها شمال المطاعة . فالصنف P.O.J. ٢٧٢٥ على الأخص الذي كان باستمرار أقل الأصناف محصولاً بالمطاعة كما كانت أقصر بوصح من السنة أصناف الأولى بملوى . هذا الصنف كان غزير النمو جداً في كلا العامين في تلك المنطقة الشمالية ( ملوى ) كما كان الخامس بين الأصناف في محصول السنة الأولى والسادس في محصول السنة الثانية وفي الواقع أن خاصية ارتفاع نسبة السكر في محصول السنة الأولى لهذا الصنف جعلته ثانياً الأصناف بالنسبة لكمية السكر الناتجة من القصدان . ومع ذلك فإن الصقيع الذي حل في شهرى ديسمبر سنة ١٩٣٦ ويناير سنة ١٩٣٧ كان أظهر أثراً في الأصناف القصيرة النمو عنه في الأصناف الأكثر تكاملاً وعلى ذلك فإن الصنف P.O.J. ٢٧٢٥ أظهر لأول مرة في تجاربنا المصرية نسبة سكر منخفضة مما أدى الى جعله في محصول السنة الثانية الخامس بالنسبة لكمية السكر الناتجة من القصدان . وقد كان ذلك الصقيع المبكر أثر في خفض نسبة السكر في محصول السنة الثانية لجميع الأصناف كما يتضح من الجدول رقم ( ٢ ) ولو أن أثره كان محصوراً في حرق أطراف أوراق السنة الأصناف الأولى بينما كان شاملاً لجميع أوراق الأصناف القصيرة حيث غير لونها الى لون القش .

ويوجد في الجدول رقم ( ٢ ) البيانات التفصيلية لمحاصيل الستين الأولى والثانية ومتوسطهما .

### جدول رقم ٢ - تجارب ملوى

الصفه	محصول القصب في القدان	نسبة السكر	محصول السكر في القدان بالكلية جرام
طن	قنطار		
١ - قصب السنة الأولى			
قطع في ١٩٣٦ ٣/١٨			
P.O.J. ١٠٥	٥٤,٣٦٨	١٢١٠	١٢,٢٨ ٥٣٢٨
P.O.J. ٣٦ (M)	٥١,١٧٣	١٣٩	١٤,٠٤ ٥٧٣١
P.O.J. ٣٦	٤٨,٨٢٧	١٠٨٧	١٣,٦٩ ٥٣٧١
P.O.J. ٩٧٩	٤٦,٧٢٠	١٠٤٠	١٢,٢٨ ٥٥٧٩
Co. ٢٨١	٥١,٦٠٨	١١٤٩	١٢,٤٦ ٥١٦١
P.O.J. ٢٣٤	٣٩,٥٤٧	٨٨٠	١٤,٩٢ ٤٧٠٦
H. ١٠٩	٣٤,٧٦٠	٧٧٤	١٢,٠٨ ٣٣٧٢
P.O.J. ٢٧١٤	٣٢,٢٤٠	٧١٨	١٣,٩٢ ٣٥١٦
B.H. ١٠ (١٢)	٣٦,٠٠٠	٨٠١	١٢,٢٢ ٣٥٢٨
P.O.J. ٢٣٥	٤٧,١٢٠	١٠٤٩	١٤,٢٢ ٥٣٧٢
٢ - قصب السنة الثانية			
قطع في ١٩٣٧ ٢/١٦			
P.O.J. ١٠٥	٤٤,٧٤٦	٩٩٦	١١,٨٧ ٤٣٥١
P.O.J. ٣٦ (M)	٤٤,٠٥٤	٩٨١	١١,٦٢ ٤٠٩٧
P.O.J. ٣٦	٤١,٤١٤	٩٢٢	٢٠,٠٩ ٤٠١٧
P.O.J. ٩٧٩	٣٨,٦١٤	٨٦٠	١٢,٦٧ ٣٩٠
Co. ٢٨١	٤٨,٥٨٦	١٠٨٢	١٣,٥٣ ٥٣٤٧
P.O.J. ٢٣٤	٣٧,٠٤٠	٨٢٥	١٣,٤٩ ٤٠٠٠
H. ١٠٩	٣٣,٧٢٠	٧٥١	١٢,٠٢ ٣٢٣٧
P.O.J. ٢٧١٤	١٦,٥٣٤	٣٦٨	١٢,٣١ ١٦٢٠
B.H. ١٠ (١٢)	٢٩,٤٠٠	٦٥٤	١١,٤٠ ٢٦٧٥
P.O.J. ٢٧٢٥	٣٧,٢٨٠	٨٣٠	١١,٦١ ٣٤٦٧

ومن نتائج السنة الثانية "الحلقة" - القسم الثاني من الجدول - يتضح أن محصول الصنف ٢٨١ Co. زاد زيادة لها قيمة احصائية عن كل من محصولي الصنفين ١٠٥ P.O.J. و ٣٦ (M) P.O.J. حيث بلغت زيادته حوالى أربعة أطنان من القصب الناتج من الفدان . وقد كانت نسبة السكر العالية فيه سببا في انتاج الفدان منه طنا من السكر زيادة عما ينتجه الفدان من الصنف الأساسى (مرتبه الثانية) وكانت أقصى الفروق في انتاج السكر للأصناف ٣٦ (M) P.O.J. و ٣٦ P.O.J. و ٢٣٤ P.O.J. "نسبة السكر فيه ١٣,٤٩ ٪" أقل مدى عن ١٠٠ فيج . في السكر الناتج من الفدان مما .. ملها قليلة القيمة من الوجهة الاحصائية .

وبفحص متوسطات محصولي الموسمين في ملوى كما هو مذكور في القسم الثالث من الجدول تبين أن الفرق بين انتاج الفدان في السنة للصنفين ٢٨١ Co. و ١٠٥ P.O.J. - وهو ما يقل عن نصف طن من القصب - فرق ضئيل جدا من الوجهة الاحصائية، إلا أن حقيقة امتياز الصنف ٢٨١ Co. في نسبة السكر جعلته ينتج حوالى نصف طن من السكر أكثر من قصب المقارنة مما يشعر أن هذا القصب الهندي تلامه كثيرا ناحية المنيا . وقد تبين في ملوى والمطاعنة أنه ذو صلاحية فائقة من حيث كونه محصول حلقة إذ كان الصنف الوحيد في التجارب الأخيرة الذى زاد فيه محصول الفدان من القصب والسكر في السنة الثانية ( الحلقة ) عنه في السنة الأولى ( الفرس ) وما يدل على اتساع مدى تأقلم هذا الصنف سرعة انتشار زراعته في السنين الأخيرة في أوطان تفرد ببساتين خاصة مثل لوزيانا ( قد ذكر كوفو Coveaux و سيمون \* Simon حديثا أن هذا الصنف من أفضل الأصناف التجارية لئيهما فهو يماثل دائما الصنف ٢٣٤ P.O.J. من حيث احتوائه على السكر ولكن يفوقه بمراحل من حيث المحصول سواء في الفرس أو الحلقة وتآل \*\*

والزيادة السنوية التي أنتجها الصنف ٣٦ (M) P.O.J. في محصول السكر للفدان عن الصنف ١٠٥ P.O.J. وهي ما تقل عن ١٧٠ كج . في الفدان ليس لها قيمة من الوجهة الاحصائية . وكما تبين في المطاعنة لا يمكن قطعيا اعتبار الأصناف ١٠٩ H. و ٢٧١٤ P.O.J. و ١٠ (١٢) B.H. ملائمة لأحوالنا . وقد احتوى الصنف الأخير على أقل نسبة من السكر كما احتوى الصنف ٢٣٤ P.O.J. على أعلى نسبة منها مع اتساع الفارق بينهما ويوضح الجدول رقم ٣ متوسطه النتائج السنوية لمحصولى السنتين الأولى والثانية في كلتا التجريبتين :

\* تقرير عن أصناف القصب موسم سنة ١٩٣٥ النشرة الفنية العدد ٢٧٤ صفحة ١٧ سنة ١٩٣٦

\*\* انظر مقال الكاتب ( السكر في جنوب أفريقيا في الجريدة الدولية للسكر العدد ٣٩ أكتوبر سنة ١٩٣٧ بادن )

(٦) جدول رقم ٢ - تجارب ملوى

الصنف (١)	محصول القصب في الفدان		نسبة السكر	محصول السكر في الفدان بالكيلو جرام
	طن	قنطار		

٣ - متوسطات قصب السنتين الأولى والثانية

P.O.J.	١٠٥	٤٩,٥٥٧	١١٠٣	١٢,٠٨	٤٧٤٥
P.O.J.	٣٦ (M)	٤٧,٦١٤	١٠٦٠	١٢,٨٣	٤٩١٤
P.O.J.	٣٦	٤٥,١٢١	١٠٠٥	١٢,٨٩	٤٩٩٤
P.O.J.	٩٧٩	٤٢,٦٦٧	٩٥٠	١٢,٤٨	٤٢٤٠
Co.	٢٨١	٥٠,٠٩٧	١١١٥	١٣,٠٠	٥٢٠٤
P.O.J.	٢٣٤	٣٨,٢٩١	٨٥١	١٤,٢١	٤٣٥٣
H.	١٠٩	٣٤,٢٤٠	٧٦٢	١٢,٠٥	٣٣٠٥
P.O.J.	٢٧١٤	٢٤,٣٨٧	٥٤٣	١٣,٠٢	٢٥٨٣
B.H.	١٠ (١٢)	٣٢,٧٠٠	٧٢٧	١١,٨١	٣١٠٢
P.O.J.	٢٧٢٥	٤٢,٢٠٠	٩٣٩	١٢,٩٢	٤٤٢٠

وقد أنتج الصنف ١٠٥ P.O.J. مرة أخرى - في زراعة السنة الأولى - محصولا يزيد عن مثله في الصنفين ٢٨١ Co. و ٣٦ (M) P.O.J. بمقدار ثلاثة أطنان من القصب للفدان، ولكن احتمال الصنف ٣٦ (M) P.O.J. على نسبة عالية من السكر جعله ينتج ٤٠٠ كج . من السكر في الفدان أكثر من صنف المقارنة ( ١٠٥ P.O.J. ) - وكانت الفروق في انتاج السكر بين الأصناف ٣٦ P.O.J. و ١٠٥ P.O.J. و ٢٧٢٥ P.O.J. قليلة المدى مما يجعلها من الوجهة الاحصائية قليلة الأهمية كما اشتمل الصنف ٢٣٤ P.O.J. على أعلى نسبة من السكر والصنف ١٠٩ H. على أدنى نسبة .

(١) الوصف التفصيلي لجميع الأصناف المذكورة هنا مدرج في نشرة وزارة الزراعة الفنية رقم ١٦٨ - الصفحات


جدول رقم ٣ — متوسطات أربعة محاصيل في المطاعة ومولى\*

الصفة	محصول القصب في الفدان		نسبة السكر في الفدان بالكيلو	محصول السكر في الفدان بالكيلو
	طن	قنطار		
P.O.J. ١٠٥	٤٨,٣٤٥	١٠٧٦	١٣,٣٠	٥٠٩٤
P.O.J. ٣٦ (M)	٤٥,٧١٤	١٠١٨	١٣,٤٦	٤٩٢٢
P.O.J. ٣٦	٤٣,٤٣٢	٩٦٧	١٣,٨٧	٤٨٢٠
P.O.J. ٩٧٩	٤١,٢٩١	٩١٩	١٣,٦٣	٤٤٧٥
Co. ٢٨١	٤٤,٩٤٩	١٠٠١	١٣,٧٢	٤٩٠٤
P.O.J. ٢٣٤	٣٦,١٤٧	٨٠٥	١٤,٥٥	٤١٩٧
H. ١٠٩	٣٢,٣٢٠	٧١٩	١٢,٧٩	٣٢٩٠
P.O.J. ٢٧١٤	٢٣,٠٢٧	٥١٣	١٣,٦٨	٢٥٢٦
B.H. ١٠ (١٢)	٢٦,٣٣٧	٥٨٦	١٣,٢٣	٢٧١٠
P.O.J. ٢٧٢٥	٢٩,٦٢٦	٦٥٩	١٤,٥٢	٣٣٠٥



محصول ١/٢ طن

P.O.J. ٢٣٤



إحدى قطع الأصناف

ويبين من هذه الأرقام أن الصنف P.O.J. ١٠٥ يفوق جميع الأصناف في متوسط انتاجها السنوي لكل من القصب والسكر في الفدان حيث ينتج في المتوسط ٢,٥ طن من القصب ١٧٢٠ كج. من السكر زائدة عما ينتج أقرب صنف منافس له وهو P.O.J. ٣٦ (M) ولا يوجد فرق يستحق الذكر في غلات القصب والسكر بين الأصناف P.O.J. ٣٦ (M) و P.O.J. ٣٦ و Co. ٢٨١ أما الأصناف ستة الأخرى فأقل محصولاً ولا تحشى منها أية منافسة جديدة في مصر للصنف ١٠٥ P.O.J.

وقد دوماً تحتل P.O.J. ٢٧٢٥ و P.O.J. ٢٣٤ على الاحتفاظ بأعلى نسبة من السكر كدأوم الصنف H. ١٠٩ على الاحتفاظ بأدنى نسبة. بينما كانت سائر الأصناف الأخرى متقاربة من بعضها.

\* محصول واحد من الخرس والحفلة في كل من المزارعين المذكورين.

## (اختبار أصناف P.O.J. المنتخبة في المطاعة)

في مستهل عام ١٩٣٥ تقرر اختبار أصناف P.O.J. الأربعة الأكثر إنتاجا وهي (M) ، ٣٦ ، ٩٧٩ ، ١٠٥ في مزرعة المطاعة بمحوض الحرجة ذي التربة الطينية الثقيلة الغير المتجعة والغير المتأثلة المعدن (كياويا وطليعا) وكما في حالة تجارب مواعيد الزراعة الشهرية التي زرعت في نفس الوقت في هذا المحوض فمن المضحق أن عدم التجانس العظيم في مثل هذا النوع من التربة يرجع أنه ينتج خطأ تجريبيا كبيرا يتمذر معه تحليل النتائج تحليلًا إحصائيًا مغلًا . ولكن وجد أن الحاجة ماسة لمعرفة سلوك هذه الأصناف القوية في التربات الأقل مرتبة من تلك التي أجرينا عليها تجاربنا الصنفية حتى الآن . وذلك لتشجيع التربات الأولى بحالة متوسطة في مناطق القصب .

وكما في التجارب الأخرى للأصناف فقد خصص لكل صنف ثلاثة مكبرات وزعت تبعا اتفق . وكانت كل عمليات التحضير والزراعة والعرق والري والتسميد ... الخ مطابقة عمليا لتلك العمليات في زراعة شهر فبراير من تجربة مواعيد الزراعة الشهرية ( زرعت الأصناف في ٢٥ فبراير سنة ١٩٣٦ ) التي أجريت بمحوض الحرجة والتي وصفت في الباب الأول من نشرة الكاتب الفنية عن زراعة القصب . وكان المحصول السابق فولاً .

كان الانبثاق في جميع الأصناف جيدا كما كان النمو أيضا طول فصل النمو . وكان يبدو أن الصنفين ٣٦ P.O.J. و (M) ٣٦ P.O.J. أغزر الأصناف نموا بينما كان يبدو الصنف ٩٧٩ P.O.J. أضعفها . وفي آخر نوفمبر كان يظهر بوجه عام أن الصنفين ٣٦ P.O.J. و (M) ٣٦ P.O.J. أول بقليل من الصنف رقم ١٠٥ P.O.J. بينما كان الصنف ٩٧٩ P.O.J. أقل ارتفاعا من قصب المقارنة . وكان الارتفاع يتراوح بين ٣,٣٠ و ٣,٧٠ مترا .

وأجرى القطع في ٤ مارس سنة ١٩٣٧ : وكانت كل قطعة تقطع وتغص على حدة في شركة السكر بآرامنت تحت إشراف جناب المدير هنري نوس بك الذي كان تعاونه المفيد باعنا للكاتب على الاعتراف بمجمله مرة أخرى .

وفي الجدول رقم ٤ نتائج محصول السنة الأولى وكذا متوسطات الأربعة الأصناف للخمسة المحاصيل في كل من المطاعة وملوى .

وكما كان متوقفاً فإن عدم تجانس التربة سبب اختلافاً كبيراً في غلات مكررات كل صنف لدرجة تجعل الاختلافات بين متوسطات الأصناف المختلفة لا يعتد بها من الوجهة الإحصائية . إلا أن النتائج بصفة عامة تشير إلى أن الصنفين ٣٦ P.O.J. وزنبيل ( طفرته ) ٣٦(M) P.O.J. ( تحت ظروف هذه التجربة الغير متجانسة التربة ) من الممكن جداً أن يزاها من الوجهة الاقتصادية النصب الأساسى ١٠٥ P.O.J. في محصول أول سنة على الأقل . وكانت الاختلافات الكبيرة بين غلات مكررات الصنف ٩٧٩ P.O.J. مطابقة كل المطابقة لمظهر هذا الصنف في الحقل . وقد وقف جناب المستر . روش المدير القدير لمصانع السكر بجمع حمادى منذ زمن طويل على ما أعصير هذا الصنف من الصفات الممتازة وعلى محصوله المناسب في أجود الأراضي وأكثره مدى عدة سنين في مساحات متسعة نوا . ولكن سرعان ما تبين تأثيره الشديد بالأحوال الغير الملائمة عند ما زرع هذا الصنف في تربة غير متناهية الخصب . فاقطعت زراعته الآن في نجع حمادى . وفي التجارب السابقة التي زرعت في الأراضي الممتازة المخصب في كل من القصب والسكر من الثلاثة الأصناف الأخرى المشتملة عليها التجارب الحالية . كما يتضح من الخطاط مستواه في القسم الثانى من الجدول رقم ٤

وتبين لنا أرقام هذا القسم أيضاً فرصة عظيمة لمقارنة هذه الأصناف بعضها ببعض باعتبارها أصناف عامة إذ تشمل متوسطات محاصيلها مدى واسعاً من مختلف الأحوال كما تدل على التفرق العام لصنف ١٠٥ P. O. J. ويلاحظ في كل من قسمي الجدول أن أعظم فرق في نسبة السكر بين الأصناف لا يتعدى  $\frac{1}{2}$  وهو فرق لا يعتد به من الوجهة الإحصائية بأى حال من الأحوال وبالنظر إلى إيقاف الري في الوقت المناسب حيث أوقف قبل قطع محصول سنة ١٩٣٧ في المطاعة بمدة سبعة أسابيع فإن نسبة السكر في جميع الأصناف كانت عالية حتى في موسم سبب فيه الضيق دحوظاً عاماً في محاصيل السكر .

#### الخلاصة

تدل الخبرة مدى الخمس السنوات الأخيرة على أنه من بين التسعة الأصناف المستوردة التي تدبنا عنها نتائج كافية يمكننا من استنتاج خلاصة قاطعة عنها — لا يوجد إلا الأصناف (M) ٣٦ P. O. J. و ٣٦ و ٩٧٩ P. O. J. التي يمكن اعتبارها قريبة من الصنف المفقود ١٠٥ P. O. J. لدرجة خليفة بإجراء اختبارات أخرى عليها . أما باقي الأصناف المذكورة فقد برهنت بصفة قاطعة على أنها قليلة القيمة من حيث إنتاج القصب والسكر في مصر .

### جدول رقم ٤ — تجارب الأصناف المنتجة في المطاعة ( قصب السنة الأولى )

الصنف	محصول القصب في القطعة	محصول القصب في الفدان		نسبة السكر في الفدان بالكيلو	محصول السكر
		طن	قنطار		
P.O.J. ١٠٥	٦٩٩٠	—	—	١٤,٧٨	—
" ١٠٥	٨٣٩٠	—	—	١٣,٩٣	—
" ١٠٥	٨٣٢٠	—	—	١٣,٩٨	—
متوسط ١٠٥ P.O.J.	٧٨٦٧	٤٧,٣٠٠	١٠٥١	١٤,٣٣	٥٣٨١
P.O.J. ٣٦ (M)	٨٤٨٧	—	—	١٤,٨٢	—
" "	٧٧٦٠	—	—	١٤,٣٩	—
" "	٨٥٣٠	—	—	١٤,٠٩	—
متوسط ٣٦ (M) P.O.J.	٨٣٥٩	٤٩,٥٥٤	١١٠٣	١٤,٤٣	٥٦٩٩
P.O.J. ٣٦	٧٩٠٠	—	—	١٤,٧٩	—
" ٣٦	٩٥١٠	—	—	١٤,٠٦	—
" ٣٦	٨٢٩٠	—	—	١٤,٦٢	—
متوسط ٣٦ P.O.J.	٨٥٦٧	٥١,٤٠٠	١١٤٤	١٤,٤٩	٥٩٦٢
P.O.J. ٩٧٩	٥٣٥٠	—	—	١٥,٢٢	—
" ٩٧٩	٨٤٢٠	—	—	١٣,٧٧	—
" ٩٧٩	٧٨٦٠	—	—	١٤,٤١	—
متوسط ٩٧٩ P.O.J.	٧١٧٧	٤٣,٠٦٠	٩٥٩	١٤,١٣	٤٨٦٦

### ٢ — متوسطات الخمسة المحاصيل في المطاعة وملوى

P.O.J. ١٠٥	—	٤٨,١١٦	١٠٧١	١٣,٤٩	٥١٥١
P.O.J. ٣٦ (M)	—	٤٦,٤٨٢	١٠٣٥	١٣,٦٥	٥٠٧٧
P.O.J. ٣٦	—	٤٥,٠٣٥	١٠٠٢	١٣,٩٩	٥٠٤٤
P.O.J. ٩٧٩	—	٤١,٦٤٥	٩٢٧	١٣,٧٣	٤٥٥٣

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT

---

Technical and Scientific Service

(Botanical Section)

---

—BULLETIN No. 164—

---

# THE SPACING OF SUGAR CANE IN EGYPT—AND ELSEWHERE

BY

ARTHUR H. ROSENFELD

*Government Sugar Cane Technologist*

(Recommended for publication by the Publication Committee of the  
Ministry of Agriculture, which is not, as a body, responsible for the  
opinions expressed in this Bulletin)

Government Press, Bulâq, Cairo, 1936

Government Publications are on sale at the "Sale  
Room," Ministry of Finance. Correspondence  
relating to these publications should be addressed  
to the "Publications Office," Government Press,  
Bulâq, Cairo.

Price - - - - - P.T. 7

### Typical Layout of Spacing Experiment

1	1 <sup>1</sup> <sub>2</sub>	1 <sup>3</sup> <sub>3</sub>	1 <sup>4</sup> <sub>4</sub>	1 <sup>5</sup> <sub>5</sub>	1 <sup>6</sup> <sub>6</sub>	1 <sup>7</sup> <sub>7</sub>
A	B	C	D	A	B	C
2	2 <sup>8</sup> <sub>8</sub>	2 <sup>9</sup> <sub>9</sub>	2 <sup>10</sup> <sub>10</sub>	2 <sup>11</sup> <sub>11</sub>	2 <sup>12</sup> <sub>12</sub>	2 <sup>13</sup> <sub>13</sub>
C	D	B	A	C	D	A
3	3 <sup>14</sup> <sub>14</sub>	3 <sup>15</sup> <sub>15</sub>	3 <sup>16</sup> <sub>16</sub>	3 <sup>17</sup> <sub>17</sub>	3 <sup>18</sup> <sub>18</sub>	3 <sup>19</sup> <sub>19</sub>
B	A	D	C	B	A	C
4	4 <sup>20</sup> <sub>20</sub>	4 <sup>21</sup> <sub>21</sub>	4 <sup>22</sup> <sub>22</sub>	4 <sup>23</sup> <sub>23</sub>	4 <sup>24</sup> <sub>24</sub>	4 <sup>25</sup> <sub>25</sub>
D	C	A	B	D	C	A

Transcript of 2016-09-17  
 2016-09-17 14:00:00

Size of Plot — 4 Kirsats (1/4th Acre)

تعداد کل اساسی کمیته تأییدیه تقدیرات (ولیسٹ عملیاتی تخفیفہ)

Per liter on basis of uniform quantity per foddan (not on row basis) :

1

— 1 —

2000

11

# Contents

	Page
Introductory	1
Late Growth and Sugar Yield	2
The "Light and Air" Theory of Spacing	4
Analogous Trials with Sugar Beets	9
Cane Spacing Experiments in other Countries	10
Weed Control and Soil Stirring	11
Dense Population and Cheap Labour	19
Spacing Trials in Egypt	22
The Matnaba and Malawi Experiments	23
The Kom-Ombo Experiments	28
Conclusions	33
Summary	40
Bibliography	42



## THE SPACING OF SUGAR CANE IN EGYPT —AND ELSEWHERE

BY

ARTHUR H. ROSENFELD

### INTRODUCTORY

For each kind of plant and each type of soil there must necessarily exist a theoretical maximum of agricultural yield obtainable or, in other words, each class of soil in each and every climate should be capable, under ideal conditions, of producing an exact maximum of, let us say well-developed sugar canes for example, and this maximum can be obtained only under optimum food supply, moisture and climatic conditions and with perfect cultivation. Also, most naturally, this maximum will be secured only through such an ideal spacing of the plants as will allow each stool to attain its optimum development and each unit of area to produce the largest possible number of thoroughly developed canes. Hence, it is logical that too small a space between our cane stools must inevitably result in too large a number of subnormal canes, while excessively wide spacing will probably produce splendid individual specimens, the reduced number of which will not only fail to give the tonnage obtainable from the theoretically ideal number of plants of normal development, but will vastly stimulate the continuous production of suckers (*minions*), with the consequent difficulty of harvesting canes of any reasonable average age or sugar content. Just ten years ago the writer (92)\* in an article somewhat anomalously entitled "How Old is Ten-Months-Old Cane?", emphasized the fact that in subtropical countries the harvesting of a large proportion of late suckers, however well developed they may be physically, can be just as disastrous in its effect on average sugar content and purity as unseasonably late planting of the fields. This latter effect has been recently brought out in the writer's "Optimum Planting Dates for Sugar Cane in Egypt" (101).

In subtropical countries such as Egypt, Louisiana or Tucuman, where cane does not normally have a growing season of more than eight to nine months, it is of the utmost importance that the largest possible proportion of all individual canes harvested represent the

\* Numbers in parentheses refer to bibliography at end of bulletin.

maximum period of development. For this purpose quickly germinating and prolifically stooling varieties are necessary, as well as an abundance of seed cane, in order to have the rows quickly filled and what Prof. Earle (33) calls the "place in the sun" occupied by an even stand of cane quite early in the short season, since late suckers cannot possibly reach a manufacturing sugar content and purity and, while adding weight, have an extremely bad effect on the general purity of all the cane at crop time. There is no doubt in the writer's mind that, consciously or unconsciously, the practice in vogue in all of the above-mentioned countries of planting much more thickly than is the case in the genuine tropical countries with normal growing seasons has arisen from just this necessity of having the great majority of canes at harvest of as nearly the maximum age as possible. Nor is there any doubt that the same principle of uniform ripening will apply in tropical countries as well, it being undoubtedly the case that were all canes cut, let us say, at sixteen or eighteen months in Cuba or Porto Rico, of exactly these ages instead of having varying proportions of ten, twelve and fourteen months' cane, the already splendid sugar contents and purities would be surprisingly bettered.

### Late Growth and Sugar Yield

In conducting varietal experiments with sugar cane the writer has for a great many years made frequent germination counts with a large number of varieties and has always been impressed with the high proportion of very young canes, particularly with some varieties which must be sent to the mills each crop, thus enormously reducing the potential sugar value of the average of the older canes. As the variety of sugar cane principally grown in Egypt is the *P.O.J. 105* erroneously known as "Américaine," some counts which the author (88) made on a sister cane, *P.O.J. 234*, in comparison with Striped *Baladi* (Louisiana Striped) at the Tucuman Sugar Experiment Station in the Argentine Republic some years ago may be pertinent to this discussion. This cane was planted in July—it will be remembered that the seasons south of the equator are exactly the reverse of ours in point of time, July in Argentina corresponding to January in Egypt—and beginning about the middle of September, or two months from the time of planting, a count was made each week of the number of sprouts above ground in one row of 100 metres in length until the time when suckering began in abundance and further counts were impractical.

The following table gives the results of these counts for the various dates in terms of sprouts above ground per row of 100 metres, the distance between the rows being two metres.

TABLE I.—GERMINATION COUNTS

DATE	Variety	
	P.O.J. 234	La Striped
September 18	196	66
" 25	331	150
October 2	131	186
" 9	196	210
" 16	313	224
" 23	618	270
" 30	701	301
November 6	856	312
Crop Sept. 6	1,315	561
Canes under 8 months age, %	35	15

On account of an exceptionally open winter the year these counts were made, there was some germination and development in August, which is not usually the case in Tucuman, and, as growth practically stopped in the early part of June, we may say that this cane had the exceptionally long growing season for Tucuman of about ten months. The crop figures, however, compared with the count on November 6, show us that over one-third of the P.O.J. canes harvested had less than eight months of actual growth, while almost one-half of the Louisiana Striped (*Baladi*) was below that very immature age.

One of the marked advantages of the closely planted canefields of Puerto Rico over those of the neighbouring island of Cuba, where the rows average easily twice as far apart, is that the cane closes fairly quickly and that enough stalks are produced from the first crop of suckers to fairly well fill the rows and eliminate the successive generations of suckers which are always produced by vigorous canes when spaced widely apart, this signifying, naturally, a more even ripening of the cane than where several generations of suckers are harvested with the matured canes. How deleterious to the juices these late suckers are considered in all of the West Indies may be deduced from the following very recent statement by Agr. Chemist S. J. Saint\* of the Barbados Dept. of Science and Agriculture:—

" Few October shoots made their appearance during 1933 and this probably accounts for the rapid maturity and high sugar content of the cane which was noticed during the crop season."

\* Manurial Trials with Sugar-Cane. Barbados Agr. Jour., IV, 1, p. 3, 1935.

Cross (19) made some interesting analyses of canes from the same field at intervals of one week, beginning when the stubble was approximately eight months old, which figures show very graphically the values to be expected, comparatively speaking, from cane at different ages, as well as the effect which must irretrievably follow the harvesting of canes in various stages of immaturity. The writer has selected from Cross' voluminous figures, in order not to unnecessarily prolong this article, bi-weekly analyses of the P.O.J. 234 variety at the ages indicated in Table II.

TABLE II. — RIPENING OF P.O.J. 234 CANE IN TUCUMAN.  
THIRD RATINGS. JUICE ANALYSES.

Age Months	Brix	Sucrose	Glucose	Purity
8	17.67	11.90	0.57	87.33
8.5	18.38	16.11	0.15	87.61
9	18.38	16.22	0.29	88.24
9.5	18.27	16.59	0.13	90.80
10	18.75	17.17	0.13	91.57

If we now compute the analyses of the P.O.J. 234 in Table II with the figures given in Table I, showing the proportion of canes of the different ages indicated above which we may normally expect to find in a field of cane, it is easy to visualize the effect of either decreasing or increasing this proportion of immature canes. Undoubtedly if by any means we can increase the average age of the canes harvested from any field, we will have correspondingly increased the average sucrose content of those canes, while, conversely, if this average age is reduced through prolific midsummer suckering there is no possible way in a subtropical country of avoiding a corresponding lowering of the average sugar value of those canes.

### The "Light and Air" Theory of Spacing

Advocates of extremely wide spacing of sugar canes as exemplified by the old Zayas and Abreu system in Cuba, whereunder cane was planted in holes from nine to twelve feet apart, have always insisted on the dependance of cane on large amounts of light and air, the same idea that evidently animated Newlands (81) when in 1869, in his then standard treatise on sugar-cane culture, he wrote:—

"The importance of constant trashing cannot be too strongly insisted upon, as it admits to the plant that abundance of light and air which is absolutely essential to the production of a heavy crop of sugar."

The abandonment of this very process of periodical stripping off of the lower leaves of the growing cane, which was formerly so much in vogue in such advance sugar-producing countries as Hawaii, Puerto Rico and Queensland, points very strongly towards the fallacy of such extreme wide-spacing recommendations, and one of the most useful accomplishments of the experiment stations of those countries has been the demonstration, not only of the uselessness of that method of admitting light and air to a plant which stands in no need of such large quantities of those elements for the stalks and lower leaves, but of the actual damage caused by this process and the financial losses which it has exacted.\* We should never forget that the stalks of sugar cane are nothing more than the warehouses of the plants, wherein the products elaborated by the chemical laboratories of the leaves are stored up, and that no amount of exposure of these warehouses to light and air is going to change the composition of the products stored therein. The amount the surface exposure — of light and air over an acre of cane is exactly the same whether the cane is planted in rows two feet apart or in holes twelve feet apart, and, as the processes incident to the conversion in the leaves of the plant food of air and soil into the sugars which we desire to harvest are carried out largely in the newer and upper leaves, there would seem to be no good reason for going to the expense of admitting more light and air to those parts of the growing plant which do not require them in such abundance, to say nothing of the actual damage that was frequently caused when this process of stripping was employed, through injuries to the cane by plucking leaves still performing their laboratory duties.

Eckart (37), in three exhaustive series of experiments at the sugar planters' experiment station in Hawaii, thoroughly demonstrated the uselessness and financial loss from stripping in Hawaii, finding that the percentage of sucrose was higher in the juice of the unstripped canes, that the unstripped canes gave considerably higher tonnage yield in the field than the stripped canes and that, at harvest time, there were always considerably more dead canes in the stripped than in the unstripped plots. In other words, stripping was not only not advantageous to the cane, but on the contrary, was definitely detrimental. Since the publication of Eckart's experiments stripping in Hawaii has been practically abandoned.

\* Boname (11) in 1888 published some experimental results tending to show that where only the entirely dead leaves were removed in Mauritius an increase of about one point in the sugar content was obtained, but where, as was usually the case, a goodly number of rather green leaves were also torn off, a corresponding drop in sugar content, as compared with integrity of check plots, took place.

Crawley (17) carried out a number of stripping experiments at the Insular Experiment Station of Puerto Rico from 1912 to 1914 and concluded that stripping caused "a waste of time and money." Guánica Central, about the same time, conducted several experiments in the San German Valley, where at that time it was the general custom to strip all cane, to determine the results of stripping from a sucrose and purity standpoint. In each of these experiments it was found that the juice from the unstripped cane was higher in sucrose and purity than that from the cane that had been stripped. In a letter received from the management, it was stated:—

"We do not believe that any benefit is derived from the stripping of cane, and are convinced that a good deal of injury may be caused to the cane by the injudicious tearing off of the green and partly dried leaves.\* We some years ago issued a standing order that this work was to be discontinued on all of our properties, and I am sure that we have lost nothing by so doing. On the contrary, we have saved an annual expenditure of an average of about \$ 2 per acre, the price usually paid for this class of work, over a total of about 15,000 acres in cultivation by this company, or a total of \$ 30,000 per annum."

This letter is but indicative of the general abandonment in Puerto Rico of the process of "admitting light and air" through stripping.

Another interesting case in this regard is that of Queensland, whose sugar planters' main protest against the much discussed "white Australia" legislation was based on the ground that white men were incapable of carrying on the onerous and necessary work of stripping the cane. It was found, however, that the abandonment of this process not only failed to lower the yields of cane and sugar per acre, but saved the sugar men a considerable sum which they had until then been spending on an entirely useless and largely ornamental system!

Since stripping and extremely wide spacing had the same fundamental objective of admitting additional light and air, it would appear that the demonstration of the negative value of stripping had also established the fallacy of extraordinarily wide spacing of cane. Nevertheless in 1924, ten years after the publication of Crawley's categorical results, we find Calvino (15) in Cuba advocating the

"Abreu system" of planting in holes twelve feet apart and Hind (13) in the Philippines writing:—

"The hole (10 feet apart) method of planting admits more light and air to the stools, which, doubtless, has a beneficial influence on purities."

Mr. Hind furnishes no data from his own or anyone else's experiments which would indicate that this statement is anything more than an opinion, whereas experiments carried out in Louisiana by Dr. Stubbs, in Cuba by Earle, and by eminent investigators in other countries, have rather definitely proved that wide spacing and the admission of light and air do not by any means necessarily signify improved purities and sugar contents of juices. Some of these experiments will be discussed in the pages which follow.

The "Abreu system," be it said *en passant*, is nothing more nor less than the old "Zayas system," which Professor F. S. Earle some thirty years ago demonstrated to be thoroughly impractical in Cuba, where it was then quite popular, with the addition of two very impractical features. The "Zayas system" consisted in planting in holes 9-12 feet and harvesting only the matured canes from each stool, leaving the suckers for cutting the following crop, a system of harvesting hardly applicable to Cuban conditions and epitomised by Mr. Earle himself as "fine in theory but impossible in practice." Mr. Earle, after careful trial, found that, with the "Zayas system," not only were the yields considerably less than from cane planted at a normal distance, but that the expense was vastly greater. Naturally, at such a distance cane would never else and constant cultivation would be required throughout the entire year to keep down weeds and grass. The worst feature of the system, however, according to Earle, was that the cane was not sufficiently shaded—in other words it seems to have had a plethora of "light and air." It suffered severely from sunburn and "especially on old worn soils, it failed to ratoon well, these plantings going out earlier than those at normal distances"—an important consideration and the substantiation of an observation often made by the writer, *i.e.* that very wide spaced cane runs out much more quickly as a general rule than cane planted at more normal distances, thus again demonstrating that sugar cane is a "sociable" plant.

The two added impractical features mentioned above as characterising the "Abreu system" are the even wider spacing than that advocated in the "Zayas system" and the germination of the seed before planting, the latter feature characterised by Prof. Earle as not altering the fundamental unsoundness of this wide spaced planting, but simply adding "one more impractical feature" (33).

\* Deere (23), stating that the premier alleged reason for the process was the exposure of the cane to the effect of light and air to hasten maturity, concludes:

"The ripening effect is small and the damage done by the labourers passing through the field on more than one effect any possible advantage..... particularly when other than quite dead leaves are removed, as then the way may be prepared for the attacks of fungi."

As to subtropical countries Cross (19) has recently published some strikingly illuminating data obtained from experiments comparing the results from the planting of P.O.J. canes in holes and in furrows, the holes being the same distance apart as the furrows normally employed in the Argentine (metres 1.70 to 1.90). The enormous yield losses from hole planting shown by these plant cane results tend to decrease if the fields are carried to fifth or sixth year cane, but, as more than oneatoon crop is seldom crop in Egypt, we give in Table III Cross' first year results only.

TABLE III.—COMPARISON OF YIELD AND QUALITY OF CANE PLANTED IN HOLES AND IN FULL ROWS.

Method	Stalks		Tons Cane per Hect.	Juice Analyses				Kilograms Sugar per Hect.
	per 100 in Row	Weight Grams		Brix	Sucrose	Purity	Revised Sugar %	

#### I.—P.O.J. 36

Holes	726	130	18.21	16.83	13.51	80.15	12.22	1,560
Full Rows	1,153	650	55.91	17.88	11.53	81.26	13.19	5,165

#### II.—P.O.J. 213

Holes	706	290	10.90	15.50	12.00	7.74	10.60	808
Full Rows	1,889	120	12.21	17.12	13.77	8.013	12.43	3,673

#### III.—Averages of Two Varieties.

Holes	716	300	14.57	16.17	12.77	78.93	11.41	1,181
Full Rows	1,671	535	19.08	17.50	11.15	80.85	12.81	4,419

These figures literally speak for themselves. Not only has the hole-planted cane produced only 43% as many harvested stalks per row, but their average weight—due to the large proportion of suckers—is only two-thirds of that of the canes from the normal row planting, with the result that the latter produced well over three times the tonnage of cane and almost four times as much sugar per acre as did the cane planted in holes. A glance at the comparative juice analyses certainly lends no colour to the hypothesis that additional light and air result in richer canes any more than they produce sugar beets of higher sucrose content, if we may judge from a recent study by Lindner (63) of the influence of stand on the yield and composition of this other important sugar crop.

## Analogous Trials with Sugar Beets

Spacing experiments were made at Kleinwanzleben in two successive years with a high yield strain (E) and a high sucrose strain (ZZ), the distances between the plants being such as to give 100,000, 80,000 and 60,000 beets per hectare. In 1933 the yield of beets, polarization and sugar yield of the ZZ strain were little affected by spacing, whereas the E strain gave smaller yields at the wider spacings; in 1934 both strains yielded best with the narrower spacings. In both years, also, the quality and workability of the two strains were *unfavourably* influenced by the wider spacings—the sucrose content and the purity quotient decreased and the percentage of melassigenic ash and nitrogen compounds increased, which signified increased crystallization difficulties and diminution of factory yield.

Of interest here are the figures recently published by Dahlberg (21) showing the actual stands and yields of beets in fields supplying a dozen Swedish sugar factories in 1932 to be as follows:—

TABLE IV.—STANDS AND YIELDS OF SWEDISH SUGAR BEETS

Beets per Acre (thousand)	Tons Beets per Acre	
	Production	Increase
16	10.79	—
20	11.36	3.57
24	16.58	2.22
28	17.97	1.39
32	18.77	0.80
		7.98

A stand of 32,000 beets per acre (80,000 per Hect.) which is the standard in Sweden, would correspond to spacing of slightly under eleven inches in rows eighteen inches apart. It is undoubtedly true that very close spacing yields beets that are smaller than those wider spaced but the increase in yields as a result of the augmented number of plants would appear to more than offset this reduction in average size. The little table shows a logical symmetry in the diminishing yield increments as the spacing becomes narrower quite in consonance with the law of diminishing returns and with

the results of a very recent series of experiments published by Van Ginnekin (4) in Holland:

TABLE V.—STANDS AND YIELDS OF DUTCH SUGAR BEETS.

Beets per Hectare (thousands)	Quantals per Hect.	% sugar
10	461.5	16.51
63	514.3	17.46
101	521.7	17.48
160	511.4	17.51

Finally, as regards beets, Jansen (47) has just published the results of a spacing census in the Utah district of the United States shown in Table VI, and Brewbaker (13) gives similar figures from Colorado.

TABLE VI.—STANDS AND YIELDS OF AMERICAN SUGAR BEETS.

Spacing in Row (inches)	Tons Beets per Acre
39	7.06
25	11.01
20	13.73
17	11.26
11	17.28

Experience all over the world would appear, then, to have verified the obvious conclusion that maximum beet yields cannot be obtained with wide spacings. The mathematical relation between yield and density of stand was first demonstrated by Senecik in 1922 and since that time there has been a visible awakening of beet growers to the verity and economic implications of this principle.

### Cane Spacing Experiments in Other Countries

The classic distance experiments of Stubbs (102) in Louisiana with Purple and Striped Cheribon (our *Baladi* canes) were initiated in 1888. Table VII gives his composite results from eighteen crops and shows that the 90 centimetre rows gave uniformly the best

tonnage and the widest spaced ones the poorest. It is notable, too, that the latter have produced cane juices of the lowest total solids and sucrose content and purity and the highest invert sugar ratio. Having in mind the necessities of mechanical cultivation of cane, in which Louisiana was a pioneer, and considering the increasing number of light cultivations with the later closing of the willening middles, Stubbs concluded that the logical procedure indicated by these results was to select the narrowest possible spacing consistent with the facile entrance to the middles of adequate cultivating implements.

TABLE VII.—COMPOSITE RESULTS OF EARLY LOUISIANA EXPERIMENTS.

Width Middles	No. Stalks	Av. Weight Stalks	Cane per Hectare	Chemical Analyses of Juices				No. Crops
				Brix	Sucrose	Glucose	Purity	
Motres	Hectare	Grams	Mot. Tons					
0.90	75,010	1,300	85.0	14.2	10.7	1.53	75.35	14
1.20	68,150	1,250	79.2	13.9	10.4	1.62	74.82	14
1.50	60,800	1,300	82.5	14.0	10.6	1.54	75.72	18
1.80	66,334	1,300	82.1	14.0	10.7	1.66	76.43	12
2.10	66,371	1,250	82.0	14.3	11.0	1.66	76.92	6
2.40	62,286	1,350	78.1	13.8	10.3	1.72	74.64	6

Up to the time of the above-described experiments most Louisiana planters employed rows 6 ft. apart, but 5 ft. middles (metres 1.50) were almost universally adopted after the results of these extensive tests had been published and discussed by Stubbs.

There is a fairly steady increase in number of stalks per hectare, as is to be expected, as the width of middles decreases and the number of rows per hectare increases, and in this connection Stubbs makes an interesting and pertinent observation. He found, after counting the number of canes per row at the time of throwing the first dirt to the cane, at lay-by and at crop, that many canes perish due to lack of space for development. This was particularly notable in the stubble (ratoon) cane with narrow middles, the counts demonstrating that 50% of these canes had died before reaching maturity. Many canes measuring 3 ft. in length were found dead at crop time from no other apparent cause than the lack of room for growth. This observation explains how it often occurs that a poor stand of plant cane may produce fairly good stubble, particularly with strongly ratooning varieties.

In Hawaii, R. E. Blouin (9), after his 1901 experiments with the Lahaina (*Cana Blanca*) cane, planted at 4, 5, 6 and 8 ft., showed that the 5 ft. rows (met. 1.50) produced 60 tons more cane per hectare than the 6 ft. ones, which occupied second place in those experiments, concluded that the Hawaiian planters, who almost invariably employed 5 ft. rows, had no reason whatever for deviating from this practice. Reynoso (86) gives the ideal distance for Cuba as  $5\frac{1}{2}$  ft. and Boname (11) concluded that  $4\frac{1}{2}$  to 5 ft. was best for Guadeloupe.\* Large sub-station experiments made under the writer's (91) direction in Tucuman province, Argentina, with Cheribon Striped and Purple, with rows at 5, 6, 7 and 8 ft., showed by far the best yield for the 5 ft. (M. 1.50) rows, which gave 24 metric tons more cane per hectare than the 6 ft. ones, and a gradual decrease in yield per hectare as the rows were placed farther apart, the 8 ft. rows giving by far the smallest yield. A calculation of the financial gain, always the prime consideration in any agricultural experiments, with the 5 ft. rows over those at 8 ft., based on the price of cane to the planter at the time the experiments were made (1913), showed an advantage of \$ 168 m/n per hectare.†

In 1917, 1918 and 1919 the writer (90) conducted a large series of experiments covering some 50 hectares on the Santa Ana estates, which he was then superintending, in the Argentine province of Tucuman, near where the above mentioned sub-station distance experiments had been located, with 5, 6 and  $6\frac{1}{2}$  ft. middles, the 5 ft. rows averaging over 20 tons more cane per hectare per annum than the wider spaced rows. These experiments were made with the Java seedling, P.O.J. 228. The sub-station tests at Monte Bello and the Santa Ana tests, being both on a very large scale and in the same district, may quite properly be averaged, the results for the 5 and 6 ft. rows being shown in Table VIII.

TABLE VIII.—AVERAGE RESULTS FROM FOUR CROPS AT MONTE BELLO AND SANTA ANA. 1913-1917.

Metres	Width Middles Feet	Metric Tons Cane p. Hect.
1.50	5	55.7
1.80	6	42.8

\* In Natal the average distance between the cane rows is Met. 1.50 and in Peru (90) Met. 1.35. In Trinidad Met. 1.50 is the rule. Fowler (10), after trials of both P.O.J. 2723 and P.O.J. 2574 at Metres 1.20, 1.50, 1.80 and 2.10, has recently stated, "The spacing experiment seems to indicate that . . . the closer the lines are spaced the heavier the yield."

† In 1913 the Argentine paper peso was worth 8½ ptaestros (42½ U.S. cents.)

Experiments at the Tucuman station were commenced in 1910 under the direction of R. E. Blouin and continued by the author until 1916. Since that time Dr. W. E. Cross (19), who succeeded the writer as director of that institution, has continued the experiments up to the present time. The first series, with rows 1.20, 1.50, 1.80, 2.10 and 2.40 metres apart, for Louisiana Purple (*Baladi*) cane, was carried through second year cane. The M. 1.20 rows produced the largest tonnage of cane and the two widest spaced series by far the smallest. Blouin (10) concluded from the results of these tests that, *considering the important question of proper mechanical cultivation*, the distance between cane rows in the province of Tucuman should not be less than 5 ft. (M. 1.50) nor more than 6, recommending  $5\frac{1}{2}$  ft. (M. 1.85) for the type of cane (*Baladi*) then in use.

About this time, however, the heavily-stooling, rapid-growing and somewhat frost-resistant Java canes, P.O.J. 36, 213 and 228, had begun to attract wide attention in the Argentine sugar district, and in 1915 the author (87) commenced a series of distance experiments with the P.O.J. 36 variety. The following year another series was initiated with the P.O.J. 213, a variety of very distinct type of growth from the P.O.J. 36, the latter being much more erect and having much less tendency to lodge late in the season in times of heavy rainfall. In 1916, also, experiments were begun with the Uba and with another Japanese type (*S. sinense*) of cane known as Zwinga.

The P.O.J. 36 tests were carried through fifth year cane and the others through fourth year, the average results from the seventeen crops showing a slight cane tonnage advantage for the narrower spaced rows. Again planting distance seemed to exert no appreciable influence on juice quality and Cross (19), reviewing these experiments from the time of their inception a decade previous, arrived at conclusions identical with those of Stubbs already mentioned, viz.:

"Summing up the results of all these experiments, it would appear that in order to obtain most economically the largest quantities of cane and sugar per hectare, the distance between the rows should be the minimum that will permit of adequate cultivation with implements."

In Queensland, Australia, too, the fetch of mechanical cultivation is probably responsible for the fact that the standard planting distance is still 1.35 metres, although the experiments of thirty years at the Mackay Sugar Experiment Station have shown, in the words of Keogh (43), that:

"In all these trials reduced spacing between rows showed to advantage in return of cane and sugar per acre, with only a slight

lowering of polarization in cane ..... Therefore, with the present width between rows the land is exposed to the drying action of the sun and wind ..... and narrower widths between rows would be an advantage."

The first trial at the Mackay Station was commenced in 1906 and continued through fourth year cane, the spacing varying from Met. 1-20 to 2-10. Strange to say, it was in the first experiment only that the Met. 1-20 was tried, the later trials being with distances from Met. 1-50 to 2-10 and Met. 1-32 to 2-10. The average results from these trials are condensed into Table IX.

TABLE IX.—RESULTS FROM CANE SPACING EXPERIMENTS IN QUEENSLAND  
(YEARLY AVERAGES)

Width Middles Metres	Seasons 1906-00		Seasons 1916-17		Seasons 1923-24		Season 1934*	
	Tons Cane per Acre	Sucrose %	Tons Cane per Acre	Sucrose %	Tons Cane per Acre	Sucrose %	Tons Cane per Acre	Sucrose %
1-20	61.6	15.69	—	—	—	—	38.9	15.1
1-35	—	—	—	—	24.86	16.59	35.2	15.2
1-50	52.1	16.11	39.77	19.06	22.98	17.01	—	—
1-80	47.7	15.24	33.32	19.49	20.27	16.96	—	—
2-10	45.3	15.81	30.51	19.35	15.77	17.08	—	—

### Weed Control and Soil Stirring

The present century has witnessed enormous modifications in both theory and practice as applied to cultural operations in the cane field, due largely to the fact, as suggested in the title of a recent thoughtful paper by Agee (2), that increasingly in this generation "The Sugar Planter Looks at Botany." Outstanding amongst these developments is the gradual reshaping of ideas concerning the necessity of soil stirring in cultivation. Until comparatively recently much more emphasis was placed on the importance of continuous

\* Results from the spacing experiments made by Pringle (82) at the southern Queensland Sugar Experiment Station, Bundaberg, in which he tried out a still narrower spacing of Met. 1-13 in comparison with the standard Met. 1-35 and obtained a tonnage increase of over 10 percent.

It will be noted from the above sucrose figures that there is absolutely no significance fluctuation with the various spacings. In the first experiment the maximum is at the Met. 1-50 spacing, in the second at Met. 1-80, in the third at Met. 2-10 and in the last at Met. 1-35. Similarly, as regards the minimum sucrose content, in the first series it is found at Met. 1-80, in the second at Met. 1-50, in the third at Met. 1-35 and at Bundaberg at Met. 1-13, just 1/10th of a point lower than that of the cane planted 1-35 M. apart.

soil movement from the standpoints of the effects of a maintained fineness of division on the availability of the plant food therein or retarding capillary loss of moisture by maintenance of the classic "dust mulch" than of that of weed control *per se*. But it a proper state of tilth is obtained in the most logical place in our field operations, i.e. in the *soil preparation*, and the packing effect of heavy rains is minimized by closer planting (which at the same time means less evaporation and earlier shading out of most weed growth, since the period of weed control ends with the closing in of the cane and its consequent ability to contend with the weeds without material human aid), it seems probable that we could dispense with many soil stirrings which too often are merely correctives—and highly inefficient ones at that—of our sins of omission during the preparation period. Too often, in these days of mechanized agriculture, is the occidental planter a slave of his implements and the distance between his cane rows predominantly determined by the space necessary for his cultivation machinery and its means of propulsion, whether animal or mechanical. And all too frequently, in figuring the economy of mechanical over manual cultivation, the progressive occidental planter forgets that he is cropping far less than the optimum number of rows per acre and that with those rows more closely spaced the cane would close in much more quickly and thus automatically eliminate the necessity of several of his late mechanical cultivations and one or two hoeings: "He who gains time gains everything" was the maxim of Frederick the Great, and Agee (3), in his masterly discussion of "Plantation Strategy", after quoting von Moltke's definition of Strategy as "the art of using available resources to attain a definite objective"—in our case the best possible economic return from each feddan of sugar cane—says:—

"We hoe weeds that the cane may grow and produce sugar. These are means to an end. When the cane attains a certain age, weed control continues without expense by reason of the shade produced by the cane itself...Irrigation, fertilization, weed control, each of them in all their varied forms, are operations, tactical operations of sugar production. The plan by which we select the type of each best suited to our needs and combine and modify them to fit and function as an unified whole to accomplish our objective, is strategy...There can be no doubt that the strongest influence in human affairs is precedent. It should be strategy..."

"In weed control we obviously contend against an adverse factor. The form of control that is economically best is not easy to decide.

\* This *certain age* or size will vary materially with the width of the middles (author's note).



Here come into play the values of cost and effectiveness between the several means,....hand operations, implements, poison sprays...as they relate to different forms of weeds; values as they relate to cane varieties in their weed-suppressing characteristics; values as they relate, positionally, in point of weeds within the cane line, to be reached by hand measures, against weeds between lines to be dealt with mechanically, values, again positional, in point of time in relation to the "Closing in" period...

"Under the theory that soil does not need to be stirred (a theory that has much supporting evidence, albeit some strong opponents)... weed control attains a pivotal position. Can we, by mulching and resourceful fertilization to enhance quick "closing in," practically eliminate expense of weed control, and have as the one important field cost up to harvest that of feeding the cane plant? What are the environmental and varietal requisites for such a strategic plan? Underlying strategy there are simple fundamental principles of far-reaching importance. Does not all that we do begin and end with positional values of the pieces on the board and plan of action based upon these values?"

We have quoted so extensively from Agee's thought-provoking lecture because his philosophy is not only cognate and refreshing, but would appear to have decidedly practical application to the whole gamut of plantation problems and practice. In the words of that master chess strategist, Emmanuel Lasker:

"The reason for a plan is a valuation, the reason for a valuation is again values."

Closely related to the question of frequent soil stirring is that of root pruning. Everyone concerned with sugar cane cultivation has observed that cane several months old always shows visible temporary signs of distress from the root tearing incidental to anything but the most superficial of cultivation (in the Argentine the peons say that the cane "resents" cultivation). In this connection it is interesting to cite some observations made by Agee and Naquin (1) in Hawaii, which demonstrate the extent of the root system of even very young cane and the danger of impairing it through careless use of implements when practising deep cultivation too late in its stage of development. By means of a clever method described in Bull. 127 of the Kansas Experiment Station, the root systems of sugar canes were examined in such a manner as to preserve the original positions of the roots. Quite contrary to the usual supposition, it was found that cane of less than three months growth

had developed roots intermeshing across middles 1½ metres wide and generally distributed throughout some 38 cms. of cultivated soil depth, some of the roots penetrating as far as 75 cms. into the soil, half of which showed no evidence of having ever been artificially stirred. From these observations it is concluded:

"It would therefore seem that cultivating implements cannot be employed to best advantage without due consideration of a root growth such as is illustrated. *The stirring of the surface soil about growing cane would seem almost inevitably to result in more or less root destruction.* When the benefits of stirring the surface soil are such as to more than compensate for this root injury—well and good. However, it is important to bear in mind that counteracting influences are at play, so that care must be taken that the ill-effects do not offset the desired ends."

These observations have been confirmed and similar conclusions reached in almost all of the cane-growing countries—by Lee (59) and Weller (62) in Hawaii, Jensen (48) and Gonzalez (42) in Cuba, Venkatraman and Thomas (111) in India, Lee and Medalla (61) and Bissinger (8) in the Philippines, Hardy\* in Trinidad, Kulescha (57) in Java and others—by the use of ingenious new methods or adaptation of those used by former workers. All seem to indicate that the main consideration in stirring the soil around growing cane is the control of the weeds competing for the cane's food rather than that of rendering this food more available to the cane through fineness of division of the soil in which its roots are developing.

Investigations into the theory and practice of maize cultivation, which is correlated to that of cane as far as these particular points at issue are concerned, also point to the same general conclusions, the illuminating work of Gates and Cox on "The Weed Factor in the Cultivation of Corn" being of particular interest in this connection. Early in the present century, after a careful study of the results of a number of tests conducted at several experiment stations which appear to indicate that cultivation is not beneficial to the Indian corn plant except in so far as the suppression of weeds is concerned, and recognizing that the subject of weed control is a fundamental one in all tillage philosophy, these investigators initiated, over a wide range of soil and climatic conditions, a large number of experiments aimed at determining with some degree of exactitude the relative yield of maize obtainable as a result of supposedly optimum cultivation as compared with mere weed suppression. In each case the tests consisted of two series of plots, one of which

\*Hardy, F. —Distribution of Sugar-Cane Roots in Distinct Trinidad Soils. Trop. Agr., X. 1033.

simply had the weeds kept down after planting by a horizontal stroke of a sharp hoe at the soil surface, taking care not to disturb the soil or form any approximation of a soil mulch, while the other received the cultivation current in each locality. This work, in cooperation with farmers (many of whom were graduates of agricultural colleges) as well as experiment station technicians, was carried on for six years, during which no less than 125 experiments were harvested and the results studied. The general average of all of these showed that the weeded plots produced 95% as much fodder and 99% as much grain as the cultivated ones--a strong indication that weed control is, indeed, the prime object of cultivation. The authors conclude:

"Two entirely new fields of research are opened up, and their practical importance... from a labour and money standpoint is not to be gainsaid ... If weeds make the cultivation... necessary the problem immediately presents itself as to what farm-management methods can be pursued to eliminate or reduce to a minimum the weed pests of the farm ... Our present implements for cultivation are designed primarily to produce a mulch and stir the ground. Weed killing is a secondary function. It is possible that newly designed implements made with special reference to weed control could accomplish this end with greatly reduced cost. The weeder will probably be considered of vastly more importance than heretofore.

"The writers interpret these results ... to mean that weeds are in the main the enemy which makes cultivation necessary. Weeds can be fought with tillage implements specially designed to kill these pests instead of to stir the soil and make a mulch."

Two of the most significant demonstrations that weed control and not soil stirring is the principal objective of commercial cane cultivation (as distinct from preparation)--and, hence, that it is not necessary to have wide middles simply to keep them mechanically stirred--were furnished by Eckart (38) when, while managing Olaa plantation in Hawaii, he largely eliminated cultivation by devising his weed sprayer and later his paper mulch. At the suggestion of Agee, who succeeded Eckart as Director of the H.S.P.A. Expt. Station, he designed a sled apparatus permitting a spray of arsenite of soda to play upon the grass or weeds between the cane rows without material injury to the cane, thus largely doing away with inter-row cultivation, while with the cane growing through the paper mulch the weeding of the rows was made unnecessary. Inasmuch as between \$750,000 to \$1,000,000 was being spent annually in the "everlasting fight against weeds" in the extremely heavy rainfall district of Hilo when Eckart accepted the Olaa management, his feeling that some radical step toward economy in that branch of field work was urgently

needed is quite understandable. In 1913 Sutherst (105), in an address before the Hawaiian Sugar Planters Association, made the following observations on the chemical control of weeds in cane fields:

"The advantages of spraying over hoeing are very evident, the cost of the latter being at least four times as great ... It has been proved experimentally by the writer that a sprayed area remains weedless for a very much longer time than a hoed area since by the latter method fresh weed seeds are brought to the surface and only need this for germination ... so that, theoretically, one spraying should take the place of two or even three hoeings. Hoeing, and in fact, any surface disturbance of the soil, leads to soil washing and ... tends to puddle clay soils (when wet). It might be argued that, leaving the soil thus without any hoeing or cultivation would be harmful to the cane growth, but ... no good purpose comes of these operations ... the cane gets no cultivation for the last 12 or 18 months of growth and it seems to thrive during that period ... spraying can save a plantation in labour from 15 to 30 dollars a year per acre."

After this system of weed control had been adopted as regular field practice at Olaa and other plantations, Mr. L. D. Larsen, one of the outstanding technical agriculturists of the Islands, was sent by the Experiment Station to report on its practicability and his final observations to Director Agee (1) are of particular interest:

"They have dispensed with fully half of their cultivating ... and have reduced the amount of hoeing very materially ... they can probably do away with all of their cultivation from *off-harrowing* to small plowing before hilling up. If this can be done, and I see no reason why it cannot, the saving would be very much greater."

### Dense Populations and Cheap Labour

For a great many years the writer has been very much impressed by the fact that, with the exception of Puerto Rico, the occidental sugar countries space their cane rows much wider apart than is justified by their experimental evidence\* and agronomic philosophy, the only explanation of this apparent anomaly being the alleged necessity of having the middles sufficiently wide to admit of mechanical cultivation. Against this one advantage of cane row-wider than the agronomic optimum established for each region and the additional one of some economy in seed cane, it has always

\* Webster (116), reviewing this question in 1931, arrived at the conclusion that the narrow rows tend to give larger yields than the wider ones, but that for economic reasons few countries employ narrow rows.

seemed to him that the following imposing list of advantages of closer spacing should be more generally taken into consideration :

(1) Fewer cultivation operations as the result of quicker closing in of the cane and the consequent check on weed growth, the suppression of which would seem, in the light of modern investigations, to be the principal object of cultivation *per se*.

(2) Conservation of moisture due to reduced evaporation.\*

(3) Greater assimilation of moisture in a given time.

(4) Minimising losses due to deficient germination, inasmuch as the area of gaps is lessened.

(5) More stalks per acre.

(6) Less suckers.

(7) In countries of heavy precipitation, additional protection to soil from packing effects of beating rains.

(8) In subtropical regions, additional frost protection, as is evident by the fact that the same degrees of cold injure the extremely closely spaced P.O.J. canes in Egypt far less than the same varietal types planted twice as far apart in Louisiana or Argentina.

When the writer was working in Puerto Rico, he was much impressed with the fact that the narrow spaced (Met. 1.20 to 1.35) cane-fields of that island, in many cases in continuous cultivation for a century or more, consistently produced more cane per acre than the very widely spaced plantings on almost virgin lands in Eastern Cuba. A few years later he found in the Philippine Islands that cane was commonly planted at 90 to 110 centimetres (in the 1932-33 Report of the Research Bureau of the Philippine Sugar Association one metre between the rows is stated to be the optimum, closer planting showing a higher germination loss than wide spacing, but giving the higher yield), while cane with rows as close together as 60 cms. is common in India. In Formosa (98) and Java (99) he observed that the rows were commonly 105 cms. apart, seldom spaced wider than 1.20 cms. and, as a result of recent experimentation,

\* Says McIntosh in his report on a visit to the West Indian Island of Antigua (B.W.I. Cent. Cane Breeding Station Bull. 7, Barbados, July, 1933): "Spacing is appreciably closer than in Barbados..... the plants close in more quickly and prolong their growth further into the low-rainfall crop season..... even under conditions of comparable rainfall in both islands the foliage remains comparatively green even under comparative low rainfall conditions. This earlier growth leads to earlier cane stool formation in Antigua. This feature, coupled with the closer spacing, would appear to effect a suppression of late tillering and late cane formation. The bulk of the crop is made up of early formed canes. As a result varieties... which, in Barbados, owing to the... wider spacing, form a considerable bulk of their crop from late canes..., in Antigua ripen appreciably earlier."

the tendency is to reduce the spacing still further, as witness the last report of Demandt (26), in which he states that not only do the narrow spaced rows (105 cms.) give better tonnage of cane and sugar than wider ones, but that tests on spacing in the row favour more rather than fewer sets. Furthermore, the trend in Java for several years has been toward narrowing down the Reynoso ditches, of rectangular cross section, in which all cane is planted. Until the beginning of the present chaotic conditions in the international markets, with the consequent limitation of cane areas in Java, not much systematic investigation on the optimum width of these planting trenches had been undertaken, but with the advent of these new economic conditions it was deemed advisable to examine the question in the hope of finding a possible small economy. For this purpose, 119 ditch-width experiments were conducted in the various sugar districts of the island, three widths—25, 37 and 50 cms.—being tried in each case. The results show that sugar yields from the narrow ditches are usually slightly larger than, and in not one single case inferior to, those from wide trenches and Demandt (27), therefore, recommends that the Reynoso planting ditches be 25 cms. wide in light and medium soils and 30 to 35 cms. in heavy lands.

True it is that in all of the above-mentioned cane countries where narrow spacing is in vogue, labour is abundant and, with the exception of Puerto Rico, very cheap. Indeed, it would appear that as each country was opened up for cane growing, the abundance or otherwise of the local indigenous population largely dictated the type of spacing adopted. Where the population was dense and free land unobtainable as in India or Java narrow middles were employed; where land was readily available and the population sparser a plantation system, run under the supervision of the sugar manufacturers, was more generally the result, with wide-spaced rows the usual concomitant of hired labour. In these varying conditions the response to the need for economy has taken the line of more mechanization in the western countries, with the idea of reducing cultivation costs *per acre*, and in the eastern ones the trend has been towards increasing yields per unit of area by maintaining as heavy a cane population as is possible. In the latter case, particularly under peasant systems, the economy arises as the result of the replacement of hired help by family labour recompensed by higher yields.

It is obvious, therefore, that the search for the Holy Grail of economy in these parlous times has followed distinct trails as a consequence of local labour conditions to a very great extent and that these directions were largely fixed at the time of establishment of the various local sugar industries. We have already quoted Agee's dictum that the strongest influence in human affairs is

precedent and one who has for years observed these two divergent trends in cane spacing is inclined to wonder if that factor may not have been too prominent in establishing this particular phase of cultural practice in occidental canefields. Might it not be possible that the western cane grower, by maintaining wide middles to admit of cultivation by heavy implements, may be to a certain extent defeating his own purpose of economy by raising his cost of cultivation *per ton* while reducing it *per acre*? Is he, in his desire for mechanical cultivation, spacing his rows so far apart that more middle cultivations and even more hoeings must be given than would be necessary were the cane allowed to close in earlier and, by shading out the weeds, automatically render these additional cultivations unnecessary? Certainly, in the closely spaced Egyptian canefields no more hoeings are necessary in the rows than in Louisiana or Argentina—with 100% wider spacing and far later closing of the middles.

### Spacing Trials in Egypt

For the novice the most striking feature of cane culture in the land of the Pharaohs is that the well populated rows are uniformly closer spaced than in any other country—yet Egypt in yields of cane and sugar per acre and in juice quality of its short-season cane stands easily at the top of the list of subtropical countries and in yields *per year* compares quite favourably with the most advanced tropical producers. A distance between the rows of around 2½ feet results from the practically general custom of making nine rows per two *Kassabas*,\* which means that an Egyptian canefield carries just about twice as many rows of cane per acre as one in Louisiana or Argentina and produces just about *twice as much cane per acre* as do her sister subtropical countries!

Early in 1933 the writer initiated six large replicated spacing experiments in the principal cane zones of Upper Egypt, ranging from Mallawi, near the northern limit of cane growing for sugar manufacture, to the extreme southern development of Kom-Ombo, with spacings varying from eight to eleven ridges per two *Kassabas* and the number of replications, depending on soil homogeneity, from four to six, the larger number being employed at Kom-Ombo. The size of each replication is in all cases four *kirats*, or just one-sixth of an acre, this area having been decided upon as representing

\* Some Egyptian Weight and Measure Equivalents are given below:

A *Kassaba* is 3.55 metres, or 3.88 cards. Two *Kassabas*, therefore, are equivalent to 7.1 metres and nine rows in that distance would leave a distance between them of approximately 80 cm.

A *Feekha* is 1.028 acre, and is composed of 24 *Kirats*, a *Kirat* in turn being made up of 24 *Sahms*.

A *Rall* is 0.9905 lb., 190 *ralls* constituting a *bantar*. 22.26 *bantars* form a metric ton.

a plot which would produce sufficient cane to be conveniently handled at the factories without complicating or unduly slowing down their operation and allow of all the cane from each replication being ground, thus eliminating the complicated and, at best, highly hypothetical factor of obtaining "representative samples." Plot arrangement is in randomized blocks. Both the Mafaana and Mallawi experiments are located on fairly light loams of apparently quite uniform texture on the respective Ministry of Agriculture Farms and the writer wishes to acknowledge his indebtedness for whole-hearted and intelligent cooperation, from selecting the ground through the carrying out and harvesting of the experiments, to Director Hussein Enan (now Secretary General of the Ministry) and Moulatish Hassan Khalifa of the Agronomic Section, Moufatish Rizk Moussa, in charge of the Mafaana Farm, and Superintendent Mohammed Mahmoud of the Mallawi Farm.\* In all cases the variety of cane employed was *P.O.J. 105*, which is today, three decades after its introduction into the country by M. Henri Naus Bey, *Directeur Général de la Société Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Égypte*, the standard cane of the country, and the experimental fields had formerly carried a legume crop and maize.

When the experiments were harvested, workmen were concentrated in one plot at a time and the cane from that replication loaded on to one troop of camels or specified Decauville railway cars (at Kom-Ombo) while the next was being cut. No plot was ever left partially loaded overnight, *i.e.* the crop from each replication was always loaded into cars and shipped to the factory the night after harvesting. The factory managers not only gave of their counsel as regards organizing and handling the shipments, but each assigned a special assistant to receive and check trains of experimental cane and supervise the milling, juice analyses, etc. To their great credit he it said that there was not a single hitch in the smooth routine of weighing, milling and analysing a great bulk of "samples" running into thousands of tons—an eloquent testimony to the efficiency of their organizations. In order to reduce chances of confusion to a minimum, also, no other than the experimental cane was shipped from the farms while harvesting of the experiments was in progress.

*The Mafaana and Mallawi Experiments.*—Each consisted of four replications of plots having eight, nine and ten rows of cane per

\* The writer wishes also to acknowledge his sincere appreciation of the excellent assistance given him by Dr. Mohammed Aly el Kilany of the Botanical Section and to emphasize the fact, that, without the experienced suggestions and enthusiastic cooperation of Messrs. Fouad el Director of the Abu-Kurgas Factory, Naus and Cristofari of the Erment Sucrerie and Farms at the Kom-Ombo plant, the securing of the very complete and reliable chemical data would have been impossible. The officials of both the *Sucrerie* and Kom-Ombo Companies were unstinting in assisting to obtain thoroughly comparable results from these trials.

two *kussalas* (approximately 90, 80 and 70 cnis. between the row). The first tractor ploughing at Mataana was given the middle of December, 1932, and the second early the next month, levelling being completed on 6th January, 1933. The 4th acre (*4 kirats*) plots were measured off, the ridging at various distances carefully carried out and the necessary canals installed in the first days of February. The middle of February—an excellent date for Egypt (191)—good *magari* was planted, after cleaning the furrows with the *fass* (Egyptian hoe), in two continuous rows per furrow, the usual watering incident to dry planting being given immediately thereafter. 22 additional irrigations were supplied, the first on 9th March and the final one on 1st December. Three fassings were given—on 7th April and 5th and 27th May—and 300 kilos of Nitro-Sulphate of Ammonia (26 % Nitrogen) per feddan were supplied in three doses (6th and 31st May and 2nd July). The canals were cleaned at the end of May and middle of August. Harvesting was conducted on the 22nd and 23rd February, with the results detailed in Table X. As ratoons (second year cane) the plots were watered the latter part of April, 1934, the middles thoroughly ploughed on 12th May and the plot borders remade just before the first application of fertilizer (same as with the plant cane) on 23rd May. The second watering was given the following day and the 22nd on 5th January, 1935. The second and third applications of Nitro-Sulphate were on 17th June and 1st July. No fassings were necessary. Harvesting was conducted exactly one year after that of the first year cane, with the average results shown in Table XI.

At *Mallawi* the preparation and planting operations were not carried out at such optimum times as in the case of the Mataana experiments and the consequent shorter growing season is clearly reflected in the crop figures given in Table X. The first ploughing and levelling were not performed until the 23rd April, 1933, the second having to be given within a week. The plots were not laid out, divided and properly ridged until the end of the first week in May and only on 9th May were the experiments "wet" planted and watered the following day. Only sixteen additional irrigations were supplied, the first ten days after planting and the final one not until the very late date of 10th February, 1934. It is probable that this late final irrigation is to some considerable extent responsible for the low average sucrose and purity of the Mallawi cane as compared with that of Mataana. Four fassings were necessary, the first on 2nd June and the last on 22nd July. The fertilization was different from that of Mataana, 200 kgms. of 16% Calcium Superphosphate being applied, together with 500 kgms. Nitrate of Lime (15½% N) in three doses—the first on 6th June and the final application at end of July. Harvesting took place on the 13th and 14th March, 1934.

As ratoons the plots were watered during the first week in May and the first ration of fertilizer applied the middle of that 1934 month. Total fertilizer applied to 2nd Yr. cane was 200 kgms. Nitrate of Lime and 100 kgs. Superphosphate. The middles were thoroughly ploughed out on the 22nd May. The plot borders were reconstructed and the second application of fertilizer made on 24th May, the final dose being furnished a month later. Thirteen additional waterings were given, the final one early in February, 1935—just a month after the last irrigation at Mataana. Again it is probable that the comparatively low sucrose and purity of the Mallawi cane shown in Table XI may be partially due to the late application of irrigation water. Only one fassing was necessary—the middle of June—and this was followed by a final correction of the ridges dividing the plots. The average results of the harvest on 10th and 11th March, 1935, together with those for the two sets of experiments, are found in Table XI.

**TABLE X.—RIDGING EXPERIMENTS AT MATAANA AND MALLAWI.**

No. Ridges p. 2 Kassabas	Plots (4 Rows)	Kan. Cane (per Plot)	Kantara (per Fed.)	Richesse	Purity	Glucose Ratio
<b>I.—MATAANA.</b>						
<b>1st Year Cane.</b>						
8	A- 1	8050	13-00	83-1	4-2	
8	A- 4	8130	13-81	83-2	4-4	
8	A- 6	6350	13-90	83-8	3-6	
8	A- 11	8270	13-15	82-1	3-8	
8	Average	7700	1016	13-50	83-1	4-0
9	B- 3	8100	13-38	83-0	4-1	
9	B- 5	7760	13-00	82-4	4-7	
9	B- 8	7350	13-90	84-7	3-8	
9	B- 10	7910	13-30	83-7	3-8	
9	Average	7838	1035	13-10	83-5	4-1
10	C- 2	7020	13-00	82-1	4-3	
10	C- 7	7990	13-18	83-9	4-0	
10	C- 9	8860	12-97	82-7	7-0	
10	C- 12	8180	13-16	82-8	4-1	
10	Average	8058	1001	13-15	83-0	4-1
<b>II.—MALLAWI.</b>						
<b>1st Year Cane.</b>						
8	A- 1	6860	9-58	72-2	15-3	
8	A- 4	6190	12-01	81-4	6-6	
8	A- 6	6180	10-60	74-3	11-0	
8	A- 11	5160	11-00	75-6	10-6	
8	Average	6248	825	10-91	75-9	10-9
9	B- 3	6920	10-53	71-5	13-4	
9	B- 5	6900	10-01	73-2	12-8	
9	B- 8	5960	11-84	78-7	8-6	
9	B- 10	6510	11-36	76-1	11-2	
9	Average	6580	869	10-91	75-6	11-5
10	C- 2	6280	10-24	74-7	13-9	
10	C- 7	5580	10-95	75-3	11-0	
10	C- 9	6990	9-83	72-6	12-6	
10	C- 12	5910	11-42	77-5	10-2	
10	Average	6190	817	10-61	75-0	11-9

**TABLE XI.—RIDGING EXPERIMENTS AT MATAANA AND MALLAWI.**

No. Ridges per 2 Kuss. (7-1 m.)	Kantara Cane per Feddan		Richesse	Purity	Glucose Ratio			
	2nd Year Cane	Average 2 Crops						
I.—MATAANA								
2nd Year Cane		Harvested 11-22-35						
8 (90 cms.)	1059	1038	14-09	86-9	2-6			
9 (80 cms.)	1093	1061	11-33	87-0	2-7			
10 (70 cms.)	1097	1079	11-25	87-6	2-8			
II.—MALLAWI								
2nd Year Cane		Harvested 11-10 and 11-35						
8	990	908	11-87	79-3	8-3			
9	1014	942	12-02	79-5	7-1			
10	1020	919	11-63	79-4	8-6			
III.—ANNUAL AVERAGES FOR THE COMBINED EXPERIMENTS.								
8	1025	973	12-59	81-3	6-5			
9	1054	1003	12-67	81-4	6-1			
10	1059	999	12-41	81-3	6-9			

The first-year results at Mataana show a small increase in yield of cane as the spacing between the rows becomes narrower, as well as a slight decrease in *Richesse* and increase in Glucose Ratio, but the differences are so small as to be well within the experimental error and are, hence, not statistically significant except as indicating no economic advantage in altering the standard Egyptian spacing of nine rows per two kassabas. At Mallawi the normal spacing has produced the best yield of cane and the narrowest spaced cane again shows the lowest sucrose content, but the differences are also so small as not to be significant. As second year cane, both series of experiments show insignificantly increased yields as the spacing is diminished (the advantage of the narrowest spaced cane over the normal being only about a quarter of a ton of cane per feddan) and slightly the best sucrose content for the standard spacing, while the averages for the four crops (Section III of Table XI) show slightly the best results all along the line—highest yield, *richesse* and purity and lowest glucose ratio—for the standard spacing of nine rows per two kassabas.

The *Kom-Ombo Experiments* were laid out in four distinct and widely scattered sections embracing soil types from the best to the worst on this extensive property. At *Sabah Gebli* and *Kom-Ombo Bahari* the experiments are on very fertile and homogenous silt loams, the former being a bit superior in homogeneity, although both are first class lands, as indicated by the enormous yields obtained. The *Raghama Shark* soil is a fertile, homogeneous clay loam, while the experiment at *Abbassia* was purposely placed on one of the poorest soil types of the plantation, an irregular (chemically and physically), over-compact clay soil of below average fertility for Kom-Ombo. With six replications it was thought that we could obtain a fairly equitable distribution of the type plots in this experiment, but several careful surveys by the writer and *Waqil S. Mizrahi*\* during the development of the crop demonstrated clearly that the D plots (11 ridges per 2 *kassabas*) had rather the best of it in general in being located on replications of slightly above the average fertility of the field.

The preparation of all the experimental areas left nothing to be desired and all operations were carried out at optimum times. The fields were plowed, crossplowed and harrowed early in the winter with Fowler steam tackle. Early in February the proper ridging was carried out under M. Mizrahi's personal supervision and checked by actual measurements by the writer and his assistants. The *tagawi* was carefully selected by M. Mizrahi and planting of all four experiments was effectuated in the week of 7th-14th February, 1933. Besides the initial watering immediately following the dry planting, 27 irrigations were given at *Abbassia* and *Sabah Gebli* and one less to the other two experiments. Three fassings were carried out and the fertilizer (same as at Mataana, Nitro Sulphate of Anunonia) was also applied in three doses—the first the latter part of April or early in May and the final application in July. Harvesting was carried out from 20th March to early April, as shown in the following tables of yields from each *mezrah*. The cultivation of the second year cane was practically identical with that of the plant cane, except for less fassing, and was initiated at an optimum early date, which gave a good length of growing season to the fields.

\* It is difficult for the writer to adequately express how much of the success and careful control of all of the Kom-Ombo experiments is due to the capable cooperation and practical experience of M. Mizrahi. In the midst of his extremely heavy duties, his counsel in selection of the soil types for the various experiments, his comprehension of experimental procedure and the necessity of careful checking of all operations, from spacing the various replications to the arduous task of harvesting and shipping the crop from each plot by a "foot-proof" system, and his meticulous observations throughout have been absolutely invaluable. Any anomaly in the experiments, such as stealage or rot damage in particular plots, was promptly noted and the writer's attention called thereto—an extremely useful feature when experiments are being conducted at such widely scattered locations. Helpful suggestions and continued interest in the experiments were also given by Moustafah Abdel Fattah Nour and by Director General René Cattani Bey and Mr. Simon Zagdoun of the Cairo Office.

TABLE XII.—RIDGING EXPERIMENTS AT KOM-OMBO BAHARI

First Year Cane.			Harvested III 20-31		
No. Ridges per 2 Kass.	Plots (1/6 Acre)	Kantars Cane (1 Kass. = 100 Bcs.)	Rebasse (Suc. per in Cane)	Purity	Glucose Ratio
8	A- 2	206.85	12.98	76.6	10.4
8	A- 6	210.00	13.15	80.6	7.7
8	A- 10	157.20	13.71	78.7	—
8	A- 15	198.89	13.60	81.3	9.9
8	A- 19	212.71	13.40	80.9	7.3
8	A- 23	212.22	13.31	81.6	—
Total and Averages...		1197.87	13.41	81.0	8.8
9	B- 3	218.53	12.71	77.5	11.0
9	B- 7	217.73	12.12	77.7	11.4
9	B- 11	171.16	13.73	85.8	5.3
9	B- 16	217.78	13.51	81.5	—
9	B- 20	230.40	13.27	80.2	8.5
9	B- 24	211.13	13.22	80.5	—
Total and Averages...		1269.73	13.09	80.5	9.1
10	C- 4	183.05	13.11	77.4	10.7
10	C- 8	191.09	14.08	80.0	9.2
10	C- 12	197.91	14.39	81.7	7.8
10	C- 13	216.31	13.31	79.4	9.8
10	C- 17	213.82	14.04	83.9	—
10	C- 21	226.76	13.24	82.3	—
Total and Averages...		1232.04	13.70	80.7	8.4
11	D- 1	208.40	14.97	74.4	9.4
11	D- 5	206.49	13.14	79.3	8.0
11	D- 9	191.60	13.43	79.4	11.9
11	D- 14	228.53	12.54	77.6	10.5
11	D- 18	160.27	14.61	82.3	—
11	D- 22	224.40	13.64	81.7	—
Total and Averages...		1219.60	13.47	78.6	11.7

TABLE XIII.—RIDGING EXPERIMENTS AT ABBASSIA

First Year Cane		Harvested III-29-34			
No. Ridges per 2 Kassa.	Plots (1/6 Acre)	Kantars Cane (1 Kant. = 100 lbs.)	Richesse (Sucrose in Cane)	Purity	Glucose Ratio
8	A- 1	160.04	15.21	86.5	3.6
8	A- 5	121.60	15.61	86.3	2.8
8	A- 10	150.44	15.48	85.6	3.5
8	A- 16	184.93	15.90	85.8	3.4
8	A- 19	173.38	15.08	85.0	3.8
8	A- 23	197.29	14.54	85.2	4.2
Total and Averages		987.68	15.30	85.8	3.6
9	B- 2	136.53	14.66	85.0	4.7
9	B- 6	124.31	14.84	84.9	3.7
9	B- 9	103.47	14.84	87.5	2.5
9	B- 13	286.00	15.39	87.5	4.3
9	B- 17	168.44	15.17	84.0	3.3
9	B- 22	213.24	14.82	86.4	3.7
Total and Averages		1031.99	14.95	85.9	3.7
10	C- 3	111.47	15.09	86.1	2.7
10	C- 8	176.98	15.68	85.8	2.3
10	C- 12	214.04	13.93	84.5	4.4
10	C- 14	200.93	14.50	85.6	4.3
10	C- 18	176.49	15.02	85.6	4.0
10	C- 21	198.18	14.49	85.5	4.2
Total and Averages		1078.90	14.78	85.5	3.7
11	D- 4	135.78	15.08	85.6	3.1
11	D- 7	186.89	14.45	84.1	3.9
11	D- 11	192.98	14.05	84.4	4.7
11	D- 15	221.07	14.80	86.5	3.6
11	D- 20	194.58	14.61	85.7	3.6
11	D- 24	197.83	14.67	85.2	3.8
Total and Averages		1129.12	14.61	85.3	3.8

TABLE XIV.—RIDGING EXPERIMENTS AT SABAH GEBLI

First Year Cane		Harvested IV-4-34			
No. Ridges per 2 Kassa.	Plots (1/6 Acre)	Kantars Cane (1 Kant. = 100 lbs.)	Richesse (Sucrose in Cane)	Purity	Glucose Ratio
8	A- 1 ...	219.36	14.08	85.0	5.3
8	A- 5 ...	225.38	13.40	83.9	5.9
8	A- 9 ...	210.80	14.37	83.0	6.2
8	A- 16 ...	225.38	13.71	82.6	4.5
8	A- 20 ...	210.22	14.42	85.7	5.9
8	A- 24 ...	217.02	13.36	83.4	4.9
Total and Averages		1299.16	13.89	83.9	5.1
9	B- 2 ...	207.64	14.86	86.6	3.5
9	B- 6 ...	226.93	13.24	82.7	5.9
9	B- 10 ...	228.53	14.53	83.9	4.5
9	B- 13 ...	192.80	13.45	87.7	3.4
9	B- 17 ...	224.80	12.94	82.9	5.8
9	B- 21 ...	194.58	15.15	84.9	3.6
Total and Averages		1275.28	14.36	84.8	4.3
10	C- 3 ...	220.58	14.03	83.4	4.9
10	C- 7 ...	208.49	14.56	85.6	3.8
10	C- 11 ...	221.11	14.28	84.7	4.0
10	C- 14 ...	196.58	15.95	86.7	3.0
10	C- 18 ...	225.82	13.87	84.0	4.3
10	C- 22 ...	196.53	13.18	85.1	3.6
Total and Averages		1269.11	14.61	84.9	3.9
11	D- 4 ...	217.76	13.78	84.2	4.1
11	D- 8 ...	215.07	15.06	86.9	3.4
11	D- 12 ...	231.11	13.72	83.4	4.8
11	D- 15 ...	193.91	14.09	84.0	4.3
11	D- 19 ...	201.42	14.25	82.5	6.7
11	D- 23 ...	222.67	13.20	84.5	5.0
Total and Averages		1281.94	14.01	83.7	4.7



TABLE XV.—RIDGING EXPERIMENTS AT RAGHAMA SHARK

First Year Cane.

Harvested III-23-34

No. Ridges per 2 Kass.	Plots (1/8 Acre)	Kantars Cane (1 Kan = 100 lbs.)	Richesse (Stucose in Cane)	Purity	Glucose Ratio
8	A- 2	187.20	13.00	83.5	4.4
8	A- 6	151.58	13.89	83.4	4.2
8	A- 10	199.51	13.39	81.7	5.0
8	A- 15	201.22	12.55	81.5	5.8
8	A- 19	176.18	13.59	83.2	5.5
8	A- 23	200.02	11.58	78.7	6.8
Total and Averages		1122.31	13.00	82.0	5.3
9	B- 3	190.00	12.83	80.6	6.7
9	B- 7	218.58	13.30	82.9	5.5
9	B- 11	190.22	15.03	82.2	7.2
9	B- 16	200.00	12.97	82.4	4.9
9	B- 20	188.44	13.28	83.2	5.6
9	B- 24	179.78	11.42	78.3	7.1
Total and Averages		1167.02	13.14	81.6	6.1
10	C- 4	170.27	13.77	82.2	4.5
10	C- 8	201.93	12.70	81.7	5.9
10	C- 12	178.89	12.24	80.3	5.2
10	C- 13	211.96	13.25	83.5	5.7
10	C- 17	201.51	13.28	83.1	3.3
10	C- 21	176.93	11.52	78.8	6.6
Total and Averages		1141.49	12.79	81.6	5.2
11	D- 1	204.71	12.42	80.3	5.8
11	D- 5	159.65	13.36	82.1	4.0
11	D- 9	193.86	11.53	77.4	8.3
11	D- 14	188.58	13.45	83.5	5.4
11	D- 18	212.80	12.14	81.0	5.1
11	D- 22	192.53	11.58	78.7	6.4
Total and Averages		1152.13	12.41	80.5	5.8

TABLE XVI.—AVERAGE RESULTS FROM THE FOUR KOM-OMBO EXPERIMENTS (First Year Cane).

No. Ridges per 2 Kassahas	Section (Nizrah)	A-4		B-9		C-10		D-11	
		Ktrs. p. Fed.	Purity	Ktrs. p. Fed.	Purity	Ktrs. p. Fed.	Purity	Ktrs. p. Fed.	Purity
	Kom-Omba	1,197.87	81.0	1,269.73	80.5	1,232.54	80.7	1,219.68	80.7
	Bahari...	1,187.08	85.8	1,191.98	85.9	1,158.09	85.5	1,129.12	85.3
	Abbassa	1,259.16	83.9	1,275.28	81.8	1,269.11	81.9	1,281.94	83.7
	Sabab Gabli	1,122.31	82.0	1,167.02	81.6	1,114.96	81.6	1,132.13	80.5
	Raghama Shark	1,151.75	83.2	1,186.00	83.2	1,181.06	83.2	1,105.72	82.1
	Averages								

At both Kom-Ombo Bahari and Raghama Shark the normal plantings (80 cms.) produced slightly more cane than the other distances, while Sabah Gebli furnishes the only instance where the widest spacing has produced a slight, even though not significant, excess of cane. At Abbassia, where it had already been observed that the narrowest spaced plantings occupied plots of rather better than average fertility, this distance produced substantially more cane than the wider ones. The juices from these narrowest spaced cane showed consistently the lowest purities, although the slight differences are not statistically significant. While the yields of cane per feddan are very closely bunched in the plantings at nine, ten and eleven ridges per 2 kassabas in the final averages, the widest spaced canes averaged about  $1\frac{1}{2}$  tons less, just as they did at Mataana and Mallawi, as shown in the last section of Table XI, and approximately this same depression in yield is maintained by the widest spacings in the combined averages for the Kom-Ombo experiments (final section of Table XVI).

TABLE XVII.—RIDGING EXPERIMENTS AT KOM-OMBO.—CONDENSED RESULTS OF THE FOUR EXPERIMENTS.

Ridges per 2 Kassabas	Kantars Cane per Feddan		Richesse	Purity	Glucose-Ratio (Red. % Suc.)
	2nd Year Cane	Aver. 2 Crops			
2nd year cane					
I.—Kom-Ombo Bahari					
Harvested III-4-35					
8	1,051.23	1,124.55	13.41	82.9	5.3
9	1,125.38	1,197.56	13.73	83.2	5.5
10	1,109.34	1,170.94	13.59	82.2	5.7
11	1,086.14	1,152.92	14.00	83.0	5.2
2nd year cane					
II.—Abbassia					
Harvested II-23-35					
8	940.53	961.11	13.31	83.4	5.0
9	1,012.71	1,022.35	12.79	82.3	5.4
10	1,024.80	1,051.45	12.68	81.9	5.4
11	1,057.78	1,093.45	12.59	82.0	5.4
2nd year cane					
III.—Sabah Gebli					
Harvested I-30-35					
8	1,077.19	1,188.18	12.27	80.3	7.1
9	1,031.32	1,153.30	12.34	80.9	6.8
10	1,024.45	1,146.78	12.29	81.9	7.1
11	1,064.62	1,223.28	12.46	82.0	7.2
2nd year cane					
IV.—Raghama Shark					
Harvested III 28-35					
8	1,107.68	1,114.99	13.37	82.6	5.4
9	1,136.24	1,151.63	12.89	81.1	6.0
10	1,132.54	1,138.77	13.03	82.1	5.9
11	1,142.92	1,117.53	12.95	81.7	5.9
V.—Annual averages for the combined experiments					
8	1,044.16	1,097.91	13.50	82.8	5.7
9	1,076.41	1,131.21	13.42	82.6	5.9
10	1,072.78	1,126.99	13.44	82.6	5.8
11	1,087.87	1,154.30	13.28	82.2	6.2

Examining the condensed data in Table XVII, it will be noted that the second-year results were relatively very similar in each experiment to those obtained from the first-year cane, although, contrary to what occurred at both Mutaana and Mallawi, in each case the second crop has produced somewhat less cane per acre than the first. Differences in juice analyses are insignificant and show no trend whatsoever, as illustrated clearly by the average figures (Section V) for the eight crops (first and second year harvesting of all four experiments), where the extreme range in sucrose content is about  $\frac{1}{4}$ th of a point, in purity  $\frac{2}{5}$ ths of a point and in the Glucose Coefficient but half a point. While by no means significant, it should perhaps be noted that the narrowest rows have produced cane of the lowest average sucrose content and purity and the highest proportion of invert sugars.

The narrowest spaced plots (11 ridges per 2 kassabas) have produced an annual average yield of just about a ton more cane (of slightly inferior quality) per annum than the normal spaced ones with 9 ridges per 2 kassabas, thus reflecting the better general average fertility of the narrowest spaced plots at Abbassia. Considering the very large experimental error\* at Abbassia, however, this difference is by no means significant, and would, at any rate, be largely offset in practice by increased cost of ridging, *tagawi* and cultivation of additional rows. Furthermore, as M. Mizrahi has pointed out in his annual report to the Kom Ombo Co. for the year 1933-34, such extremely close planting of cane is impracticable for the following reasons:—

- (1) The difficulty of planting at proper depth.
- (2) Passage of men and animals engaged in cultivation is more likely to injure the stools.
- (3) Since the larger number of planting furrows must necessarily be shallower than those spaced somewhat wider apart, their water-holding capacity is smaller, with consequent reduction in efficiency of irrigation water and reduced storage capacity.

\* With poor and irregular soil this experimental error usually assumes such a large proportion as to render the results incapable of proper statistical analysis, or as Gracie, Khalil and Egan have expressed it in their recent Tech. Bull. No. 152 of the Ministry: "The main feature of experiments on poor soils is that the variation due to error is so large that the treatment effect is not statistically significant and there is in fact no point in doing the experiments."

With the exception of Abbassia, which was selected only because we had several other representative types of Kom Ombo soils under the same experiments and could, therefore, more readily make comparisons, the lands on which these experiments were conducted were undoubtedly higher yielding than the average Egyptian cane soil, hence the average figures, when considering the cane zones as a whole, should be considerably adjusted downwards.

(4) An increased number of ridges per feddan naturally increases the surface area exposed to evaporation (until the cane is sufficiently developed to inhibit this higher rate).

(5) Early suckering is reduced and the yield *per row* suffers somewhat.

To these sound reasons must be added the already mentioned increased costs per feddan for additional ridges, *tagawi* (seed cane) and cultivation, all of which considerations were discussed with the officials of the Agronomic Section when planning the spacing experiments on the Ministry Farms, with the result that narrower middles than 70 cms. were not included in the latter tests.

In Table XVIII will be found the condensed average annual results of the Kom Ombo, Mutaana and Mallawi first and second-year experiments with 8, 9 and 10 rows per 2 kassabas, these figures covering, therefore, twelve experimental crops.

TABLE XVIII.—AVERAGE ANNUAL RESULTS OF ALL SIX DISTANCE EXPERIMENTS FOR THE TWO YEARS.

Expts.	No. Ridges 2 Kassabas	A—8 (80 cms.)					B—9 (80 cms.)					C—10 (70 cms.)				
		Location	Ktrs. per Fed.	Ri. closer	Purity	Gluc. Rat.	Ktrs. per Fed.	Ri. closer	Purity	Gluc. Rat.	Ktrs. per Fed.	Ri. closer	Purity	Gluc. Rat.	Ktrs. per Fed.	Ri. closer
4		Kom-Ombu	1,067.91	13.50	82.8	5.7	1,131.21	13.12	82.6	5.9	1,126.99	13.44	82.6	5.6	1,079.00	13.70
1		Mafana	1,038.00	13.80	85.0	3.3	1,061.00	13.87	85.3	3.4	1,079.00	13.70	85.3	3.5	1,079.00	13.70
1		Madhavi	908.00	11.39	77.6	9.6	912.00	11.48	77.6	9.5	919.00	11.12	77.2	10.3	919.00	11.12
6		Grand Averages	1,056.27	13.20	82.3	6.0	1,088.47	13.17	82.2	6.1	1,084.33	13.10	82.2	6.2	1,084.33	13.10

The normal plantings at 80 cms. give an insignificant average annual increment over those at 70 cms. of about a fifth of a ton per feddan of cane of insignificantly superior sugar content, but over the wider spacing the increment is the possibly significant one of about  $1\frac{1}{2}$  tons of cane.

### Conclusions

The results of our investigation of cane spacing seem to point to the conclusion that the Egyptian planter has arrived empirically at the optimum planting distance for sugar cane with the same uncanny accuracy as he did for cotton. Of the latter case Templeton (108) has remarked:—

“The spacing which was found by Balls (5) to give the maximum yield—and to the credit of the cultivator be it stated that this was the spacing he had worked out for himself—has remained practically unchanged.”

Certainly our figures indicate very categorically that there is no reason—with the present standard variety of sugar cane in Egypt—for modifying the very general spacing of 9 rows per 2 kassabas (about 80 cms.) already arrived at by our planters.

## Summary

Some general considerations regarding planting distances for sugar cane are given, particularly as related to suckering or "til-ling" in the subtropics and the importance of an early initial stand where the growing season is inevitably limited. Germination counts to determine the relative age at crop time of the population of a wide-spaced subtropical canefield reveal a surprising proportion of immature canes, which notably reduces the average sugar value of the crop.

The importance of admission of light and air to the cane stalks has been greatly exaggerated, since the "laboratories" of the plant are located in the leaves, while the stalks constitute the "ware-houses" for the elaborated sucrose. The abandonment of the process of stripping the leaves off of maturing cane is a direct consequence of the gradual realization of this fact, while abnormally wide spacing systems, such as those of Zayas and Abreu in Cuba, have always failed to become permanently established for the same reason.

Since Soucek in 1922 demonstrated the mathematical relation between yield and density of stand, experiment and practice the world over have demonstrated that neither maximum yield nor sugar content can be obtained with wide spacing of sugar beets.

While experiments in practically every cane-growing country have demonstrated that increased yields of both cane and sugar can be obtained with narrower spacings, the highly mechanized occidental regions, with scarce and expensive labour, have tended to adjust the width of the middles to the space requirements of animal or tractor-driven cultivation machinery. The question arises as to whether the assumed primordial importance of mechanical cultivation may not have obscured other factors, such as additional weedings and later closing in of the canes, with a resulting distortion of the strictly economic equilibrium as regards comparative costs *per ton* of production.

The present century has witnessed radical changes in the viewpoint toward soil stirring *per se* in cultivation as essential for proper absorption of plant food by the roots, reduction of capillary losses of moisture, etc., and a large body of capable investigators now regards weed control as the principal object of cultivation (as distinct, of course, from *preparatory* tillage and the development of a finely divided seed bed) and contends that, by mulching, timely fertilization and watering to enhance quick closing in of the cane rows, the cost of weed elimination may be vastly reduced without detriment to the cane crop; indeed that the reduced root pruning incident to cultivation should generally result in more unhampered

cane growth and superior yields at lower cost. Extensive investigations with sugar-cane in Hawaii, Cuba, India, the Philippine Islands, Trinidad and Java and with the botanically related maize plant in the United States all seem to indicate that the main consideration in stirring the soil around growing cane is control of the weeds competing for the cane's food rather than that of rendering this food more available through fineness of division of the soil around its roots.

The layout and procedure of six large-scale replicated cane spacing experiments at Mallawi, Matana and Kom-Oumbo are described and the individual and collective crop data for 1934 and 1935 given. These show no reason for changing in either direction from the practically standard system of planting nine rows of cane per 2 kassabas (about 80 cms. between the rows), which has been empirically arrived at by the Egyptian planter with the same uncanny accuracy with which he gradually developed an optimum spacing for his cotton fields.

# Bibliography

- (1) AGEER, H. P. —The Implements of the Industry. H.S.P.A. Expt. Sta., Agr. Chem. Ser. Bull. 41, Hulu., 1914.
- (2) .....—The Sugar Planter Looks at Botany. Proc. H.S.P. A. Anl. Mtg., LII, 1932.
- (3) .....—Plantation Strategy. *Ibid*, LIII, 1933.
- (4) ANDREWS, W. R.—Tractors in Natal. Proc. So. Af. Sug. Technols. Assn., III, 1929.
- (5) BALLS, W. L.—Analysis of Agricultural Yield. Phil. Trans., B. Vol. 206, 1915-16; 208, 1918.
- (6) Barber, C. A.—Scientific Work in the Hawaiian Cane Fields. Int. Sug. Jour., XXXIII, 1931.
- (7) .....—Recent Advances in Plantation Research. *Ibid*, XXXIV, 1932.
- (8) BISSINGER, GEO. H.—Knowledge of Cane Roots and Application to Tillage Operations. Proc. Philip. Sug. Assn. Conv., VI, 1928.
- (9) BLOUNT, R. E.—Report for the Year 1901. H.S.P.A. Exp. Sta. Bull. 7, 1902.
- (10) .....AND ROSENFELD.—Memorias sobre los Trabajos de la Estacion. Experimental. Rev. Indust. Agr. Tuc., I-IV, 1911-14.
- (11) BONAME, P. H.—Culture de la Canne à Guadeloupe. Paris, 1888.
- (12) BOONE, ROY C. P. *Ibid*. Min. Colonies, Pub. 203, Paris, 1926.
- (13) BREWAKER, H. E.—Spacing Beets in the Row. Through the Leaves, pp. 71-6 May, 1935.
- (14) BRYAN, ROY.—Cultivation on Unirrigated Plantations. Proc. Asn. Haw. Sug. Technols., XI, Hulu., 1932.
- (15) CALVINO, MARIO.—El Sistema Abre de Plantacion de Cana. Chaparrn Agrul., I, No.3, 1924.
- (16) CAZAUD, MARQUIS DE.—Précis sur la Canne. 1776.
- (17) CRAWLEY, J. T.—Miscellaneous Papers on Cane. Exp. Sta. Bd. Comm. Agr. P. Rico, Bull. 8, 1915.
- (18) CROSS, W. E.—Estudios Relacionados con la Experimentacion de la Cana. Univ. Tuc. Depto. Invests. Indstls., Inf. 5, 1918.
- (19) .....—Distancia a que se Debe Plantar la Cana. Rev. Indust. y Agr. Tucuman, X, 1919; XI-XII, 1921; XIX, 1928-29. Plantacion en Hoyos. *Ibid*, XXIV, 1931.
- (20) CROWTHER AND MAHMOUD.—Interaction of Factors in Egyptian Crop Growth, I. Roy. Agr. Soc. Egypt, Techn. Bull. 22, 1935.

- (21) DAHLBERG, H. W.—Sugar Beet Stands in Sweden. Through the Leaves, Mar., 1935, pp.60-2.
- (22) DASH, J. SYD.—Administrative Rept. of Dir. of Agriculture. Brit. Guiana, 1930-32.
- (23) DEBRER, NOEL.—Cane Sugar. London, 1921.
- (24) .....AND ATKINS.—Cane Cultivation in North India. Proc. Conf. I.S.S.C. Technols., III, Srbya., 1929.
- (25) DELTEIL, E.—La Canne à Sucre. Paris, 1884.
- (26) DEMANDT, E.—Planting Distances for Cane. (Trans. Tit.) Arch. Suikerind. Ned.-Ind., XXXIX, Pt. III, Med. II, 1931; XLII, Pt. III, Med. 26, 1934.
- (27) .....—Field Tests on Width of Reynoso Ditches (Trans. Tit.). *Ibid*, XL, Pt. III, Med. 6, 1932.
- (28) DEVENTER, W. VAN.—De Cultuur van het Suikerriet. Amstddm., 1914.
- (29) DODDS, H. H.—Rept. on Agr. Practice in So. African Sug. Industry. Proc. Assn. S. Af. Sug. Tecs., VII, 1933.
- (30) DODEN, HANS.—Remarks on Cane Cultivation. *Ibid*, Philip. Sug. Assn., V, Manila, 1927.
- (31) DOGER DE SPEVILLE, M.—Comparative Study of Yields from Cane Cultivation in Hawaii, Java and Mauritius. *Ibid*, Int. Soc. Sug. C. Technols., III, 1929.
- (32) DYK, J. VAN.—Tillage in Java. *Ibid*.
- (33) EARLE, F. S.—Wide Spacing of Cane. Facts Abt. Sug., XIX, 1924.
- (34) .....—Sugar Cane Cultivation. Ind. Dept. Agr. Pro. Rec., VIII, No. 2, 1924.
- (35) .....—Sugar Cane and its Culture. N.Y., 1928.
- (36) EASTERBY, H. T.—Queensland Sugar Industry. Bur. Sug. Expt. Stas. Brisbane, 1933.
- (37) ECKART, C. F.—Repts. for 1902-04. H.S.P.A. Exp. Sta., Ind. Agr. and Chem. Bulls. 8-10, 1904-5. Stripping Experiments. *Ibid*, Bulls. 11, 16 and 25 and Circ. 8, 1906-8.
- (38) .....—The Olan Weed Sprayer. Proc. Anl. Mtg. H.S.P.A. Hulu., 1913, and Haw. Pltrs. Rec., X, 101-5, 1913. Paper Mulch. U.S. Patents 1,227,989, 1,249,355 and 1,274,527.
- (39) EDMONDS, PATRICK AND RAMAMURTI.—Cultivation of Coniferae Seedlings in South India. Mad. Agr. Dept., Bul. 30, 1932.
- (40) FOWLIE, P.—Spacing of Lines. Proc. Cong. S. Af. Sug. Technols. Assn., IX, 191-3, 1935.
- (41) GINNEKEN, P. J. H. VAN.—Influence of Stand (Trans. Tr.). Med. Inst. Skrbieteeft., V, I, 1935.

- (42) GONZALEZ, A. J.—Cane Roots. Proc. Anl. Mtg. Assn. Cuban Sug. Technols., VI, 1932.
- (43) HIND, R. RENTON.—The Hole System of Planting. Sug. Cent. and Pltrs. News, Mula., 1921.
- (44) HOLL, C. C. J. VAN.—Bibliography of Tropical Agriculture. Rome, 1932-1933.
- (45) HONE, BASIL.—Cane Cultivation by Mechanical Power. Facts Abt. Sug., XXII, 1927.
- (46) HOWARD, ALB.—Application of Science to Crop Production, 1929.
- (47) JENSEN, J. E.—Higher Tonnage with Closer Spacing. Farm Mgr., May, 1935.
- (48) JENSEN, JAS. H.—Studies of Root Habits of Cuban Cane. Trop. Plt. Resch. Found., Sci. Cont. 21, 1931.
- (49) KEOGH, F.—Intersacing of Cane Rows. *Procs. Qnsld. Soc. Sug. Cane Technols.*, IV, 1933.
- (50) KERR, H. W.—Tillage and Cultivation. Qnsld. Bur. Sug. Expt. Stas. Farm. Bull. 2, 1931.
- (51) KING, F. H.—Farmers of Forty Centuries. N.Y., 1895.
- (52) KLINGE, GERARDO.—La Industria Azucarera en Peru. Mstro. Fomento. Lima, 1924.
- (53) .....—*Ibid* del Hawaii. Soc. Nacl. Agra. Lima, 1928.
- (54) KOENIG, M.—Growth of Sugar Cane. Mauritius Dept. Agr. Sci. Bull. 13, 1929.
- (55) KONINGSBERGER, V. J.—Cane Cultivation and Field Operations in Java. Proc. Cong. Intl. Soc. Sug. C. Technols., III. Sbraya., 1929.
- (56) KRUGER, W.—Das Zuckerrohr und seine Kultur ... auf Java. Madgeburg and Wien, 1889.
- (57) KULESCHA, M.—Development of Root System of P.O.J. 2878 (Trans. Tit.). Arch. Suikerin. N.-I., XXXIX, pt. III, Med. 8, 1931.
- (58) LARSEN, L. D.—Statistical Information as Aid to Management on Plantations. Proc. H.S.P.A., I, 1930.
- (59) LEE, H. ACH.—Distribution of Cane Roots in Hawaiian Soils. Plt. Physiol., I, 1926.
- (60) .....—Work of Research Bureau of Phil. Sugar Assn. Sugar News, XII, 1931.
- (61) ..... AND MEDALLA.—Structure of Cane Plant in Relation to Cultivation. Proc. Conv. Phil. Sugar Assn., VI. Mula., 1928.
- (62) ..... AND WELLER.—Life of Seed-Piece Cane Roots and Progress at Different Ages. Plt. Physiol., II, 1927.
- (63) LINDNER.—Influence of Stand on Yield and Composition (Trans. Tit.) Cent. Zuikerin. XLIII, No.11, pp. 214—, 1935.

- (64) LIPPSCHNITZ, E.—La Industria Azucarera Argentina. Cont. Azero. Nacl., 1928.
- (65) LOCSIN CARLOS, L.—Tractors and Agr. Implements. Proc. Conv. Philip. Sug. Assn., V, 1927.
- (66) LOPEZ DOMINGUEZ, Fco. A.—Sugar Cane Growing in Puerto Rico. *Ibid* Intl. Soc. Sug. C. Technols., IV. S. Juan, 1932.
- (67) ..... TUERO, F.—Caña de Azucar. S. Juan, 1895.
- (68) LYMAN, O. H.—Recent Developments in Cultural Practices on Maui. Repts. Anl. Mtg. H.S.P.A., LII. Honolulu, 1932.
- (69) MARTENS, J.—Cultivation of Plant Cane by Intensive Methods. *Ibid* So. Af. Sug. Technols., V, 1931.
- (70) MASRY AND PATERSON.—The Tractor in Trinidad. Trop. Agr., IX, 1933.
- (71) MAXWELL, FRANCIS.—Economic Aspects of Cane Sugar Production. Ldn., 1927.
- (72) ..... WALTER.—Repts. for 1895-1901. H.S.P.A. Expt. Sta., Div. Agr. & Chem., Bulls. 1-5. Hnl., 1896-1902.
- (73) .....—Rept. Bur. Sug. Expt. Stas. Qnsld., 1904-5.
- (74) MAY, D. W.—Sugar Cane in Porto Rico. P.R. Expt. Sta. Bul. 9, 1910.
- (75) McCONNIE, R. C.—Cane Cultivation at Fajardo. Assn. Pro. Rico Sug. Technols., I, 1922.
- (76) ..... OREN AND DE CELIS.—Notes on Sugar Industry of Puerto Rico. *Ibid* Intl. Soc. Sug. C. Technols., IV. S. Juan, 1932.
- (77) MILNE AND ALI MOHAMMED.—Handbook on Field and Garden Crops of Punjab, 1932.
- (78) MIRASOL, J. J.—Research for the Sugar Industry in Philippines. Sug. News, XIII, 1932.
- (79) MOIR, W. W. G.—A Java Sugar Plantation. Facts Abt. Sugar, XXV. No. 3, 1930.
- (80) MUKHERJI, N. G.—Handbook of Indian Agriculture.
- (81) NEWLANDS, J. A. R.—Sugar Cane and Sugar. Ldn., 1869.
- (82) FRINGLE, J.—Southern Sugar Experiment Station. Bandaberg. In Annl. Rept. Qnsld. Bur. Sug. Expt. Stations, XXXIV, pp. 41-2, 1931.
- (83) PRINSEN GEERLIJS, H. C.—Cane Cultivation in Java. Intl. Sug. Jour., VI, pp. 277, 336 and 381. Ldn., 1904.
- (84) QUINTUS, R. A.—*Ibid*. Ldn., 1923.
- (85) REYNOSO, ALVARO.—Ensayo sobre el Cultivo de la Caña. Habana, 1925.
- (86) RICHARDSON KUNTZ, PEDRO.—Cane Spacing Experiments. Pro. Rico. Rev. Agr., 1931.

- (87) ROSENFELD, ARTHUR H.—Experimentos con Diferentes Anchuras de Trochas de Cana. Rev. Ind. Agr. Tuc., II, 1911. Memoria de la Estacion. *Ibid*, V, 1915.
- (88) .....—Some Epoch-Making Experiments in the Argentine. Sugar, Dec, 1919.
- (89) .....—Power Cultivation of Sugar Cane. Intl. Sug. Jour., XXII, 1920.
- (90) .....—The Question of the Distance between Cane Rows. *Ibid*, XXII, 1920, and XXIV, 1922.
- (91) .....—"Luz y Aire" en el Cultivo Moderno de la Cana. Rev. Agr. Pto. Rico, XIII, 1924.
- (92) .....—Tractor Cultivation of Cane. Facts Abt. Sugar, XX, 1925. How Old is Ten-Months-Old Cane? *Ibid*.
- (93) .....—La Plantacion de la Caña de Azucar. La. Henda., XX, 1925, and XXI, 1926.
- (94) .....—Cultivation of Cane in Peru. Intl. Sug. Jour., XXVIII, 1926.
- (95) .....—La Estacion Experimental de la Soc. Nacl. Agraria de Peru. Pycto. Psntdo. a la Soc. Lima, 1926.
- (96) .....—The Sugar Industry of Peru. Trop. Pl. Resch. Found., Sci. Cont. 6. Wshgtn., 1926.
- (97) .....—*Ibid* of Honduras. Intl. Sug. Jour., XXIX, 1927.
- (98) .....—*Ibid* of Formosa. *Ibid*, XXXI, 1929.
- (99) .....—La Estacion Experimental de la Industria Azucarera de Java. Bol. Un. Panam., LXIV, 1930.
- (100) .....—Stripping for Light and Air. Facts Abt. Sug., XXV, 1930.
- (101) .....—Optimum Sugar Cane Planting Date in Egypt. Min. Agr. Techn. Bul. 156, 1935.
- (102) STUBBS, W. C.—Sugar Cane in Field and Laboratory. La. Agr. Expt. Stas., Bull. 14, 1892.
- (103) .....—Sugar Cane. N. Orhs., 1897.
- (104) .....—*Ibid*. Field and Lab. Results for Ten Years. La. Exp. Sta. Bull. 59, 1900.
- (105) SUTHERS, W. F.—Weed Control with Arsenic. Haw. Pltr. Rec., X, 204, 1913.
- (106) TAGGART, W. G.—Tractor Cultivation. La. Pltr., IV-30-21.
- (107) TEMPANY, H.—Cultivation and Field Operations in Mauritius. Proc. Cong. Intl. Soc. S.C.T., III, 1929.
- (108) TEMPLETON, J.—Watering and Spacing Experiments with Egyptian Cotton. Minstry. Agr. Tech. Bull. 112, 1932.
- (109) TIEMANN, W.—Sugar Cane in Egypt. 1903.

- (110) TURNER, P. E.—Cultivation Experiments with Cane. Proc. Cong. Int. Soc. Sug. C. Technols., IV. S. Juan, 1932.
- (111) VENKATRAMAN AND THOMAS.—Sugar Cane Root Systems. Agr. J. India, XVII, 1922, and Mem. Dept. Agr. India, Bot. Ser., XVI, 5, 1929.
- (112) VILLELE, AUG. DE.—Rapport de Mission aux Iles Hawaïennes au Sujet de l'Industrie du Sucre. Réunion, 1911.
- (113) WALE, J. H.—Informe de las Subestaciones. Rev. Ind. Agr. Tuc., VI, 1915.
- (114) WALKER, H.—The Sugar Industry of the Island of Negros. Mnl., 1910.
- (115) .....—ALB.—*Ibid* of Mauritius. 1910.
- (116) WEBSTER, J. N. P.—Width of Cane Rows in Various Countries. Haw. Pltr. Rec., XXXV, 1931.
- (117) WILCOX, D. W.—El Cultivo de la Cana. Mundo Azero., XIX, 1931.
- (118) .....—Underlying Factors in Porto Rican Sugar Production. Facts Abt. Sug., XXVII, 1932.
- (119) WILLIAMS, C. HOLMAN B.—A Visit to West Indian Sugar Producing Islands. Br. Gna. Agr. Jour., IV, 1931.
- (120) .....—AND FOLLETT SMITH.—Field Expts. with Cane. *Ibid*. Sug. Bull. No. 1, 1933.





Fig. 1. - Observation station Puerto Rican occupied at 42 feet (M. 1900).



between the rows is seldom less than two meters  
from top row to bottom.



FIG. 3.—Good preparation eliminates much after-cultivation. Caterpillar tractor pulling a 3-disk plow in Natal, South Africa.



FIG. 4.—Wide-spaced cane is certainly susceptible to facile mechanical cultivation, but much time is required before the cane closes in and makes cultivation unnecessary.



FIG. 5. Roof system of Hawaiian type, intermeshed with the rows 14 metres apart.  
It can readily be seen that entwining underlayment should be used only with  
proper consideration of the roof injury that will take place. After 3 year (1).





FIG. 7.—In Louisiana the cane rows are just about twice as far apart as in Egypt and the production of cane per feddan about one-half the Egyptian yield.



FIG. 8.—In Egypt the standard practice is to plant nine rows of cane per two *qasabas*, which gives approximately 80 cms. between the rows.




FIG. 9.—At *Mateana*, the product of each replicated plot was loaded on a pair of railway vans, this constituting the "sample" ground at the Ermant factory.

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT

---

Technical and Scientific Service

(Botanical Section)

---

—BULLETIN No. 168—

# TONNAGE TESTS OF SOME IMPORTED SUGAR CANE VARIETIES

BY

ARTHUR H. ROSENFELD

*Government Sugar Cane Technologist*

(Recommended for publication by the Publications Committee of the  
Ministry of Agriculture, which is not, as a body, responsible for the  
opinions expressed in this Bulletin.)

Govt. Press, Bulâq, Cairo, 1936

Government Publications are on sale at the "Sale  
Room," Ministry of Finance. Correspondence  
relating to these publications should be addressed  
to the "Publications Office," Government Press,  
Bulâq, Cairo.

Price - - - - - P.T. 3

## Tonnage Tests of some Imported Sugar Cane Varieties

BY

ARTHUR H. ROSENFELD

The past quarter century has witnessed a number of revolutions in politico-military fields and consequent shuffling of geographical boundaries and "zones of influence." During the same period, but without the beating of drums and blare of trumpets characteristic of political upheavels, a no less radical revolution in the sugar cane agriculture of the world has taken place, the leaders of which have been the officers of the sugar cane experiment stations of several prominent cane countries, always in close *liaison* with the general staffs of their sugar companies, which have given not only their moral but their financial support as well to the great cause. The rise to power of the hitherto insignificant Communists in Russia, Fascists in Italy and Nazis in Germany has been no more significant than the agricultural *coups d'état* which have lifted the small islands of Java, Hawaii, and Puerto Rico from comparatively obscure positions in the sugar world to unquestioned leadership and dominance amongst cane-producing countries, many of which are far more extensive in area and strategically located as regards the world's markets.

At the beginning of the present century the total world's cane-sugar production was little over 5,000,000 tons. By the beginning of this notorious economic depression, which still holds the world in its grip, the world's cane-sugar crop had passed 18,000,000 tons.

Since the crop year 1911-1912 Java has increased her sugar production from 1,395,000 to almost 3,000,000 tons, the Hawaiian Islands from 596,412, to 1,029,000 tons and tiny Puerto Rico from 367,145 to just under a million tons.

These striking increases would lose their importance had acreages increased in anything proportionately approaching the out-turn of sugar, but the notable feature of the progress made is that production has been so remarkably stepped up while the increase in acreage has been extremely small in comparison, since in all these islands, as in Egypt, the cane area is limited in extent—in Java by Governmental decree in order to conserve most of the agricultural land for producing food crops for its enormous population of around 40 million souls and in little Hawaii and Puerto Rico for lack of available cane lands—



hence the greater part of this increased total production is the result of increasing, through scientific methods, the yield of cane *per feddan*. This, means, of course, a corresponding *decrease* in production costs *per kantar*, since it is axiomatic that the planting and cultivation of poor-yielding cane costs as much --or more-- *per feddan* as that of high-producing fields.

Dr. V. J. Koningsberger (8)\*, Agricultural Director of the famous *Proefstation voor der Java Suikerindustrie* (Java Sugar Experiment Station), stated in 1929 that Java's average yield of about 1,200 kantars of cane per feddan was more than double that obtained when the Experiment Station started its work. About the same rate of increase will apply to Hawaii's 1933 average yield of exactly 1,310 kantars per feddan (1,490 for the irrigated plantations) since the Hawaiian Sugar Planters Experiment Station was established, while Puerto Rico's present average yield of about 700 kantars of cane per feddan is almost 120 per cent higher than that for the island at the time of the establishment of its Insular Experiment Station in 1910.

Inasmuch as Egypt is a sub-tropical country with a short-growing season of  $8\frac{1}{2}$  to 9 months only, in contradistinction to the 14 to 26 months occupied by one crop of cane on the tropical islands above-mentioned, it is probably of interest here to demonstrate that sub-tropical sugar cane agriculture is *proportionately* as susceptible to improvement as that of the more favoured tropical regions. When the Tucumán (Argentina) Government established its sugar experiment station in 1910, cane yields in that province were dropping alarmingly, due to the ravages of Mosaic Disease. The new station immediately initiated the testing of hundreds of new varieties for their resistance to this disease, good field and factory yield etc. and by 1916, when the sugar industry of the province almost disappeared (the total yield of sugar that year was but, 45,000 tons), had on hand sufficient *taguari* of several superior disease-resistant types to initiate the replanting of the entire sugar area (11). As a result of this change of varieties and of improvements in general agricultural practice, the province of Tucumán ten years later produced 375,000 tons of sugar, the yield of cane per feddan having been trebled meanwhile (15).

In the same year (1926) the writer (20) was induced to return to Louisiana, where the same thing as had occurred in Tucumán was taking place in the cane fields, Mosaic Disease being largely responsible for the reduction of Louisiana's sugar production the following year to but 46,000 tons. With the Argentine experience under similar

climatic conditions in hand, the resurrection of Louisiana's industry could be promptly effectuated and six years later the sugar crop of Louisiana reached 210,000 tons and the yield per feddan had been almost trebled (24).

Finally, in Egypt the introduction and general adoption of the P.O.J. 105 variety has resulted in an increase of some 30 per cent in the yield per feddan.

The main brunt of the struggle for superior yields in each of these islands has been borne by the *varietal revolutionaries*, the plant breeders who have developed high-yielding and disease-resistant "Key" varieties particularly well adapted to their environments --P.O.J. 2878, the "Wonder Cane" of Java, *H. 109* which established a world record by producing around 500 kantars of sugar (about 3,200 kantars of cane) per feddan in Hawaii, and *B.H. 10 (12)* in Puerto Rico. But varietal changes have not been taken as the *panacea* of all agricultural ills and much of this agronomic victory has been due to careful investigation and determination of such important features of cane husbandry as the optimum time of planting, spacing, fertilization requirements, etc.

#### A BRIEF REVIEW OF EGYPTIAN VARIETAL INTRODUCTIONS

Until early in the present century practically the only canes grown for sugar production were the Black, Striped and White (Cristalina) Cheribon canes known as *Baladi* (Native) varieties, while a fair amount of the soft *Pharao* (Creole) variety was produced in Upper Egypt to be sold for chewing. In 1902, M. Henri Sans Boy, then Chemist at the Nag-Hamadi Factory and now Director General of the Egyptian General Sugar Co., brought from Java for trial in Egypt eleven varieties of sugar cane, amongst them the P.O.J. 105, for some mysterious reason now known as *Canne Américaine* in Egypt and as *Egyptian Amber* abroad, which has for many years been the standard cane of this country and is the basis of comparison in all our varietal experiments. Besides the P.O.J. 105, the following varieties were introduced that year:

White and Black Manila, Cheribon, Bourbon, Louzier, Striped Borneo, Java 247 (B) and P.O.J. 33, 36 and 106\*.

In 1909 eight additional varieties --White and Black Big Tanna, an indigenous variety known as Foo Tingo and M. 55, 139, 212, 1,030

\* For the terminology and heredity of these varieties, see the writer's "Sugar Cane Breeding in Egypt" (28).

\* Numbers in parentheses refer to list of references cited in Appendix II.

(the popular chewing cane known as *Khad el-Gamilin* in Egypt) and 1,900 (Perronat) — were introduced to Nag-Hamadi from the Island of Mauritius in the Indian Ocean. The following year P.O.J. 320 was obtained from Java and in 1917 D.J. 52 and F. 90. Then in 1920 the final large importation from Java was made, this including the following varieties:—

B. 96.	Batjan2.	P.O.J. 1507
B. 118.	Lahaina.	P.O.J. 1517
B. 221.	Yellow Calcedonia.	P.O.J. 1591
B. 379.	P.O.J. 139	P.O.J. 2379
DEM. 71.	P.O.J. 213	P.O.J. 2601
DEM. 1135.	P.O.J. 826	P.O.J. 2608
DL 46.	P.O.J. 920	P.O.J. 2610
DL 88.	P.O.J. 979	P.O.J. 2688
E.K. 2.	P.O.J. 1050	P.O.J. 2690
E.K. 6.	P.O.J. 1091	P.O.J. 2696
E.K. 28.	P.O.J. 1228	P.O.J. 2703
F. 160.	P.O.J. 1335	P.O.J. 2704
HAW. 109.	P.O.J. 1337	P.O.J. 2706
HAW. 112.	P.O.J. 1416	P.O.J. 2708
SW. 3.	P.O.J. 1419	P.O.J. 2714
SW. 111.	P.O.J. 1415	P.O.J. 2725
TJEP. 21.	P.O.J. 1499	P.O.J. 2727
Uba.		

In 1925, M. R. Roche, Manager of Nag-Hamadi, introduced from the Belgian Congo six varieties known as Kitobola Mauve and Yellow, Native Yellow, Inkisi Yellow, Eola Chocolate and Striped Congo and in 1928 he concluded his importations with the introduction of P.O.J. 2878.

M. Roche, who has kindly furnished us with this historic information, advises that in all some 200 varieties have been introduced and tested in Nag-Hamadi, the eighty listed here being only the better known canes which survived their preliminary trials. All of these were scientifically and practically tested for many years, usually in replicated plots and under varying environmental conditions, and none have proved quite equal to the time-tested P.O.J. 105 as a general purpose cane. Many, amongst them P.O.J. 979 and 2878, are still under extensive trial at Nag-Hamadi. As the writer has already remarked (27), however, any variety which proves to be definitely superior from all standpoints to the long established and well adapted P.O.J. 105 will have to combine exceptional qualities of vegetative vigour, disease resistance, high sucrose, etc.

The painstaking investigations carried on for three decades by Messrs. Naus Bey and Roche have been enormously valuable and merit the gratitude of all Egyptian cane planters. Certainly they have efficiently cleared the ground for the work of the new Division of Sugar Cane Investigations in the Ministry.

In 1925, while on mission in Cuba, Dr. Mohamed Ali Kilany arranged with Mr. Zell of Central Hershey to ship cuttings of ten promising varieties of sugar cane to Giza. These were despatched the middle of September and arrived here two months later, a period sufficiently long to permit of the disintegration of the paper varietal labels in the moist powdered charcoal in which the cuttings were packed. Consequently the varieties, only half of which germinated here, were given provisional Giza numbers, which were retained until the writer (26) identified them as follows: G. 4—H. 109; G. 7—B.H. 10 (12); G. 8—P.O.J. 2725; G. 9—Uba; G. 10—CH. 64 (21).

All of the above, with the exception of the last, are canes which have made history in distinct countries. H. 109 is almost (8) certainly a cross between *Lahaina* (*Bourbon*) and *Rose Bamboo* (*Cristalina* or *White Cheribon*) and is the principal cane under the better conditions of the irrigated sections of Hawaii, holding the world's record for commercial production of sugar per acre — almost 18 tons. B.H. 10 (12) is one of the main factors responsible for Puerto Rico's having doubled her annual production of sugar — per acre as well as total in the past ten years (12). P.O.J. 2725 (5) is of the same parentage as Java's "Wonder Cane", P.O.J. 2878, and is being largely grown in Formosa and Natal. Uba is the type-cane of the Chinese group of sugar canes, is immune to Mosaic Disease and, on this account, was the only variety allowed by the Government of South Africa to be cultivated in Natal until Storey's discovery of its extreme susceptibility to Streak Disease. CH. 64 (21) is said by Calvino (4), its producer to be a cross between Uba and D. 74, but is more probably a self-fertilized Uba seedling, as it shows no *Saccharum officinarum* characters whatsoever (16).

In 1928-1929 Dr. L. E. Melchers, through the courtesy of Dr. E. W. Brandes of the U. S. Dept. of Agriculture's Office of Sugar Plants Investigations, imported P.O.J. 36 (M.), 234, 2714 and 2883 and Co. 281.

In 1933 Mr. Feo. A. Lopez Dominguez, Director of the Puerto Rico Insular Experiment Station, shipped us cuttings of their promising P.O.J. 2725 x S.C. 12 (4) seedlings, P.R. 803 and F.C. 916, and Rao Bahadur T. S. Venkatraman, Indian Govt. Sugar Cane Expert at the Coimbatore Imperial Sugar Expt. Station, kindly sent us the Co. 290 variety, which is now giving so much promise in Louisiana, and the cane and durra crosses Co. 352, 398 and 399.

In June, 1934, the Natal Herbarium in Durban, S. Af., courteously sent us cuttings of P.O.J. 2952 and, the latter part of the year, the writer, while on mission in Puerto Rico, was able to obtain from the Insular Experiment Station planting material of two more promising P.O.J. 2725 x S.C. 12 (4) crosses, M.P.R. 28 and P.C. 1017.

While we have arranged for the shipment of a few more particularly promising varieties from India and elsewhere, we have very strictly limited importations of cuttings on account of the constant danger of introducing exotic diseases and insect pests which, fortunately, do not occur in Egypt, preferring to concentrate our efforts to obtain superior varieties on breeding new ones from true seed (28). Although we have to import our seed, there is little likelihood of introducing pests in this manner.

#### EXPERIMENTS AT MATAANA

Inasmuch as Dr. Kilany had had the varieties from Cuba and Washington propagated on the Ministry of Agriculture Farm at Kom Ombo, there existed in 1933 a source of seed supply for varietal checker experiments on the nearby Ministry Farm at Mataana. As, however, there was insufficient seed cane of all the nine varieties we wished to compare in the experiments with the standard P.O.J. 105, it was decided to ship by felucca seed enough of each to multiply at Mataana to the point where we could lay out a large-scale replicated experiment early the following year (1934). The land selected for the trials, a fairly light loam of apparently quite uniform texture, was well prepared after taking off a crop of beans, ridged at 9 planting furrows per 2 kassabas (about 80 cms.) and laid off in plots of 3 kirats  $\frac{1}{3}$  (1 acre) each during the first week of April, 1934. The field was dry-planted on April 9, each of the ten varieties being replicated three times in a randomized block arrangement, and watered the following day. 23 additional irrigations were given, the final one on the very late date of February 5, 1935 - less than three weeks before harvest. Four tassings were necessary - the first on May 8, and the final one following a middle cultivation on June 25. Three 100 kgms. sacks of nitro-sulphate of ammonia (26 per cent nitrogen) were applied in as many doses - June 2 and 27 and July 16 - and the canals were finally cleaned on July 5.

The experiments were harvested on February 24 and 25, 1935, the crop from each plot being loaded on to an individual numbered ear and ground and analysed separately at the Ermant Sucrerie, with the results shown on next page. The writer wishes to acknowledge his appreciation of the intelligent co-operation of Messrs. Cristofari

and Naus, Directors of the Ermant Factory, and of the material assistance given in carrying out and harvesting the experiments by Ministry of Agriculture Inspectors Hassan Khalifa and Rizk Mousa, Dr. M. A. Kilany of the Botanical Section and his assistants, Selim Nazif Effendi and H. A. Naggar Effendi.

YIELDS OF FIRST-YEAR CANE AT MATAANA

Variety	Kgs. Cane per Plot (4th Feb.)	Cane per Feddan		Richeuse	Kgs. Sugar per Feddan
		Metre Tonn	Kantar		
P.O.J. 105...	6,130			11.65	
"	6,170			11.13	
"	6,090			12.82	
P.O.J. 105...	6,350	50.800	1,131	13.67	5,137
P.O.J. 36 (M.)	5,910			11.56	
"	6,320			11.28	
"	1,970			11.11	
P.O.J. 36 (M.)	5,743	45.946	1,023	11.48	5,192
P.O.J. 36	5,340			11.51	
"	5,650			13.79	
"	5,170			11.77	
P.O.J. 36	5,387	43.661	959	11.37	1,956
P.O.J. 979	4,710			11.72	
"	5,620			11.7	
"	1,920			11.79	
P.O.J. 979	5,083	40.667	905	11.73	1,799
Co. 281	5,040			11.23	
"	4,030			13.79	
"	5,110			13.78	
Co. 281	1,737	37.891	841	13.97	1,241

YIELDS OF FIRST-YEAR CANE AT MATAANA (contd.)

Variety	Kgs. Cane per Plot (1th Fed.)	Cane per Feddan		Richness	Kgs. Sugar per Feddan
		Metric Tons	Kantars		
P.O.J. 231	1,680			14.33	
"	1,190			14.95	
"	1,390			13.78	
P.O.J. 231	1,420	35.360	787	14.35	4,066
H. 109	1,370			12.78	
"	1,150			13.20	
"	1,700			13.90	
H. 109	1,407	35.251	785	13.31	3,737
P.O.J. 2714	3,890			14.17	
"	3,370			14.27	
"	3,610			14.16	
P.O.J. 2714	3,690	29.520	657	14.17	3,336
B.H. 10 (12)	2,820			13.92	
"	2,850			13.84	
"	2,830			13.88	
B.H. 10 (12)	2,835	22.680	505	13.88	2,517
P.O.J. 2725	2,510			16.00	
"	2,510			16.08	
"	2,370			16.04	
P.O.J. 2725	2,510	20.320	452	16.04	2,601

It will be noted from a glance at the table that the standard control cane, *P.O.J. 105*, has outdistanced all the other varieties with the excellent average return of 1,131 kantars of cane and more than 5½ tons of sugar per feddan—over a hundred kantars of cane and 345 kgms. of sugar per acre above its nearest competitor. The differences between the striped (*Minka*) and ordinary form of *P.O.J. 30* are not statistically significant. As first-year cane there is usually little difference in cane yield between the two, with the striped type showing somewhat better sucrose. As ratoons the ordinary form seems more rugged (22) and generally gives better cane yields than the mutation, while the advantage of the *P.O.J. 30* (M.) in sucrose content usually increases with the age of the cane. Co. 281 has not maintained its reputation for extremely early ripening (3 & 7), but *P.O.J. 234* shows its characteristically high sugar content (25). The last four varieties in the list were notably short and stunted, indicating that they are typical tropical canes for which our growing-season is too short—a conclusion confirmed by their sugar content, except in the case of *P.O.J. 2725*, which is a notably early-maturing variety.

Duplicate experiments were started this year (1935) on the Ministry Farm at Mallawi, after having propagated there sufficient seed cane of the same varieties tested at Mataana.

#### SUMMARY AND CONCLUSIONS

The sugar world has witnessed a revolutionary increase in yields of cane per acre and in total world output, this being largely due to varietal improvement, along with improved cultural, fertilization and irrigation practices.

Importation of new cane varieties into Egypt was commenced by M. Henri Naus Bey at Nag-Hamadi in 1902, when he introduced *P.O.J. 105* along with ten other varieties, the former gradually replacing the previously grown *Baladi* (Cheribon) canes until little of the old favourites is today grown for sugar making. With *P.O.J. 105* Egypt's average yield of cane per feddan has been stepped up some 30 per cent. During the next 30 years M. Henri Naus Bey and his successor M. R. Roche imported and tried out at Nag-Hamadi about 200 varieties from various countries, none of which have been able to establish superiority over *P.O.J. 105* as a general purpose cane.

The results of trials at Mataana of nine of the most promising varieties introduced by the Division of Sugar Cane Investigations point to a similar conclusion. These experiments are being continued as second-year cane and a duplicate series has been laid down at Mallawi.



## APPENDIX I

### Simplified Descriptions of the Varieties at Mataana

In order to describe sugar cane varieties so that they may be definitely recognized by the layman as well as the expert it is essential to employ not only the methods, but to a very considerable extent the terminology of the usual botanical or taxonomic descriptions. This was first attempted by Barber (2) and followed by Woodhouse and Basu (30) in India, Earle (6), in his excellent series of descriptions, modified and condensed Barber's system and the present writer followed Earle in his Monograph of Cane Varieties (10). In the present descriptions, mention of a number of the less salient characteristics is omitted in order to avoid confusion, but reference must still be made to the following points:—

1. *General habit*; whether erect or soon prostrate, heavy or light standing and general vigour.

2. *The stalk as a whole*: average diameter (very thick, thick, medium, thin or very thin), colour and "bloom." Canes under 3 cms. in average diameter are characterized as very thin, those about 3 cms. as thin, 3-3½ cms. as medium, 3½-4½ cms. as thick and above 4½ cms. as very thick, referring, of course, to averages for well-developed canes and not to weak old canes or late emerging suckers. While the stalk colour constitutes one of the most obvious characters, it can be, as Earle (7) has pointed out, one of the most confusing also, since it is often dependent on growth, vigour or exposure to sunlight. "This is particularly true of that large number of varieties which are normally green but which show a more or less pronounced pinkish or reddish flush when exposed to light." Colour descriptions should always refer to fully matured internodes that have been exposed by fallen leaves, but are not yet discoloured or faded. The amount of the wax coating, or bloom, should be noted, although this, also, varies somewhat with growth conditions.

3. *Internodes*. Comparative average length should be given, although this can be only in general terms, since, again, this character is largely dependent on growth conditions and will frequently vary materially in different portions of the stalk. The general form should be stated, i.e. whether it is barrel-shaped, cylindrical or compressed at center, if it is enlarged at top or bottom and—an important point—whether or not it shows a groove or furrow on the lower side above the bud, as well as notes on length, depth, etc. of such groove.

4. *Nodes*.—Whether even, constricted or notably enlarged, at right angles to stalk or oblique. There are several important elements making up the nodal region, on which careful notes are often essential for identification, viz:—

(a) *The growth ring*, a narrow region separating the node from the internode above, which may or may not differ from the internode in colour, may be even, sunken or elevated and may vary considerably in width. In this region the cellular tissue remains in a plastic growing condition much longer than the remainder of the stalk and it is by the division and growth of the cells on the lower side that the younger growing part of the cane is enabled to resume an erect position after being lodged by wind or even by its own weight.

(b) *The root band*, or space between growth ring and point of attachment of leaf sheath, may range in width in distinct varieties from 6 to 12 mms. It is generally characterized by a shade of colour somewhat different from that of the internode and is marked by irregular encircling rows of rounded dots—the tips of the rudimentary roots which grow out to form the root system when cane is planted or the eye germinates. It is necessary to mention the number of root rows, as well as the size, colour prominence and abundance of the rudimentary root ends.

(c) *The leaf scar* is the remnant of the base of the leaf sheath remaining on the stalk when the leaf falls. As a general rule it is prominent (squarrose) beneath the bud and may be so all around, but is more likely to be closely appressed to the part of the stalk on the side opposite to the eye. As Earle points out, one usually encounters a conspicuous circle of long hairs on the base of the leaf sheath of very young cane joints, but these are commonly deciduous and fall away before the leaf matures, leaving the scar smooth, or "glabrous." "In a few varieties, however, they are persistent, leaving the leaf scar conspicuously ciliated—usually a constant character of considerable importance."

(d) *The glaucous band* is the region, usually around a centimetre in width, immediately below the leaf scar, which is characterized by a heavy wax deposit—even in those varieties showing little or no wax on the internodes, in which varieties this band is most conspicuous, since it is not obscured by the general bloom. The glaucous band is generally, though not invariably, conspicuously sunken, or constricted, while in some cases, such as in the *S. barberi* group, both the glaucous and root bands may be notably swollen and of considerably larger diameter than the internodes.

5.—*The buds, or eyes*, possess more taxonomic importance than any other portion of the cane plant, their characters being less variable and less dependent on growth conditions. However, their description should apply only to fully developed joints where the buds have not started to germinate on the standing stalk. As a rule in a sub-tropical country such as Egypt, cane above seven months old is in about the best condition for study of bud characters, and the following points should be noted:—

(a) *General form*, whether lanceolate, ovate, oval, orbicular, sub-orbicular or broader than long.

(b) *Margin*, whether this flat sterile edge is narrow and uniform in width, broad and uniform or shouldered (winged), i.e. abruptly widened below.

(c) *Size*, especially in relation to other nodal elements. In some cases the top of the bud does not reach the growth ring, while sometimes it may exceed the ring by as much as half the bud length.

(d) *Apical tuft*. The presence of a small tuft of hairs at the bud apex is occasionally a constant varietal character.

6.—*The leaf sheaths* of some varieties, such as *P.O.J. 2725* or *E 9*, have a dense vestiture of sharp, stiff, spiny hairs over most of their surface—often denominated “cane itch” by the workman whose skin and eyes are irritated by these “barbs.” These hairs may be persistent or more or less deciduous, appearing on the younger sheaths and falling off as maturity approaches. It is important to describe the general character, abundance and colour of this vestiture, since in many varieties it is reduced to a few scattered hairs along the median line at the back of the sheath (*glabrate*) and in some it is totally absent (*glabrous*). If much of a wax deposit is found on the sheath it is denominated *glaucous*. The colour is usually green, but in some varieties distinguishing characters are found when it is tinted with red or purple, or, as in *D. 1135*, it may be quite uniformly dark purple.

7.—*The leaf blades* may be spreading, erect with tips declined or even strictly erect as with *Co. 281*, and may vary in colour from the light or yellowish green of *P.O.J. 36*, through dark green to the glaucous, bluish or “onion” green of *Co. 287*. Notes should always be given as to whether they are narrow, medium, broad or very broad (as in *P.O.J. 2714*). Some varieties have very deep serrations on the leaf margins, while others have the margins almost smooth.

### P.O.J. 105\*

Erect, vigorous, strong stooler. Stalks tall, rather slender, amber colour when ripe, very heavy bloom. Internodes long, cylindrical or very slightly compressed, very slightly staggered, furrow evident. Nodes prominent, enlarged; growth ring broad, even, yellowish; root band broad, rudimentary roots inconspicuous, purplish, in about three rows, equal all around, not compressed behind (opposite bud), forming widest portion of stalk: glaucous band indistinct, being obscured by internodal bloom. Buds large, triangular, wide margin, strongly shouldered (as in *Baladi*), nearly glabrous. Leaf sheaths glabrous, tinted. Leaf blades suberect, but tips declined, long, narrow, bright green, scarcely serrulate.

### P.O.J. 36

Erect, very vigorous, strong stooler. Stalks long, somewhat slender (about like *P.O.J. 105*), green base, overlaid with rose to brownish purple, medium bloom. Internodes long, cylindrical, very slightly staggered, furrow scarcely evident. Nodes broad, prominent, oblique, not constricted; growth ring narrow, even with internodes, conspicuous, green changing to light reddish brown, root band broad, well defined, elevated, concolorous, with waxy covering, rudimentary roots small, inconspicuous, very few and scattered, 2-3 rows, purplish to concolorous; leaf scar glabrous, broad and prominent in front and appressed behind; glaucous band conspicuous, not constricted. Buds large, plump, broader than long, scarcely exceeding growth ring, orbicular, margins broad and uniform, distinct apical tuft of short hairs. Leaf sheaths glabrate, slightly glaucous, somewhat tinted, inner base slightly stained with purple. Leaf blades somewhat spreading with declining tips, narrow, long acuminate, weakly serrulate to base.

### P.O.J. 36 (M.)

This is merely a colour sport of *P.O.J. 36* which has a tendency— which is by no means constant—to show small rose-coloured stripes on the immature internodes. Otherwise it is identical in appearance with the common *P.O.J. 36*.

### P.O.J. 979

Erect, fine vigour. Stalks long, medium girth, green with purple flush, abundant bloom. Internodes long, almost cylindrical, slightly staggered, furrow broad and shallow to none. Nodes slightly elevated.

\* P.O.J. are the initials for *Proseduran Ost Java* (East Java Experiment Station).

margin greenish and narrow, even, concolorous; root band wide and red, reddish, oblique, covered with wax, concolorous; rudimentary roots small and rather inconspicuous, few and scattered, 2-4 rows, narrow; leaf scar glabrate, broad and prominent in front and appressed behind; glaucous band inconspicuous and almost even. Buds medium in size, not exceeding growth ring, orbicular, margins wide, imbricated at top. Leaf sheaths glabrate, no wax, light green. Leaf blades erect with declining tips, medium width, dark bluish green, upper two-thirds of margins serrated.

#### COIMBATORE 281

Erect, good vigour, splendid stooler. Stalks long, very thin, uncoloured, heavy bloom. Internodes long, cylindrical, very slightly staggered, no furrow. Nodes almost even, parallel; growth ring wide, slightly elevated, green changing to concolorous; root band wide, parallel, yellowish green to concolorous; rudimentary roots large, few and scattered, indistinct, 2-3 rows, purplish to concolorous; leaf scar glabrate and appressed behind; glaucous band wide, distinct, slightly constricted. Buds medium size, broadly ovate, reaching growth ring, margins very narrow, even, on upper half only, glabrate, no apical tuft. Leaf sheaths glabrate, glaucous, slightly tinted at outer base only. Leaf blades erect with slightly declining tips, narrow, glaucous green, minutely and uniformly serrulated.

#### P.O.J. 234

Erect, vigorous, fair stooler. Stalks long, slender, dull greenish with some red flush. Internodes long, cylindrical or slightly larger below, straight, furrow scarcely evident. Nodes broad, enlarged; growth ring broad, yellowish, even; root band enlarged; rudimentary roots obscure, scarcely evident; leaf scar glabrous, narrow, appressed behind; glaucous band clearly marked and not constricted. Buds small, passing growth ring, orbicular, becoming hemispheric, glabrous. Leaf sheaths glabrous; leaf blades spreading, numerous, narrow, hanging long on stalk, slightly serrulate.

#### II(AWAI) 109

Erect, good vigour, fine stooler. Stalks long, good girth, greenish pink to dark purple, becoming reddish brown on maturity, heavy deposit of greyish wax becoming dark with age. Internodes medium to long, somewhat staggered, cylindrical, slightly appressed at sides and enlarged at base opposite bud; furrow traces to none. Nodes oblique, even or slightly elevated; growth ring broad, nearly even,

green to concolorous; root band wide, oblique, light green to concolorous; rudimentary roots large, conspicuous, numerous, 3-4 in rows, purplish to concolorous; leaf scar glabrate and appressed behind; glaucous band broad, nearly even, inconspicuous. Buds medium size, reaching growth ring, plump, green to red and purple, orbicular; margins narrow, flat, glabrate, purple, concave at center but sometimes acute, wider at upper sides, gradually narrowing and ending at middle of bud, short apical tuft. Leaf sheaths with abundant dorsal lamination (woolly rather than spiny), sides glabrate, greenish purple, inner base slightly tinted with purple. Leaf blades erect with declining tips, wide, dark green, margins minutely and uniformly serrulated to base.

#### P.O.J. 2714

Erect, good vigour, fine stooler. Stalks long, very stout, greenish-brown with heavy purple flush on exposure to sun, considerable bloom. Internodes long, cylindrical, perpendicular to stalk, furrow trace to narrow, short, flattening. Nodes slightly enlarged and parallel; growth ring narrow, even in younger joints, widening and becoming elevated when older, yellow-green to concolorous; root band wide, slightly bulging, light green to concolorous; rudimentary roots few, large and scattered, elevated, in 2-3 rows, purplish; leaf scar glabrate and appressed behind; glaucous band narrow and inconspicuous, tapering. Buds medium size, ovate, reaching growth ring, margins narrow and triangular, sparsely laminated, long heavy apical tuft. Leaf sheaths heavily laminated at back, coarse tawny hairs, sides glabrate, green. Leaf blades spreading, very wide (about like P.O.J. 2725), dark green, not flat, minutely and uniformly serrulated to base.

#### B.H. 10 (12)\*

Erect or at length somewhat declined, vigorous, strong stooler. Stalks long, medium thickness, greenish but soon flushing to uniform dull pink marked with lines, often blotched, considerable bloom. Internodes medium length, staggered, somewhat constricted, larger below and shouldered opposite bud. Nodes constricted, oblique; growth ring rather broad but indistinct, enlarged on rear shoulder. Root band oblique, concolorous to paler, tapering downward, rudimentary roots small, purplish, in rows 3-4; leaf scar glabrous, appressed behind; glaucous band slightly constricted, somewhat obscured by internodal bloom. Buds nearly orbicular, only slightly exceeding growth ring, margins narrow, uniform, often purplish, sparse apical vestiture. Leaf sheaths with sparse vestiture of short appressed hairs,

\* B.H. signifies Barbados Hybrid (12), produced in 1910.

green or very slightly tinted, somewhat glaucous. Leaf blades sub-erect with declined tips, flat, widest above middle, light green, minutely serrulate.

P.O.J. 2725

Erect, fine vigour, good stooler. Stalks long, good girth, yellowish green to dark green with bronze flush on exposure to sun, no bloom. Internodes medium to long, cylindrical, slightly appressed at sides, slightly or not at all staggered. Furrow slight or narrow and deep, extending over half of internode. Nodes slightly constricted and oblique; growth ring broad, even or sometimes slightly elevated, light green to concolorous; root band oblique, medium width, concolorous; rudimentary roots few and large, in rows 2-3, purplish to concolorous, inconspicuous; leaf scar glabrate, appressed behind and prominent in front; glaucous band narrow, slightly constricted, conspicuous. Buds medium size, exceeding growth ring by one-fourth to one-third, oval to ovate, margins broad and flat, on upper half only, abruptly shouldered at sides making bud urn-shaped, long apical tufts. Leaf sheaths green inside and out, heavily spinose at back, sides glabrate. Leaf blades spreading and with declining tips, very broad, dark green with white midrib, margins uniformly serrate.

APPENDIX II

Literature Cited

- (1) ARGENEAUX & GIBBENS ... Variety Tests of Sugar Cane in La. during 1928-1929. U.S. Dept. Agr., Cir., 162, 1931.
- (2) BARBER, C. A. ... Studies in Indian Sugar Cane. Mem. Dept. Agr. in India, VII, 1915 *et seq.*
- (3) BOURNE, B. A. ... Some Yield Tests of Co. 281. U.S.D.A. Sug. Cane Breeding Sta., Canal Point, Fla. Miss., May, 1930.
- (4) CALVINO, E. & M. ... La Caña C. H. 64 (21)0, "Super-Uba." *Chaparral Agrícola*, 1, 708, pp. 1-12, 1924.
- (5) CHARDON, C. E. ... La Caña P.O.J. 2725. *Pto. Rico Ins. Expt. Sta.*, Bull. 34, 1928.
- (6) EARLE, F. S. ... Sugar Cane Varieties of Porto Rico. *Pto. Rico Ind. Agr.*, III, 2, 1919, & V, 3, 1921.
- (7) EARLE, F. S. ... Sugar Cane. N. Y., 1928.
- (8) MENENDEZ RAMOS, R. ... La Caña Hawaii 169. *Pto. Rico Resta. Agrar.*, XIII, No. 4, pp. 255-63, 1924.
- (9) KONINGSBERGER, V. J. ... Half a Century of Cane Growing in Java. *Proc. Cong. Intl. Soc. Sug. Cane Technol.*, III, p. 28. Srbya, 1929.
- (10) ROSENFELD, ARTHUR H. ... Las Variedades en la Estacion Experimental Agricola. *Rev. Indust. y Agrar. Tucuman*, VI, 6, pp. 231-78, 1915.
- (11) " ... Epoch-Making Java Cane. *Sugar*, Dec., 1917.
- (12) " ... The B.H. 10 (12) and S.C. 12 (4) Cane. *Pto. Rico Jour. Agr.*, IX, 3, 1925.
- (13) " ... The Outlook for Sugar in Louisiana. *Robt. Morris Assoc. Monthly Bul.*, IX, 7, pp. 245-50, 1926.
- (14) " ... Project for the Agri. Expt. Station of the National Agrarian Society of Peru. *La Pltr. Sug. Mafr.*, LXXVIII, 1927.
- (15) " ... The Tucuman Agricultural Expt. Station in its Relation to the Argentine Sugar Industry. *Trop. Plant Resch. Found. Sci. Cont.*, No. 7, Washington, 1927.
- (16) " ... A Monograph of Sugar Cane Varieties. *Pto. Rico. Jour. Agr.*, XI, 1927.
- (17) " ... The Java P.O.J. Cane. *Amer. Sug. Cane League Tech. Comm. Pub. I. N. Orlas.*, 1927.



- (18) ROSENFELD, ARTHUR H. ... *La Industria Azucarera del Perú*. Trad. R. Larco H., Lima, 1928.
- (19) " ... *Una Ojeada a la Industria Azucarera de Formosa*. Asoc. Hacendados Sta. Clara, Cuba, 1929.
- (20) " ... *The Decline and Renaissance of Louisiana's Sugar Industry*. Proc. Cong. Intl. Soc. Sug. Cane Technols., III, 1929.
- (21) " ... *Propagation of P.O.J. 36 Cane*. Facts about Sugar, May 19, 1930.
- (22) " ... *Varietal Planting Proportions*. Sug. Bull., IX, 1, pp. 13-1. N.-Orls., Oct. 1, 1930.
- (23) " ... *Variedades de Caña de Azúcar Resistentes al Mosaico*. La Hacienda, XXV, Nos. 10 and 11, 1930.
- (24) " ... *Progress in the Louisiana Sugar Industry*. Asoc. Comm. Red Book, N. Orls., June, 1931.
- (25) " ... *Empleo de Fertilizantes para la Caña P.O.J.* 274. Ind. Azucra., XXXVII, pp. 132-3. Bs. Aires, 1932.
- (26) " ... *Recent Sugar Cane Technology in Egypt*. Intl. Sug. Jour., XXXVI, pp. 139-40, 1934.
- (27) " ... *Nomenclature and Genetics of Sugar Cane Seedlings*. *Ibid.*, XXXVII, pp. 311-6, 1935.
- (28) " ... *Sugar Cane Breeding in Egypt*. Min. Agr. Tech. Bull. 161, 1936.
- (29) VENKATRAMAN & THOMAS ... *Coimbatore Seedlings*. Agr. and Livestk. in India, I, Pt. 2, pp. 128-31, 1931.
- (30) WOODHOUSE & BASU ... *Distinguishing Characters of Sugar Canes at Sabour*. Mem. Dept. Agr. India, VII, No. 2, pp. 105-55, 1915.



Only two or three cuttings of foreign varieties are imported in each case. These must then be multiplied to provide experimental planting material.




Fig. 1

Staggered internodes.  
In this variety the *lanceolate* (spindle-shaped) bud exceeds the growth ring at lower right.




Fig. 2

Some Characters Exposed in Artificial Descent  
The *X-leaf* R. 1. 1. 1.

- 1st Internode
- 2nd Growth Ring
- 3rd Bud Ring
- 4th Last Node
- 5th Lanceolate Bud
- 6th Radially by R. 1. 1.



Fig. 3

In this variety the oral bud barely exceeds the growth ring just above the adjacent bud.  
The bud is not over the prominent lanceolate bud. It is pointed (see Fig. 1).  
The internodes are straight (see Fig. 1).



Fig. 4

Here the bud exceeds the growth ring by one-third of its length. The internode lanceolate bud is constant and the broad *lanceolate* bud extends almost the length of the internode.

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT

---

Technical and Scientific Service  
(Botanical and Plant Breeding Section)

---

BULLETIN No. 169

---

# MANURIAL REQUIREMENTS OF SUGAR CANE IN EGYPT

## I.—Optimum Rate of Nitrogen Experiments

BY

ARTHUR H. ROSENFELD

*Govt. Sugar Cane Technologist*

(Recommended for publication by the Publications Committee of the  
Ministry of Agriculture, which is not, as a body, responsible for the  
opinions expressed in this Bulletin)

Govt. Press, Bulâq, Cairo, 1937

Government Publications are on sale at the "Sale  
Room" Ministry of Finance. Correspondence relat-  
ing to these publications should be addressed to  
the "Publications Office," Government Press,  
Bulâq, Cairo.

Price - - - - - P.T. 4.

## Contents

	PAGE
Introduction .....	1
The Mataana Trials .....	2
First-Year Cane Results (Table I) .....	3
Second .....	5
( .. II) .....	
Experiments at Mullaui .....	6
Detailed Crop Figures (Table III) .....	7
Nitrate of Soda Trials (Table IV) .....	8
The Kom-Omba Tests .....	9
Kom Omba (Table V) .....	10
Atmour Gebli (Table VI) .....	11
Ismailieh (Table VII) .....	12
Condensed Results (Table VIII) .....	13
Some Similar Results in Louisiana .....	14
Nitrate and Cyanamid Experiments (Table IX) .....	15
Hourly Rate of Nitrogen .....	17
(Table X) .....	
Summary .....	19
Bibliography .....	21

## Graphs

	Opp. Pag.
I.—Mullaui Rate of Nitrogen Experiments Yields .....	Frontispiece
II.— .. Monetary Values—Nitrate of Lime Experiments .....	5
III.— .. Cane Quality and Nitrogen Rates .....	6
IV.— .. Monetary Values—Nitrate of Soda Experiments .....	8

## The Manurial Requirements of Egyptian Sugar-Cane

### I.—Optimum Rate of Nitrogen Experiments

With the constantly intensified development of the world's synthetic nitrogen industries during the past two decades, the culminating overproduction of which coincided with the initiation of the universal economic crisis in 1929, unit prices of nitrogen have fallen by more than one-half, while the use of nitrogenous fertilizers the world over has just about doubled.

Has the hard pressed sugar industry taken advantage of this 50 per cent -- or more -- drop in price per unit by proportionally reducing this important item in the total cost of producing its cane? In general it would seem that the answer must be a categorical negative -- at least in the subtropical producing countries. The writer (32) \*vividly recalls how a few years ago, when inorganic nitrogenous manures could be purchased in Louisiana at just half the unit price of but two years earlier, he was hard put to persuade some of even the most progressive planters that they would not be justified in spending the usual amount per acre on fertilizer by *doubling their field applications*. And here in Egypt one is frequently assured by capable and intelligent growers that every bag of fertilizer -- apparently irrespective of whether it is one of the nitrates with 15½ nitrogen content or Nitro-Sulphate of Ammonia or Nitro-Pet with 26 per cent -- will produce an extra hundred kantars of cane, despite all applications of the law of diminishing returns and abundant evidence in their own fields that excessive nitrogen frequently results in badly lodged cane or in immature late growth which must be cut off before the cane is sent to the mills, with the result that all too often a smaller tonnage of low-quality cane is produced than where normal amounts of nitrogen had been more economically employed. In some sections one sees as much as 4 bags of Nitro-Sulphate, corresponding to over a hundred kgs. of nitrogen, applied per feddan -- a quantity which appears positively fantastic in a country having a growing season of at least 8 to 8½ months.

\*Numbers in parentheses refer to Bibliography at back of Bulletin.

Yet, years before present-day low prices for manures, there was a quite general recognition in the sugar world that excessive fertilization adversely affects juice quality and in Egypt manuring was for many years not permitted at all on lands controlled by the old *Daira Sanieh*. Undoubtedly this deleterious effect is intensified in countries having the short growing seasons of Egypt, Louisiana or Argentina when nitrogen is supplied in excess or too late in the season, since it is evident that not only is the maturity of the original stand of cane delayed by the availability of considerable nitrogen just when it should normally begin ripening, but the growth of suckers is stimulated to the extent that this second growth attains a size, but not a ripeness, which would justify its inclusion with cane usually sent to the factory.

In order to determine what Geerts (14) in Java aptly denominates the "Economic Optimum" nitrogenous application for several Egyptian soil types and districts — i.e. the units of nitrogen from distinct sources which will produce for the grower the *largest net return in piastres per feddan*, since there is manifestly no commercial advantage in obtaining increased yields from heavy manurial applications if the value of the additional cane does not represent a substantial return on the cost of the additional fertilizer — and to investigate effects on both cane and sugar yields, the writer in 1932 initiated a number of large-scale replicated experiments in various typical cane-growing section of Upper Egypt, with nitrogen applications (from several different sources) of 30, 40, 45, 50, 60, 65, 75, 80, 90, and 105 kilograms per feddan. Further series to test out the effect of additions of phosphoric acid to the various nitrogen ratios are also under way, but these will be considered in a later paper, since nitrogen is the chief manurial constituent now in use in the Egyptian sugar cane industry and it seems advisable to consider, in as uncomplicated a manner as possible, the economic implications of its use alone in varying amounts and from different sources. All plots have been made of a standard size of four kirats, which at harvest furnish a sufficient tonnage to avoid retarding factory operations when the product of each replication is ground and analysed, thus eliminating any futile attempt to arrive at worth-while conclusions from analyses of small samples ground on hand mills. Each treatment is replicated at least four times and the arrangement of all plots is in randomized blocks.

#### THE MATAANA TRIALS

At the Mataana Farm of the Ministry the experiments are located on a fairly light loam of high fertility and quite uniform texture, the land having carried beans and maize the previous year. It was given a thorough tractor plowing in mid-December, 1932, and another followed by *Zahaffing*, early in January, 1933. The beginning of

TABLE I.—MATAANA RATE OF NITROGEN EXPERIMENT

## First-Year Cane

Harvested 11 23 to 25-34

Sacks Nitro-Sulph. per Feddan	Plots (4 Kirats)	Kgs. Cane per Plot	Cane per Feddan		Middings	Purity	Gluc. Coef.	Kgs. Sugar per Feddan
			Net Tons	Kantars per Feddan				
1½ (39 Kgs. Nit.)	A - 3	6,910	—	—	13-72	81-5	3-5	—
1½ (39 " " "	A - 11	6,660	—	—	13-32	83-2	3-8	—
1½ (39 " " "	A - 18	7,540	—	—	12-99	81-7	4-7	—
1½ (30 " " "	A - 20	7,750	—	—	12-78	82-0	4-4	—
1½ (39 Kgs. Nit.) Average		7,215	43-320	964	13-20	82-9	4-1	4,514
2 (52 Kgs. Nit.)	B - 5	7,380	—	—	13-24	82-6	3-5	—
2 (52 " " "	B - 9	7,610	—	—	13-67	83-7	3-9	—
2 (52 " " "	B - 14	7,370	—	—	13-17	81-3	5-3	—
2 (52 " " "	B - 22	7,700	—	—	13-50	82-5	4-7	—
2 (52 Kgs. Nit.) Average		7,515	43-015	1,002	13-40	82-5	4-4	4,773
2½ (65 Kgs. Nit.)	C - 4	7,150	—	—	13-96	85-6	3-2	—
2½ (65 " " "	C - 7	6,690	—	—	12-65	89-6	5-7	—
2½ (65 " " "	C - 15	7,620	—	—	13-19	81-9	5-7	—
2½ (65 " " "	C - 23	7,180	—	—	13-17	80-8	5-4	—
2½ (65 Kgs. Nit.) Average		7,160	43-080	959	13-24	82-2	5-0	4,481
3 (78 Kgs. Nit.)	D - 2	6,870	—	—	13-42	82-6	4-5	—
3 (78 " " "	D - 10	7,590	—	—	13-45	83-5	5-3	—
3 (78 " " "	D - 13	7,620	—	—	12-36	79-3	5-8	—
3 (78 " " "	D - 24	7,360	—	—	12-84	80-3	3-8	—
3 (78 Kgs. Nit.) Average		7,353	44-685	995	13-02	81-4	4-4	4,538
3½ (91 Kgs. Nit.)	E - 6	8,470	—	—	13-72	84-8	2-9	—
3½ (91 " " "	E - 8	6,990	—	—	12-92	81-3	4-1	—
3½ (91 " " "	E - 16	7,910	—	—	13-05	81-8	5-0	—
3½ (91 " " "	E - 19	7,120	—	—	12-41	81-1	5-6	—
3½ (91 Kgs. Nit.) Average		7,623	45-885	1,023	13-03	82-3	4-5	4,795
4 (104 Kgs. Nit.)	F - 1	7,030	—	—	13-28	82-1	4-3	—
4 (104 " " "	F - 12	7,660	—	—	13-16	82-9	3-7	—
4 (104 " " "	F - 17	7,110	—	—	12-66	80-7	5-0	—
4 (104 " " "	F - 21	7,730	—	—	13-17	82-5	3-9	—
4 (104 Kgs. Nit.) Average		7,458	44-985	1,001	13-07	82-1	4-2	4,699
3 Smaller Treatments Average					13-26	82-5	—	—
3 Larger Treatments					13-04	81-9	—	—

February it was divided off into carefully measured plots of 1/6th feddan, each with a wide border division from its neighbours, ridging was carried out at 9 ridges per 2 kassalas (about 80 centimetres.) and a week later the canals were constructed and the planting furrows cleaned. *P.O.J.* 105 tagawi was dry planted in two running rows the last week in February and watered immediately thereafter. With the exception of manurial treatments, the further cultivations and irrigations were identical to those described in the writer's recent bulletin on cane spacing experiments (33) and the same acknowledgements for co-operation in carrying out and harvesting the experiments are again gratefully recorded for all experiments.

Nitro-Sulphate of Ammonia, containing 6 per cent nitrogen, was used as source material in the Mataana tests, since this was the manure most generally employed locally for sugar cane, six rates of application per feddan being employed, beginning with 1½ sacks (150 kilograms), representing approximately 40 kilos of nitrogen per feddan, and increasing with increments of ½ sack up to 4 bags, or about 105 kilograms of nitrogen per acre, the maximum being commonly employed in the Mataana district. The manure was applied in three doses, the first on May 9, 1933, the second on first June and the final one a month later. Harvesting was carried out exactly a year after the experiment was planted out, with the results shown in detail in Table I.

The variations between the average yields of the different series are far too small to be statistically significant as regards the effect of large applications of nitrogen to first-year cane following legumes on rich land, but they are, collectively, highly significant in indicating that our starting point of approximately forty kilograms of nitrogen per feddan was far too high and that there is practically no response under such conditions to applications of more than 50 kilograms of nitrogen per feddan - in other words, that any fertilizer employed at a higher rate than 50 kilograms N. per acre is simply wasted. This indication is in itself a valuable one and appears to be borne out by the long experience of Mr. R. Roche, Manager of the Nag-Hamadi *Sucrerie*, who finds that on the best lands of that section, which are quite comparable in quality with these excellent Mataana soils, the best return on his fertilizer investment on first-year cane is obtained from applications of one single sack of Nitro-Sulphate or its nitrogen equivalent of approximately 26 kilograms per feddan from other sources.

The effect of the heavier applications on the sucrose content is not very marked and the slight differences are not statistically significant, but it is worth noting that the cane receiving the three lighter applications had an average *Richesse* almost a quarter of a point higher than that receiving the heavier applications, which would mean the recovery in the factory of about 1½ kilograms additional sugar per ton of cane. Hence, as a result of the higher manufacturing

value, the plots receiving two sacks of Nitro-Sulphate actually produced 67 kilograms of sugar per feddan more than the slightly higher tonnage 3½-sack plots.

It was expected that the results from the second-year cane would be more significant, since most of the nitrogen supplied by the legume crop would have been utilized by the first-year cane and such proved to be the case. Agricultural operations were identical to those in the spacing experiment (33) and the second-year cane was harvested exactly one year after the first-year crop, with the average results detailed in the first section of Table II.

TABLE II.—MATAANA RATE OF NITROGEN EXPERIMENT  
*Average Results*

Sacks Nit-Sulph. per Feddan	Plots (1/6th Acre)	Cane per Feddan Met. Tons	Kantar Richesse	Purity	Glu- cof.	Kgs. Sugar per Feddan
--------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------	--------	--------------	--------------------------------

*A.—SECOND-YEAR CANE*

1½ (39 Kgs. N.)	A-3, 11, 18, 20	39.675	883	14.52	87.3	2.3	4,902
2 (52 " )	B-5, 9, 14, 22	46.470	1,034	13.66	85.6	3.0	5,065
2½ (65 " )	C-4, 7, 15, 23	47.175	1,050	13.83	87.1	2.4	5,236
3 (78 " )	D-2, 10, 13, 24	48.255	1,071	13.99	86.6	2.1	5,165
3½ (91 " )	E-6, 8, 16, 19	46.710	1,010	13.85	86.5	2.4	5,185
4 (104 " )	F-1, 12, 17, 21	46.665	1,039	13.68	86.2	2.6	5,084
Average of Three Smaller Treatments		...	...	14.00	84.7	—	—
" " Larger		...	...	13.83	86.4	—	—

*B.—ANNUAL AVERAGES FOR THE TWO YEARS*

1½ (39 Kgs. N.)	A	41.498	924	13.86	85.1	3.2	4,558
2 (52 " )	B	45.743	1,018	13.52	81.1	3.7	4,919
2½ (65 " )	C	45.128	1,004	13.54	84.7	3.7	4,859
3 (78 " )	D	46.470	1,035	13.51	84.0	3.3	4,972
3½ (91 " )	E	46.298	1,031	13.43	84.4	3.5	4,946
4 (104 " )	F	45.825	1,020	13.38	84.2	3.5	4,848

Average of three Smaller Treatments...		...	...	13.63	84.6	—	—
" " Larger...		...	...	13.44	84.2	—	—

With the ratoon cane we find a highly statistical response to the first increment of  $1\frac{1}{2}$  sack Nitro-Sulphate, the plots receiving 2 bags producing almost seven tons (161 kantars) more cane and close to half a ton more sugar than those fertilized with  $1\frac{1}{2}$  sacks. Increments above two sacks, however, again fail to produce any statistically significant response in cane tonnage, as in the case of the first-year cane, and again the cane of the three lighter treatments shows an average *Richesse* about a fifth of a point higher than that of the cane receiving the very heavy applications. All yields and analyses are superior to those of the first crop, with the exception of the plots receiving but  $1\frac{1}{2}$  sacks of Nitro-Sulphate, which show the need of more nitrogen being applied to second-year cane to offset that supplied by legumes the first year.

Again it seems evident that the planter who applies more than two sacks of Nitro-Sulphate per feddan under the conditions of this experiment is *simply throwing away one Egyptian pound for each additional bag he supplies.*

#### EXPERIMENTS AT MALLAWI

The Mallawi trials are also located on a Government Farm on a fairly light loam of quite comparable character to that on which the Mataana experiments were conducted. Unfortunately, the cane could not be planted until May, 1933, and it was felt that that was too late in the season to conduct optimum nitrogen trials, hence our experiments with Nitrate of Lime ( $15\frac{1}{2}$  per cent nitrogen), the most commonly employed manure in the Minya section, were initiated only with the second-year cane. Details of preparation, cultivation and irrigation are identical to those described for the Mallawi spacing experiments (33). The four rations of Nitrate of Lime (2, 3, 4, and 5 sacks, corresponding to 31, 47, 62 and 78 kilograms nitrogen per feddan) were applied in three doses, the first on May 23, 1934 (a fortnight after the corresponding application in the Mataana experiments), the second one month later and the third on 12th July, and the second-year cane was harvested on March 8, 1934, — just ten months after the first watering of the stubbles — with the detailed results shown in Table III and Graphs I, II and III.

The slight increases of cane tonnage with each increment of 15 kilograms of nitrogen are too small to be statistically significant and, even were these consistently small increases regarded as significant, the value of the additional cane obtained, *without consideration of its radically decreased sugar value*, would not justify the expense of additional manure, as is clearly brought out in Graph II. Although our starting rate for the Nitrate of Lime applications was some eight kilograms of nitrogen per feddan less than in the Mataana trials, it was still

TABLE III. — MALLAWI RATE OF NITROGEN EXPERIMENT

Second-Year Cane				Harvested III-8 & 9-35				
Sacks Nit. Lime per Feddan	Plots	Kgs. Cane per Plot	Cane per Feddan		Richesse	Purity	Ginc. Coef. Red. % (Sug.)	Kgs. Sugar per Feddan
			Met. Tons	Kantars				
2 (31 Kgs. Nit.)	A - 4	7,500	—	—	12.58	83.2	5.6	—
2 (31 " " )	A - 6	6,579	—	—	13.11	83.7	5.0	—
2 (31 " " )	A - 9	6,820	—	—	11.92	81.4	7.5	—
2 (31 " " )	A - 15	6,670	—	—	11.80	82.4	4.7	—
2 (31 Kgs. Nit.)	Average	6,890	11.310	926	12.35	82.6	5.6	1.051
3 (47 Kgs. Nit.)	B - 3	7,970	—	—	10.17	73.2	9.8	—
3 (47 " " )	B - 5	6,790	—	—	10.03	77.9	8.5	—
3 (47 " " )	B - 12	6,310	—	—	10.28	78.7	9.0	—
3 (47 " " )	B - 14	7,370	—	—	10.89	82.6	7.5	—
3 (47 Kgs. Nit.)	Average	7,110	12.660	950	10.34	79.4	8.7	3.327
4 (62 Kgs. Nit.)	C - 2	7,380	—	—	10.13	79.6	9.0	—
4 (62 " " )	C - 8	6,510	—	—	10.57	79.7	8.4	—
4 (62 " " )	C - 11	7,330	—	—	10.28	78.8	8.3	—
4 (62 " " )	C - 13	7,380	—	—	9.88	78.2	8.6	—
4 (62 Kgs. Nit.)	Average	7,158	12.915	956	10.22	78.9	8.6	3.307
5 (78 Kgs. Nit.)	D - 4	7,759	—	—	10.16	78.8	7.6	—
5 (78 " " )	D - 7	7,200	—	—	8.88	74.2	9.8	—
5 (78 " " )	D - 10	7,670	—	—	10.19	79.4	8.2	—
5 (78 " " )	D - 16	7,200	—	—	10.13	79.4	7.4	—
5 (78 Kgs. Nit.)	Average	7,450	11.700	995	9.83	77.9	8.6	3.303

manifestly too high to show the point of optimum economic response, but we were fortunate in having a co-operative Nitrate of Soda experiment under practically identical conditions on the Mallawi Farm, the unfertilized control plots of which afford us a reliable basis for calculating the financial benefits from our Nitrate of Lime applications. The nine replications of the Nitrate of Soda unfertilized controls, as shown in Table IV and Graph IV, gave an average yield for first and second-year cane (1934 and 1935 crops) of just 684 kantars of cane per feddan





**TABLE V.—RATE OF NITROGEN EXPERIMENTS AT KOM-OMBO GEBLI**

*First-Year Cane*

*Harvested April 8 & 9, 1935*

Sacks Nit. Sulph. per Feddan	Plots (4 Kirates)	Kantars Cane		Tons Cane per Fed.	Richesse (Sucrose in Cane)	Purity	Gluc. Ratio (Red. % Sucrose)
		Per Plot	Per Fed.				
1 (26 Kgs. Nit.)	A - 2	192.76	—	—	14.30	85.4	3.3
	12	201.16	—	—	14.54	85.1	4.4
	17	205.96	—	—	12.70	81.6	5.4
	21	207.42	—	—	13.30	83.2	4.5
1 (26 Kgs. Nit.)	Averages	201.83	1210.95	54.00	13.71	83.8	4.4
1½ (39 Kgs. Nit.)	B - 4	217.91	—	—	13.73	84.5	3.9
	8	222.44	—	—	14.53	85.2	3.6
	15	219.95	—	—	13.17	81.6	5.3
	23	214.35	—	—	12.62	80.8	6.1
1½ (39 Kgs. Nit.)	Averages	218.66	1311.97	58.94	13.51	83.0	4.7
2 (52 Kgs. Nit.)	C - 5	222.44	—	—	13.40	83.6	3.9
	9	208.40	—	—	13.09	82.6	5.1
	13	225.70	—	—	12.92	82.1	5.5
	22	203.24	—	—	13.05	82.5	—
2 (52 Kgs. Nit.)	Averages	214.95	1289.67	57.94	13.12	82.7	4.9
2½ (65 Kgs. Nit.)	D - 6	203.07	—	—	13.24	83.1	4.6
	7	229.29	—	—	13.10	82.6	4.8
	16	222.62	—	—	13.23	82.8	4.6
	20	219.78	—	—	13.45	83.1	4.9
2½ (65 Kgs. Nit.)	Averages	218.69	1312.14	58.95	13.26	82.9	4.7
3 (78 Kgs. Nit.)	E - 1	192.35	—	—	14.86	86.3	3.2
	10	251.24	—	—	13.21	82.2	5.1
	14	222.49	—	—	12.38	80.3	6.7
	24	193.33	—	—	13.25	83.7	5.0
3 (78 Kgs. Nit.)	Averages	214.85	1289.11	57.91	13.43	83.1	5.0
3½ (91 Kgs. Nit.)	F - 3	216.85	—	—	12.91	82.5	4.7
	11	241.20	—	—	12.13	80.0	7.1
	18	193.96	—	—	15.04	86.9	4.0
	19	232.93	—	—	13.83	83.2	5.4
3½ (91 Kgs. Nit.)	Averages	221.24	1327.41	59.63	13.48	83.2	5.3
Averages of 3 Smaller Applications		—	—	—	13.45	83.2	—
" " 3 Larger		—	—	—	13.39	83.1	—

**TABLE VI.—RATE OF NITROGEN EXPERIMENTS AT ATMOUR GEBLI**

*First-Year Cane*

*Harvested March 25 & 26, 1935*

Sacks Nit. Sulph. per Feddan	Plots (4 Kirates)	Kantars Cane		Tons Cane per Fed.	Richesse (Sucrose in Cane)	Purity	Gluc. (Red. % Sucrose)
		Per Plot	Per Fed.				
1 (26 Kgs. Nit.)	A - 2	154.67	—	—	14.78	87.1	2.6
	12	169.31	—	—	15.90	88.8	1.9
	17	116.13	—	—	16.73	88.6	2.0
	21	119.42	—	—	16.24	88.5	2.3
1 (26 Kgs. Nit.)	Averages	139.88	839.29	37.70	15.91	88.3	2.2
1½ (39 Kgs. Nit.)	B - 4	178.36	—	—	16.16	88.9	1.4
	8	160.22	—	—	15.93	88.9	1.8
	15	175.20	—	—	15.45	87.3	2.6
	23	135.07	—	—	16.12	88.2	2.3
1½ (39 Kgs. Nit.)	Averages	162.21	973.27	43.72	15.92	88.3	2.0
2 (52 Kgs. Nit.)	C - 5	190.58	—	—	15.96	88.6	1.8
	9	181.56	—	—	15.98	88.7	1.8
	13	175.33	—	—	16.23	89.0	2.0
	22	161.73	—	—	15.95	88.5	2.3
2 (52 Kgs. Nit.)	Averages	177.30	1063.80	47.79	16.03	88.7	2.0
2½ (65 Kgs. Nit.)	D - 6	190.62	—	—	15.43	87.9	1.9
	7	185.42	—	—	15.89	87.8	1.7
	16	106.18	—	—	16.38	88.1	2.2
	20	180.00	—	—	16.01	88.4	2.3
2½ (65 Kgs. Nit.)	Averages	165.55	993.23	44.62	15.93	88.1	2.0
3 (78 Kgs. Nit.)	E - 1	183.42	—	—	15.46	88.3	1.8
	10	167.02	—	—	15.87	88.7	1.6
	14	178.22	—	—	16.13	88.6	2.4
	24	164.05	—	—	15.57	87.7	2.2
3 (78 Kgs. Nit.)	Averages	173.18	1039.06	46.68	15.16	88.3	2.0
3½ (91 Kgs. Nit.)	F - 3	116.19	—	—	16.01	88.5	1.8
	11	178.89	—	—	15.33	87.1	1.8
	18	169.73	—	—	15.95	87.8	2.2
	19	161.69	—	—	15.20	86.9	2.5
3½ (91 Kgs. Nit.)	Averages	164.20	985.20	44.26	15.65	87.7	2.1
Averages of 3 Smaller Applications		—	—	—	15.95	88.4	—
" " 3 Larger		—	—	—	15.78	88.0	—

TABLE VII.—RATE OF NITROGEN EXPERIMENTS AT ISMAILIEH  
First-Year Cane Harvested March 23 and 24, 1935.

Sacks Nit. Sulph. per Feddan	Plots (4 kintars)	Kantars Cane		Tons Cane per Fed.	Richesse (Sucrose in Cane)	Purity	Chic. Ratio (Red. % Sucrose)
		Per Plot	Per Fed.				
1 (26 Kgs. Nit.)	A - 2	148.18	—	—	15.85	87.0	2.8
	12	172.00	—	—	15.37	86.6	3.7
	17	160.76	—	—	15.81	88.1	2.9
	21	114.71	—	—	15.81	88.5	2.6
1 (26 Kgs. Nit.)	Averages	148.91	893.47	40.14	15.71	87.6	3.0
1½ (39 Kgs. Nit.)	B - 4	131.02	—	—	15.98	88.4	2.4
	8	144.45	—	—	15.43	87.2	2.8
	15	162.80	—	—	14.20	84.5	4.3
	23	164.04	—	—	15.41	87.8	3.1
1½ (39 Kgs. Nit.)	Averages	150.58	903.46	40.59	15.26	89.5	3.2
2 (52 Kgs. Nit.)	C - 5	114.18	—	—	16.27	88.8	2.3
	9	186.44	—	—	15.68	87.6	3.0
	13	137.25	—	—	15.38	88.7	2.3
	22	179.82	—	—	14.81	85.1	4.4
2 (52 Kgs. Nit.)	Averages	151.42	926.52	41.62	15.54	87.6	3.0
2½ (65 Kgs. Nit.)	D - 6	128.26	—	—	15.57	87.3	2.9
	7	151.75	—	—	16.24	88.7	2.7
	16	184.58	—	—	15.17	86.3	3.5
	20	180.85	—	—	15.04	85.3	4.4
2½ (65 Kgs. Nit.)	Averages	162.11	972.66	43.70	15.51	86.9	3.4
3 (78 Kgs. Nit.)	E - 1	120.05	—	—	16.58	89.1	2.3
	10	190.58	—	—	14.09	85.0	3.7
	14	158.80	—	—	15.65	87.1	2.1
	24	189.46	—	—	15.14	87.3	3.1
3 (78 Kgs. Nit.)	Averages	161.72	988.33	41.50	15.37	87.1	2.8
3½ (91 Kgs. Nit.)	F - 3	161.75	—	—	15.45	87.6	2.6
	11	190.80	—	—	14.99	87.1	2.3
	18	182.00	—	—	15.40	87.5	3.6
	19	180.80	—	—	14.64	86.1	3.1
3½ (91 Kgs. Nit.)	Averages	179.59	1077.52	48.41	15.12	87.1	2.9
Averages of 3 Smaller Applications		...	...	...	15.50	88.2	—
" " 3 Larger		...	...	...	15.33	87.0	—

half-sack of Nitro-Sulphate shows an increment in cane yield over 1½ sacks of ninety kantars. Two sacks, then, have produced the largest amount of cane per feddan, all higher applications producing slightly less cane.

At *Ismailieh* it appears from Table VII that one sack of Nitro-Sulphate produced the *commercially optimum* return, each additional increment of one-half sack up to three bags consistently increasing the cane yield, but by less than a ton of cane per feddan — not enough to pay for the additional manure. The increase of 89 kantars of cane shown by the additional half-sack application over the 3-bag one would be economically significant were it obtained in the lower brackets, but, with no commercial return from the fertilizer increments up to three sacks, it would seem extremely hazardous to apply 3½ bags in expectation of a satisfactory yield increase at that high level.

As regards the effect of the larger applications of nitrogen on the quality of the cane, we find that, just as at Mataana where the cane was both planted and manured at optimum times, there is no statistically significant reaction in any of the Kom-Onbo experiments, although it is again interesting to note that in each of them the cane from the three series of plots receiving the heavier applications shows slightly lower average *Richesse* and purity than that from the three lighter fertilized series.

Perhaps the best picture of the Kom-Onbo results can be obtained by a study of the average results from the three experiments, as summarized in Table VIII.

TABLE VIII.—RATE OF NITROGEN EXPERIMENTS AT KOM-ONBO  
Condensed Results of the Three Tests

Sacks Nit. Sulphate per Feddan	Kantars Cane per Feddan	Tons (Metric) Cane per Feddan	Richesse (Sucrose in Cane)	Purity	Chic. Ratio (Red. % Sucrose)
1 (26 Kgs. Nit.)	981.24	43.95	15.11	86.6	3.2
1½ (39 " " )	1062.90	47.75	14.96	86.9	3.3
2 (52 " " )	1093.33	49.12	14.95	87.3	3.3
2½ (65 " " )	1092.71	49.09	14.96	86.0	3.4
3 (78 " " )	1105.50	49.70	14.85	86.2	3.3
3½ (91 " " )	1130.04	50.77	14.75	86.0	3.4
Average of 3 Lighter Applications			14.96	86.6	—
" " 3 Heavier			14.83	86.1	—

Here we see that the addition of half of a sack of Nitro-Sulphate to our basic application of one bag has resulted in the production of four tons additional cane per feddan while, in accordance with the law of diminishing returns, another half-sack of Nitro-Sulphate produces less than half the additional increment secured from the first one. Again, as in all our other experiments, the *absolute optimum* coincides with the *commercially best application*, since there is no economically significant increase in cane yield from applications of more than 52 kilograms of nitrogen per acre. Hence, the results of the diversified trials at Kom-Omho serve to strengthen the indications already given by the Mataana and Mallawi ones, *i.e.* that the planter who applies more than fifty kilograms of nitrogen per feddan to his canefields is absolutely wasting the value of the additional quantity. The uniformity of the results of these widely scattered experiments on distinct soil types and under varying climatic conditions would seem to point the way to very material economies in our planter's manurial programs. The use of four—and even five—sacks of Nitro-Sulphate or an equivalent quantity of nitrogen in other carriers (above 100 kilograms per feddan) is all too common in Upper Egypt. If 20,000 feddans are receiving two bags more than necessary, as now seems quite probable, there is in this one phase of Egyptian canehusbandry an opportunity to economize L.E. 30, 000 to 40,000 per annum. "A pound saved is a pound earned."

#### SOME SIMILAR RESULTS IN LOUISIANA

In the principal soil types devoted to sugar cane culture, in the climatically reduced growing seasons and even in the types of *P.O.J.* canes which are principally grown, there is a close enough parallel between conditions in Egypt and those of her sister subtropical cane producing country to warrant a brief study of rate of nitrogen experiments made in Louisiana, bearing in mind that in that western region cane is invariably planted something less than one-half as thickly (the average distance between the rows is about 170 centimetres, against 80 centimetres in Egypt) as it is here (33) and that, therefore, a pound (454 grams) of nitrogen should, theoretically, have about the same proportional relation to the reduced stand and crop yield as one kilogram under Egyptian conditions. Furthermore, due to the practically universal practice of interring a legume crop before planting Louisiana sugar cane, fertilizer is seldom applied to first-year cane, hence our comparisons must be drawn from results of nitrogenous applications to second-year or older cane.

During the five years prior to his coming to Egypt in 1932 the writer conducted a considerable number of rate of nitrogen experiments, with various source materials, these being widely distributed

over the Louisiana "Sugar Bowl." From the data of these trials, there have been averaged the crop figures for twenty distinct experiments (13 with Chilean Nitrate of Soda and 7 with a high grade Calcium Cyanamide (21 per cent nitrogen) carried out on sedimentary soils of a type very similar to those of our better canelands, with the results shown in Table IX.

TABLE IX.—RATE OF NITROGEN EXPERIMENTS IN LOUISIANA

*Condensed Results of the Two Series of Tests\**

Lbs. Fertilizer per Acre	Tons Cane per Acre		Juice Analyses			Lbs. Available Sugar per Acre	
	Yield	Increase over Checks	Brix	Sucrose	Purity	Yield†	Gam.

#### A.—NITRATE OF SODA IN 13 EXPERIMENTS

Controls No Fertilizer	...	11.37	—	15.80	13.24	83.77	2,729	—
200 (31 Nit.)	...	20.81	9.47	16.03	13.11	81.78	3,915	1,186
300 (46 " )	...	21.70	10.32	16.11	13.04	80.94	4,011	1,282

#### B.—CYANAMID IN 7 EXPERIMENTS

Controls No Fertilizer	...	16.97	—	15.98	12.43	78.91	2,990	—
100 (21 Nit.)	...	22.50	5.53	16.00	12.57	78.16	3,970	980
200 (42 " )	...	24.82	7.85	15.82	12.15	78.00	4,261	1,271
300 (63 " )	...	26.50	9.53	15.53	11.53	77.14	4,351	1,361

\* Average results for three years with *P.O.J.* second-year cane (rotundata).

† Calculated by employing 11 Jaws (Winter Crop, Formula, 1 assuming 75% extraction and 100% Balling House Efficiency (37).

The average results from both series of experiments are strikingly similar in trend to those from our Egyptian tests. In the Nitrate trials one sack of fertilizer has produced an average increase of 6½ tons of cane and almost 1,200 pounds of sugar per acre over the control

plots, while the additional increment of less than a ton of cane and a hundred pounds of sugar per feddan from a third bag would not justify the additional expenditure. In the Cyanamid tests one sack has produced an average gain of  $5\frac{1}{2}$  tons of cane and almost half a ton of sugar per acre over the mean of the controls, while the gain from the next increment of one sack of Cyanamid is, as in our experiments, less than half that from the first sack, but still *statistically* and economically significant. The small increase obtained from the third sack would again fail to justify the additional expenditure. It will be noted, also, that in both series there is a small, but consistent, drop in cane quality as successive increments of nitrogen are employed.

In discussing these results, the writer (30 and 31) concluded:

"Firstly, 30 to 40 lbs. of nitrogen per acre would appear to be about the *commercial maximum* to apply ..... under the conditions of these experiments.

"Secondly, the addition of 15 to 20 lbs. of nitrogen to what we might call our standard ration in these experiments of 30-40 lbs. has shown no *commercial* advantage ..... We find a quite uniform commercial response up to 30-40 lbs. .... per acre and a still uniform but decidedly smaller, increase in tonnage from the extra application of 15-20 lbs. nitrogen as compared with the results from the 30-40 lbs. applications.

"Thirdly, we have proven pretty definitely ..... that an investment ..... in applying 30-40 lbs. of nitrogen will result in a *sure profit* of 150 per cent to 300 per cent on the investment and the writer knows of no other single phase in the cultivation of sugar cane, from the time the ground is broken until the cane is on the conductor, where an investment of any amount can secure such a large end almost certain parentage return. Pass 40 lbs. .... per acre—and perhaps even 35 — and there seems to be a depressive effect on the sucrose."

Remarkable confirmation of the above conclusions has subsequently resulted from an extensive series of *source* of nitrogen experiments conducted co-operatively by the Soil Fertility Division of the U.S. Bureau of Soils and the Louisiana Experiment Station. In the spring of 1930 a comprehensive experiment was designed and laid out by O'Neal and Breaux (25) on Yazoo very fine sandy loam, one of the best Louisiana soil types for sugar cane, near Houma, with four rates of applications of 20, 40, 60 and 80 lbs. of nitrogen per acre of the more common carriers, Cyanamid, Sulphate of Ammonia, Sodium and Calcium Nitrates and Calurea. The test was laid down in duplicate plots and continued for two years — one on second-year and one on third-year cane. In 1933 a similar experiment was conducted by Hurst,

O'Neal and Breaux (18) at a new location on the same plantation where there was an excellent stand of the same *P.O.J. 213* cane used in the previous trials, each treatment being replicated four times.

The investigators concluded from the results of three years that no superiority of one source of nitrogen over another had been indicated "that the source of nitrogen is not as important a factor as the rate of application." Since, then, the trends were identical with varying quantities of the different carriers, we have in these carefully controlled experiments a most valuable series of five distinct *rate* of nitrogen tests carried on through three years. It has occurred to the present writer to average the results from each nitrogen range for the five source materials, with the results found in Table X. Inasmuch as cane is now seldom carried beyond the second year in Egypt, the figures for first ratoons in 1930 are given in greater detail than for the older cane.

TABLE X.—RATE OF NITROGEN EXPERIMENTS AT HOUMA, LOUISIANA

*Average Results with Five Sources of Nitrogen*

A.—DETAILED FIGURES FOR SECOND-YEAR *P.O.J. CANE-1930*

Lbs. Nitrogen per Acre	Tons Cane per Acre		Juice Analyses				Lbs. Available Sugar per Acre	
	Yield	Increase	Brix	Sucrose	Purity	Sugar per Ton. Lbs.	Yield	Gains over Checks
None Controls	20.8	—	15.69	13.21	84.20	179.1	3,725	—
20	26.0	5.2	15.96	13.60	85.21	185.7	4,826	1,101
40	29.3	8.5	15.80	13.35	84.49	189.7	5,299	1,574
60	28.7	7.9	15.41	12.54	81.38	167.0	4,798	1,073
80	32.3	11.5	14.91	11.72	78.45	152.8	4,925	1,200

TABLE X (contd.)

## B.—SUMMARIZED RESULTS FOR THIRD—&amp; FOURTH—YEAR P.O.J. CANE

Lbs. Nit. per Acre	Third-Year Cane — 1931				Fourth-Year Cane — 1932				Averages for 3 Crops			
	Tons Cane per Acre		Lbs. Sugar per Acre		Tons Cane per Acre		Lbs. Sugar per Acre		Tons Cane per Acre		Lbs. Sugar per Acre	
	Yield	Gain	Yield	Gain	Yield	Gain	Yield	Gain	Yield	Gain	Yield	Gain
None	13.0	—	3,198	—	14.6	—	2,546	—	18.1	—	3,156	—
20	24.9	5.9	3,796	598	19.3	4.7	3,619	1,073	23.4	5.3	4,080	924
40	25.4	6.4	3,965	767	21.5	6.9	3,863	1,317	25.4	7.3	4,376	1,220
60	24.0	5.0	3,725	527	24.0	9.4	4,003	1,457	25.6	7.5	4,175	1,019
80	26.2	7.2	3,825	627	23.6	9.0	3,741	1,195	27.4	9.3	4,164	1,008

The similarity of the results from these experiments and from the writer's Cyanamid trials, where the nitrogen increments were practically the same (Table IX, B), is strikingly apparent. In the writer's experiments the first 20 lbs. of nitrogen produced 5.5 tons more cane and 940 lbs. more sugar per acre than the controls, compared with 5.3 tons and 924 lbs. in the experiments under consideration, while the second increment of 20 lbs. N. produced an additional 2.3 tons more cane and 334 lbs. of sugar in the Cyanamid trials as against 2 tons and 296 lbs. for the Houma tests. As regards the effect of higher quantities of nitrogen on the composition and yield of sugar per acre, it will be noted that the trend of the Houma results (Louisiana's actual growing season is at least a month shorter than that at Mataana or Kom-Ombo) is remarkably similar to that of our Mallawi experiments (Table III) in that the maximum sugar yield of 1,220 lbs. per acre at Houma was obtained from the plots receiving 40 lbs. of nitrogen per acre and that after that point each *addition of nitrogen resulted in the production of less sugar per feddan* and no economically significant increase in cane tonnage. As the investigators remarked:—

"It would appear, therefore, that applications of over 40 pounds of nitrogen per acre are of little economic value."

The Louisiana cane planters' fertilizer program (La. Expt. Sta. Extn. Cir. 151, 1933) is now based on the earliest practicable application of 36 pounds of nitrogen per acre, "using that source which gives the desired quantity of nitrogen at the cheapest price per pound."

## Summary

With the cheapening of the unit prices of nitrogenous manures, due to the enormous development of the synthetic industries in the past two decades, there has come about a rather universal tendency amongst cane growers to spend the same amount per acre on manures and thus apply much larger quantities. In many parts of the cane-growing world this practice seems to have resulted in the application of considerably more than the *commercial optimum* of fertilizer, i.e. such an amount as costs more than the value of the additional — if any — cane and sugar produced. In subtropical countries such as Egypt, Louisiana or Argentina, with climatically limited growing seasons, this economic optimum is much more easily passed than in the actual tropics and it has seemed advisable to establish for the several distinct Egyptian cane zones and soil types the amount of nitrogenous manure which will ensure to the cane grower the maximum return on his investment in actual *piastres per feddan*.

To this end large-scale replicated experiments were laid down several years ago at Mallawi, Mataana and Kom-Ombo in such a manner as to adequately determine the *economic value* of quantities of nitrogen — from distinct source materials — ranging from 30 to 165 kilograms per feddan. At Mataana this optimum was reached at two sacks of Nitro-Sulphate of Ammonia (51 kilograms of nitrogen) per feddan, no significant increase in yield being obtained above that figure (Tables I and II). At Mallawi (Table III) two bags of Nitrate of Lime (31 kilograms N.) per feddan produced the economic optimum yield of cane per feddan and with each additional increment of one sack of Nitrate the resulting yield of sugar per feddan *decreased* alarmingly, due to the depressing effect of the heavier nitrogen applications on the maturity and sucrose content of the cane.

At Kom-Ombo experiments identical in every way to those at Mataana except for a lower starting base (one sack of Nitro-Sulphate of Ammonia instead of 1½ sacks) were laid down in three distinct *piastre-rehs*. The average results show a trend almost identical to that of the nearby Mataana tests (Table VIII).

Inasmuch as there is a considerable similarity in soil, climatic and varietal conditions in the two subtropical cane countries, a number of results from rate of nitrogen experiments in Louisiana are compared (Tables IX and X) with those from our Egyptian tests. The results in all cases show remarkably similar trends.

The uniformity of the results of these experiments in various regions of Egypt's cane growing area would seem to point the way to economies in our planters' manurial outlay of from L.E. 30, 000 to 70,000 per annum.

# BIBLIOGRAPHY

1. AGNE, H. P.—Fertilization for Soil Amendment and Maintenance. Repts. H.S.P.A. Anl. Mtg., L., Hnlu., 1931.
2. ALEXANDER, W. P.—Influence of Nitrogenous Fertilizers on Sucrose Content of Sugar Cane. Hawaiian Planters' Record, XXXII, 1928.
3. BOBERG, G.—Gooit de suikerindustrie geld weg bij de toepassing van Kunstbemesting. Arch. v. d. Skrind. Ned.-Ind., 1933, No. 15, pp. 501-12.
4. BOWLES, SIDNEY J.—Fertilizer Recommendations for Sugar Cane. Sug. Bull., XI, No. 13, pp. 5-6, 1933.
5. CLIFF, A. P.—Manuring of Sugar Cane in North Bihar. Ind. Ja. Agr. Sci., I, p. 652-12, 1931.
6. COATES, FIEGER AND SALAZAR.—La. Ptr. and Sugar Mfr., LXXX, p. 421, 1928.
7. CROSS, W. E.—Has the Sugar Industry been Throwing away Money on Fertilizers? Intl. S. J., XXXV, 1933.
8. DEERE, NOEL.—Cane Sugar, p. 99. Lndn., 1921.
9. DEMANDT, E.—Optimum Nitrogen Fertilization for P.O.J. 2678 (Trans. Tit.) Arch. Suikind. Ned. Ind., XXXIX, Deel III, Meded. 12, pp. 561-81, 1931.
10. DEOMANO, F. V.—Philippine Agriculturist, XX, p. 139.
11. DODDS, H. H.—The Manuring of Sugar Cane. Empire Jn. Exptl. Agr., 1, 4, 1933.
12. DODDS, H. H.—Notes on Some Fertilizer Experiments Harvested in 1934. Proc. Anl. Cong. Sou. Af. Sug. Technols. Assn., IX, Durban, 1935.
13. EARLE, F. S.—Sugar Cane and its Culture. N.Y., 1928.
14. GEERTS, J.M.—Meded. v. h. Proefsta v. d. Java. suikind. Landbouwkund. serie, No. 5, 1920.
15. GRACIE, KHALIL AND ENAN.—An Analysis of the Factors Governing the Response to Manuring of Cotton in Egypt. Min. Agr., Tech. Bull. 132, Cairo, 1935.
16. HEDLEY AND BEATER.—Absorption of Plant-Foods by Sugar Cane. Proc. Anl. Cong. Sou. Af. Sug. Technols. Assn., VII, 1933.
17. HONIG, P.—De aschbestanddeelen van suikerriet. Arch. Skind. Ned.-Ind., 10, p. 435, 1934.
18. HURST, O'NEAL AND BREAUX.—Nitrogen Requirements on Sugar Cane... in Louisiana. Sug. Bull., XI, No. 13. N. Orleans, 1st. April 1, 1933.
19. KERR, H. W.—FARM Fertility Trials. Qusland. Bur. Sug. Expt. Stas Farm. Bulls. 1 and 3, 1931 and 1932.
20. KLINGE, GERARDO.—Politica de Irrigacion. La Vida Agricola, XII, 1933.
21. LOPEZ-DOMINGUEZ, F. A.—Sugar Cane Soil and Fertilizer Research in Peru. Proc. Cong. Intern. Soc. Sug. Cane Techls., IV., Bull. 78. S.J., 1932.
22. MARTIN, J. P.—Sugar Cane Growth in Nutrient Solutions. Haw. Pitr-Rec., XXXIX No. 2, pp. 79-96, 1933.
23. MITSCHELICH, E. A.—Physical Properties of Soils and Crop Yields (Trans. Tit.). Publ. Inst. Belge Amelior. Patterave III, No. 3, pp. 93-102, 1935.

24. MOIR, W. W. G.—HAWAIIAN Soils and Fertilizer Research. Cong. Intl. Soc. S. Cane Technols., IV. S. Juan, 1932.
25. O'NEAL AND BREAUX.—Soil Fertility Investigations... Louisiana. La. Exp. Sta. Bull. 222, 1931.
26. PARDO, J. H.—Utilization of Certain Nitrogen Compounds by Sugar Cane. Intl. Sug. J., XXXIV, 1932.
27. ROSENFELD, ARTHUR H.—Ensayos con Abonos. Rev. Indstl. y Agr. Tucumán, II, 1911, and V, 1915.
28. ROSENFELD, ARTHUR H.—La Estación Experimental de la Sociedad Nacional Agraria de Peru. Lima, 1926.
29. ROSENFELD, ARTHUR H.—La Estación Experimental de Java. Bol. Pan.—Amer. Un. No. 68, 1930.
30. ROSENFELD, ARTHUR H.—Results of Some Co-operative Fertilization Tests. Sug. Bull., VI, 15, 1928; VII, 9, 1929; VIII, 11 and 16, 1930; IX, 9 and 18, 1931.
31. ROSENFELD, ARTHUR H.—Fertilizer Experiments in Louisiana. Intl. Soc. Sug. C. Technols., IV, Bull. 95. San Juan, 1932.
32. ROSENFELD, ARTHUR H.—Wasteful Sugar Cane Fertilization. Intl. Sug. Jour., XXXV, 1933.
33. ROSENFELD, ARTHUR H.—Optimum Sugar Cane Planting Date in Egypt. Min. Agr., Tech. Bull. 156, 1935. The Spacing of Sugar Cane in Egypt and Elsewhere. *Ibid*, 1936.
34. SAINT, S. J.—Report of Agr. Chemist. Rept. Dept. Sci. and Agr. Barbados. 1929-1930, p. 76.
35. SAINT, S. J.—Manurial Experiments on Sugar Cane, 1928-1932. Agric. J. Barbados, Oct., 1932.
36. SMITH, A. K.—Use of Cyanamid as Source of Nitrogen for Sugar Cane in Louisiana. La. Exp. Sta. Bull. 237, 1933.
37. SPENCER, G. L.—Handbook for Cane-Sugar Manufacturers. N.Y., 1917 *et seq.*
38. STUBBS, W. C.—Cultivation of Sugar Cane. N. Orlns., 1900.
39. TURNER, P. E.—Manurial Experiments with Sugar Cane. Trop. Agr., IX, p. 177, 1932, and X, p. 60, 1933.
40. WILLIAMS AND FOLLET-SMITH.—Field Experiments with Sugar Cane. Br. Guiana Dept. Agr. Bull. 1, 1933.



FIG. 1. Fertilization at the optimum rate yields large stalks.



FIG. 2. Loading the Matamoros experimental cane (F. O. B. 1933).






FIG. 3.—Checking up on Kom-Omho plantings. (Photo Mizrahi.)

GRAPH I

رسم رقم (١)


نسبة الآزوت في تجارب ملوى — تأثير زيادة الآزوت في محصول القصب والسكر  
١٩٣٤ - ٣٥

MALLAWI RATE OF NITROGEN EXPERIMENTS  
Effect of Increasing Nitrogen on Yield of Cane & Sugar  
1934-35



جوانق (١٠٠ ك.ج.) نترات الجير (١٥ ٪ آزوت) المعطاه للفدان  
Sacks (100 kgs.) Nitrate of Lime (15 1/2 % Nitrogen per Feddan)

بيان القيمة النقدية لأقصى التسميد في تجارب ملوى ١٩٣٥ - ١٩٣٤

GRAPH SHOWING MONETARY VALUE OF MAXIMUM  
MANURING OF SUGAR CANE AT MALLAWI  
1934-35

1 Kantar Sugar Cane = 35 P.T.

100 Kgrs. N.L. = 70 "

Shaded space represents cost of manure


٣٥ = القصب = ١ قنار

٧٠ = ١٠٠ ك.ج. من نترات الجير = ١٠٠ ك.ج. من نترات الجير

المساحة المظلمة تمثل تكلفة التسميد

GRAPH III

رسم رقم ٣



# NITRATE OF SODA EXPERIMENTS AT MALLAWI


## MONETARY VALUE

ثمرات الصودا في تجارب ملوى

القيمة النقدية

Average Results for First (1933-34) &amp; Second year (1934-35) Cane

متوسط حصص السنة الأولى (١٩٣٣-١٩٣٤) والسنة الثانية (١٩٣٤-١٩٣٥)



1 Kantar Sugar Cane = P.T. 3 1/2

1 Sack Nitrate of Soda = " 70

٧٠ = ثمن القنطار من القصب

٧٠ = ثمن الكانتار من نترات الصودا

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT

Technical and Scientific Service

Botanical and Plant Breeding Section

—BULLETIN No. 173—

# MANURIAL REQUIREMENTS OF SUGAR CANE IN EGYPT

## II.—The Kom-Ombo Phosphate Experiments

BY

Arthur H. Rosenfeld

*Govt. Sugar-Cane Technologist*

(Recommended for publication by the Publications Committee of the Ministry of Agriculture, which is not, as a body, responsible for the opinions expressed in this Bulletin.)

Government Press, Bulâq, Cairo, 1936.

Government Publications are on sale at the "Sale House," Ministry of Finance. Correspondence relating to these publications should be addressed to the "Publications Office," Government Press, Bulâq, Cairo.

Price - - - - - P.T. 4

# CONTENTS

	Page
Introduction	1
Some Earlier Subtropical Investigations	2
Argentina	3
Louisiana	4
Investigations in Egypt	6
Soil Types, Preparation and Cultivation	7
Visual Effect of Phosphates on the Cane	7
Harvesting Methods and Yields	8
K.-O. Bahari (Table III)	9
Abbassieh (Table IV)	10
Raghama Shark (Table V)	11
Sabah Gebli (Table VI)	12
Negative Results at Three Nizarehs	13
Positive Results at Sabah Gebli	15
Conclusions	15
Summary	16
Bibliography	18

## Manurial Requirements of Sugar-Cane in Egypt

BY

Arthur H. Rosenfeld

*Govt. Sugar Cane Technologist*

---

### II.—The Kom-Ombo Phosphate Experiments

---

#### INTRODUCTION

That the employment of abundant phosphates in the fertilizer program will inevitably result in richer sugar cane, irrespective of the  $P_2O_5$  content of the soil in which it grows, is rather an established legend in cane agriculture, although there is little or no experimental evidence to justify it. True it is that capable Hawaiian investigators (21, 24 and 29) have shown that increasing applications of phosphates to the soil may be reflected in mounting quantities of phosphates in the juice of the cane, thus rendering clarification and general processing more facile, but these satisfactory results have invariably been obtained from phosphate applications to *phosphate-deficient soils*—of which we have very few in the Egyptian cane area—where it is probable that  $P_2O_5$  was the limiting food factor and that the added phosphates merely reestablished the plant food equilibrium essential for proper metabolism.

Indeed, other Hawaiian data on phosphates and potash present in the juices of cane from experimental plots and fields, which include a large number of such tests on the progressive Oahu Sugar Co. estates, appear to show rather definitely that as the normal cane plant matures the phosphoric acid content tends to rise and that of potash to decline. Moir (29), who has carried out some careful investigations along this line, illustrates this trend by analyses of the various thirds (upper, middle and lower) of cane stalks, inasmuch as it is logical to assume that the bottom portion of growing cane will be riper than the top. In an average of twenty stalks of 22-months-old Yellow Caledonia cane, for instance, the upper, middle and lower thirds showed  $P_2O_5$  contents of .017 per cent, .023 per cent and .040 per cent respectively, while the  $K_2O$  percentages were .087, .061 and .055 in the same order.



Many investigators have studied the mineral content of sap or plant juices of other crops and have arrived at the same conclusions as McCool and Weldon (22) in their classical investigation of the sap of the small grains, viz. :—

“The phosphorus content of the sap showed a general tendency to increase with the age of the crop. The potassium content.....to be lower in the later samplings.”

Verret (44), reviewing the Hawaiian experiments, failed to find any relation between phosphoric acid fertilization and juice quality, nor has Lee (16 and 17) in his carefully conducted experiments in the Philippines. The same results apply to the Puerto Rican investigations of Fernandez Garcia (9) and to those of Saint (39) in Barbados, while Connor and Abbott (5) show that crop quality is improved by the addition of that fertilizer constituent — *no matter what* — which is *deficient*.

The conclusion seems inevitable, then, that we may expect benefits in either yield or quality from application of phosphates to sugar cane soils only if the soil to which they are supplied is deficient in available  $P_2O_5$  and that where phosphoric acid is not deficient in the soil we are likely to waste money in applying it artificially. To quote Moir (29), a recognized authority in this field, we may expect “improved quality from increasing amounts of that element which is deficient either due to lack of supply or unavailability as controlled by other soil or fertilizing materials. At a point at which the overdose becomes an inhibiting or disturbing factor due to the new unbalanced conditions the improvement in quality ceases.”

Moir also records that the results of several experiments have shown the *toxic* effect of too large applications of phosphate—at Pioneer Mill, for instance, where 300 lbs. per acre and over showed lower yields than 200 lbs. in various trials—and concludes “that cane is not far different from other crops in quality improvement with proper food balance.”

### SOME EARLIER SUBTROPICAL INVESTIGATIONS

The present writer, during a great many years of studies along this line in subtropical countries, has been frequently confronted with consistent indications of just such toxic or depressive effects of relatively heavy applications of superphosphate to cane soils of a sedimentary type similar to those of Upper Egypt, which generally contain sufficient available phosphoric acid for the production of normal crops. On residual soils, stony slopes, etc., low  $P_2O_5$  may

frequently be the limiting plant food factor in cane production, but the writer has seldom found this to be the case with the sedimentary ones, whether under rainfall or irrigation conditions and irrespective of such soils being slightly on the acid or alkaline side as regards pH reaction.

*Argentina.*—When the Tucuman Sugar Experiment Station was established a quarter of a century past, manurial experiments were amongst the first to be laid down, these being of the classical type with Nitrogen, Phosphates and Potash, alone, combinations of two of each element and finally of all three (mixed fertilizer). The basic quantity of nitrogen applied per hectare in each case was 55 kilogrammes and of the other two elements 50 kilogrammes, trials being made, also, with half, twice and thrice the basic application.

In Table I will be found the Nitrogen Only and Nitrogen + Phosphoric Acid results averaged for four years from three identical series of experiments with native striped and purple cane (our *Budadi*) — a total of twelve distinct crops covering a wide range of climatic variation (32). The source of the nitrogen was the old organic standard of dried blood and of the  $P_2O_5$  was calcium superphosphate.

TABLE I.—AVERAGE RESULTS OF TWELVE ARGENTINE CROPS.

Manure	Metric Tons per Hect.	Average Weight per Stalk, Grams.	Chemical Analyses of Juices				Kgs. Sugar per Hect.*
			Brix.	Sucrose	Purity	Recovery Sugar*	
N ....	29.117	640	16.1	15.4	83.3	10.3	2,260
N.P....	25.009	560	13.5	13.0	82.2	10.6	1,870

While these differences, uniformly in favour of Nitrogen alone, are not statistically significant, due to the large experimental error in some of the third and fourth-year plots, the consistent trend obviously indicated no benefit in either cane or sugar yield, average size of individual stalks or juice quality derived from applications of phosphoric acid in combination with nitrogen under the conditions of these experiments.

\* A factor, commonly employed in Tucuman, obtained by multiplying % of Sucrose by Purity.

† Assuming an extraction of 70 per cent juice on cane weight.

*Louisiana.*—When the writer, after an absence of sixteen years, returned to Louisiana in 1926 as Consulting Technologist of the American Sugar Cane League, he found the same cane manuring program that was in vogue during his earlier work there, except for the fact that synthetic materials had largely replaced the organic ones so generally employed in the days of the venerated Dr. Wm. Carter Stubbs (41). In addition to the normal nitrogen application, it was still the custom to supply 30 to 40 lbs.  $P_2 O_5$  per acre to all cane. Meanwhile, however, two fundamental changes had taken place on the cane plantations, both of which should have vitally and favourably affected the soil plant food balance. These were:—

(1) The heavy-yielding, dependable and deep-rooted *Biloxi* soybeans had largely replaced the more delicate and less "foolproof" cowpeas formerly so widely employed as a green manure crop, and

(2) The almost complete failure of the La. Striped and Purple (*Baladi*) and *D74* canes, due to the ravages of mosaic disease, and the evident necessity of replacing them with more vigorous disease-resistant varieties such as the thinner types of *P.O.J.* canes.

It appeared to the writer from the outset that the change in rotation crop should signify not only a larger store of easily available organic nitrogen under the plant cane, but much more effective pumping up of phosphoric acid from the lower soil levels as a result of the greater volume as well as length of soybean roots as compared with those of cowpeas in general.

With the strongly developed root systems of the *P.O.J.* varieties, it also appeared quite logical that they would be able to make much more efficient use of the plant food in the soil than could the *Baladi* canes, which, at the height of the mosaic epidemic, had almost ceased root production. Co-operative experiments on a large, but simple, scale, scattered widely over the State, were accordingly arranged and in 1928 the writer (34) published the complete records of tests of the application of varying quantities of nitrogenous and phosphoric manures to first-year *P.O.J.* cane on six distinct plantations, the results being *commercially* negative in every case. It was felt that a logical explanation of this lack of response was furnished by the already-mentioned fact that cane is practically always planted in Louisiana on land into which a good crop of soybeans has been recently turned.

Beginning, therefore, with the 1928 season, all of our co-operative experiments were conducted exclusively on second- and third-year cane, and, inasmuch as cane is now seldom carried beyond the second year in Egypt, those which are now discussed were on second-year cane only and on types of sedimentary soils similar to those producing cane in Upper Egypt.

Contrary to the results obtained from the plant (first-year) cane tests, there was in the ratoon experiments in 1928, 1929 and 1930 (34) a decided and most uniform response to from 30 to 40 lbs. per acre of nitrogen from all nitrogenous manures, while additions of phosphoric acid showed no apparent beneficial effect on either tonnage or quality, as may be seen from the summarized results of three years' trials of two source materials found in Table II. In both series 200 lbs. per acre of each source material were employed and in all cases the product of each plot was separately ground and analyzed in a commercial sugar factory, so that, as in the case of our Egyptian experiments, there was no question of obtaining that highly hypothetical desideratum of a "representative sample."

TABLE II.—AVERAGE ANNUAL RESULTS FOR THREE YEARS IN LOUISIANA

Treatment	Tons Cane per Acre		Juice Analyses			Lbs. Available Sugar per Acre*	
	Yield	Gain over Check	Brix	Sucrose	Purity	Yield	Gain over Check

A.—13 Experiments with Nitrate of Soda.

Controls ...	14.32	—	15.80	13.24	83.80	2729	—
N ...	20.84	6.47	16.03	13.11	81.78	3915	1186
NP ...	19.96	5.59	16.16	13.24	81.93	3733	1004

B.—14 Experiments with Cyanamid.

Controls ...	16.76	—	16.35	13.31	81.59	3160	—
N ...	23.86	7.10	16.03	13.06	81.29	4536	1376
N.P. ....	24.33	7.57	16.12	12.99	80.58	4425	1265

In discussing these results the writer (35) concluded:—

"There is no significant improvement in either tonnage or sucrose content from adding phosphoric acid to our nitrogen application. After four years of investigation the evidence is now undoubtedly sufficiently strong to justify our advising quite definitely against

\* Calculated by employing "Java (Winter-Crop) Formula," assuming 75 % Extraction and 100 % Boiler House Efficiency.

the former general practice ... of applying about 200 lbs. of superphosphate per acre ... except only on certain outlying soil types ... Not only has phosphoric acid shown no increase in general — certainly no *commercial* increase — but in no case has there been obtained any evidence that it has had any of the theoretical effect of hastening maturity and, hence, increasing the sugar content.\*

That these conclusions have been widely adopted in Louisiana is indicated by the following extract from the program of South Louisiana sugar producers :\*

"The first river bottoms with the exception of those places where tests have indicated the desirability of using phosphate should confine their fertilizer to nitrogen alone."

More recently experiments conducted jointly for the U.S. Bureau of Chemistry and the La. Experiment Station by O'Neal, Hurst and Breaux (30) have shown consistently satisfactory returns from the application to the so-called "sandy lands" of Louisiana (Yazoo Very Fine Sandy and Silt Loams) of about one-half the amount of superphosphate formerly applied. It must be remembered, however, that the discontinuance of the use of phosphates on these lands over a number of years had probably permitted of a decided reduction in the reserves built up by a generation of excessive applications of superphosphate.

#### INVESTIGATIONS IN EGYPT

In the autumn of 1932, with the hearty cooperation of Director General René Bey Cattani and Mr. S. Zagdoun of the Wadi Kom-Ombo Co., a series of four identical experiments was designed with the object of determining, in as simple and demonstrative a manner as possible, the effect on both cane yield and quality of the addition of two 100-kilogram sacks of 16½ per cent calcium superphosphate to the normal nitrogen ration employed on as many distinct *nizarehs* embracing soil types ranging from the best to the poorest on this extensive property. Each experiment consisted of twelve 4-kirot (¼th acre) plots, every one with the normal nitrogen application of 2½ sacks of 26 per cent nitrosulphate of ammonia (58½ kilograms nitrogen per feddan) for the first year cane and 4½ sacks (117 kilograms nitrogen) for 2nd-year and each alternate one receiving in addition 33 kilograms P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> per acre in the two bags of superphosphate applied in the furrows just before planting and just after the May plowing of the second-year cane. The 1/6th feddan plots were decided upon

as representing an area which would produce sufficient cane to be conveniently handled at a large modern sugar central without too seriously complicating and slowing down its operations, since, by simply leaving a small space on the conductors between the 5- to 11-ton product of each plot, every replication could be handled at the factory as a separate unit. In this connection the writer wishes to express his sincere appreciation to Director Favre of the Kom-Ombo factory and Waqil S. Mizerahi of the Kom-Ombo Co. for their excellent cooperation and efficient handling of the experimental cars in both factory and field.

It will be noted that in each experiment six 4-kirot plats received applications of phosphate and six did not, i.e. the total area of control and treated plots was in each case exactly one feddan, each test covering two acres, or a grand total of eight feddans in the four *nizarehs*.

*Soil Types, Preparation and Cultivation.*—The characteristic types of soil for the experiments on the distinct *nizarehs* were selected under the experienced guidance of M. Mizerahi. At *Sabah Gebli* and *Kom-Ombo Bahari* the soils chosen are very fertile and homogeneous silt loams, the former being decidedly superior in homogeneity. At *Raghama Shark* the soil is a fertile, homogeneous clay loam, while the *Abbassieh* experiments are located on an irregular (chemically and physically), over-compact clay soil of below average fertility for Kom-Ombo.

Preparation, cultivation and irrigation were identical in all cases to those described for the spacing experiments (36) on the respective *nizarehs* and the details need not be repeated here. Suffice it to say that the handling of these agronomic details at Kom-Ombo left nothing to the desired and assured the obtention of data worthy of every confidence.

*The Visual Effect of Phosphate on the Growing Cane.*—From the outset the plots at *Sabah Gebli*, where the best stand of cane was secured, presented a marked colour contrast, the cane on the phosphate plots being of a darker green colour and appearing to grow away faster than that on the alternate Nitrogen — only ones, until by May this experimental field looked like a 2-feddan checker board with alternating squares of dark and yellowish green, the latter being also an average of 6—8 inches lower than the phosphate plots. By the latter part of June — after the second nitrogenous manuring — the colour contrast became less striking and a month later all the cane appeared to be of a uniform dark green colour — after the final application of 100 kilograms nitrosulphate of ammonia per feddan. This seemed to indicate either a lower reserve or a more slowly available form of phosphoric acid in this soil type than on the others under trial—or that the first application of nitrogen should consist of a larger

\* La. Expt. Sta. Extn. Cir. 151, 1933. Sug. Bull., XIII, No. 16, pp. 4-7, 1935.

proportion of the total 58 kilograms per feddan supplied than the 13 kilograms which actually constituted the first "dose," since at Abbassieh, while there was at first a very slight colour difference, this quickly faded out and at the other two nizarchs no difference in colour or development could ever be noticed as between the NP and N plots. These observations should be carefully borne in mind when considering the detailed Crop Results in Tables III — VII inclusive.

*Harvesting Methods and Yields.*—When the experiments were harvested (on dates shown in the respective tables) the workmen were concentrated in one or two plots at a time, after the border cane had been cut out and each replication plainly demarcated, and the cane from each one loaded on to specified *Decauville* railway cars while successive plots were being harvested. No plot was ever left partially loaded over night, *i.e.* the cane from each replication was always loaded into numbered cars and shipped to the *usine* the night after harvesting. Special men were assigned by both companies to supervise the loading of the cane into the proper cars, dispatch the trains to and receive them at the factory and supervise the weighing, milling and analyses. These men and their principals are to be congratulated on their accuracy and efficiency in promptly handling a great bulk of these large "samples" without one single serious complication.

TABLE III.—SUPERPHOSPHATE EXPERIMENT AT KOM-OMBO BAHARI.

Plots (4 Kirates)	Kantars Cane Per Plot	Met. Tons Cane per Feddan	Richesse (Sucrose in Cane)	Purity	Kgms. Sugar per Feddan
-------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------	------------------------------

(1) FIRST-YEAR CANE HARVESTED 17th MARCH, 1931.

*A.—Nitrogen Only.*

1	...	...	...	...	196.22	—	12.39	77.8	—
3	...	...	...	...	222.71	—	12.91	80.0	—
5	...	...	...	...	237.33	—	12.50	80.2	—
7	...	...	...	...	193.55	—	12.71	79.8	—
9	...	...	...	...	213.91	—	13.28	83.5	—
11	...	...	...	...	223.38	—	12.70	81.4	—
Averages	...	...	...	...	1,287.10	57.82	12.75	80.4	—

*B.—Nitrogen and Superphosphate.*

2	...	...	...	...	227.47	—	12.15	78.8	—
4	...	...	...	...	209.38	—	13.61	82.0	—
6	...	...	...	...	207.60	—	12.52	78.6	—
8	...	...	...	...	214.44	—	13.54	83.1	—
10	...	...	...	...	206.44	—	13.18	82.4	—
12	...	...	...	...	204.77	—	12.84	81.3	—
Averages	...	...	...	...	1,270.10	57.06	12.97	81.0	—

II.—SECOND-YEAR CANE HARVESTED 27th FEBRUARY, 1935.

N.	...	...	...	...	1,135.68	51.02	12.88	83.0	—
N.P.	...	...	...	...	1,146.54	51.51	12.67	82.5	—

III.—AVERAGES FOR THE TWO YEARS

N.	...	...	...	...	1,211.39	54.42	12.82	81.7	5,583
N.P.	...	...	...	...	1,208.32	54.24	12.82	81.7	5,565

TABLE IV.—SUPERPHOSPHATE EXPERIMENT AT ABBASSIEH.

Plots (4 Kirsats)	Kantars Cane per Plot	Met. Tons Cane per Feddan	Richesse (Sucrose in Cane)	Purity	Kgms. Sugar per Feddan
<b>I.—FIRST-YEAR CANE HARVESTED 30th MARCH, 1934.</b>					
<i>A.—Nitrogen Only.</i>					
1... ..	109.91*	—	15.03	86.0	
3... ..	181.16	—	14.81	87.1	
5... ..	150.75	—	14.06	85.1	
7... ..	223.56	—	12.94	81.8	
9... ..	225.02	—	14.51	86.3	
11... ..	225.56	—	13.85	84.6	
Averages ... ..	1207.26	54.24	14.20	85.1	
<i>B.—Nitrogen and Superphosphate</i>					
2 ... ..	149.38	—	14.18	85.5	
4 ... ..	219.42	—	14.95	86.8	
6 ... ..	205.96*	—	13.74	84.8	
8 ... ..	218.36	—	13.31	83.5	
10 ... ..	212.84	—	13.76	85.0	
12 ... ..	210.75	—	12.65	82.1	
Averages ... ..	1212.90	54.49	13.76	84.6	
<b>II.—SECOND-YEAR CANE HARVESTED 19th FEBRUARY, 1935</b>					
N. ... ..	1,040.67	46.75	11.87	80.5	
N.P. ... ..	1,099.39	49.39	11.53	79.7	
<b>III.—AVERAGES FOR THE TWO YEARS.</b>					
N. ... ..	1,123.97	50.49	13.04	82.8	5,267
N.P. ... ..	1,156.15	51.94	12.65	82.2	5,256

\* When these experiments were being prepared for harvest, M. Mizrahi noted that considerable cane had been robbed from the two exterior plots 1 and 6. While the cane harvested from these plots is given in the table, they are eliminated from the calculations of production per feddan, i.e. the average yields per acre are calculated from the five undisturbed plots in each case. The writer's thanks are due to M. Mizrahi for his careful observation of the experiments throughout their course.

TABLE V.—SUPERPHOSPHATE EXPERIMENT AT RAGHAMA SHARE

Plots (4 Kirsats)	Kantars Cane per Plot	Met. Tons Cane per Feddan	Richesse (Sucrose in Cane)	Purity	Kgs. Sugar per Feddan
<b>I.—FIRST-YEAR CANE HARVESTED 24th MARCH, 1934.</b>					
<i>A.—Nitrogen Only.</i>					
1 ... ..	192.09	—	13.74	83.3	
3 ... ..	180.04	—	14.04	84.3	
5 ... ..	181.56	—	13.62	83.2	
7 ... ..	205.64	—	14.08	84.0	
9 ... ..	159.78	—	14.63	84.6	
11 ... ..	151.82	—	13.65	83.2	
Averages ... ..	1,070.93	48.11	13.96	83.8	
<i>B.—Nitrogen and Superphosphate</i>					
2 ... ..	182.53	—	13.57	83.2	
4 ... ..	205.82	—	13.23	81.7	
6 ... ..	157.20	—	12.43	79.4	
8 ... ..	191.96	—	14.11	84.6	
10 ... ..	185.47	—	13.53	82.6	
12 ... ..	133.56	—	11.22	81.2	
Averages ... ..	1,056.54	47.46	13.51	82.6	
<b>II.—SECOND-YEAR CANE HARVESTED 27th MARCH, 1935</b>					
N. ... ..	1,086.87	48.83	13.72	83.2	
N.P. ... ..	1,091.40	49.03	13.91	83.2	
<b>III.—AVERAGES FOR THE TWO YEARS</b>					
N. ... ..	1,078.90	48.47	13.84	83.5	5,366
N.P. ... ..	1,073.97	48.24	13.71	82.9	5,252

TABLE VI.—SUPERPHOSPHATE EXPERIMENT AT SABAH GEBU

Plots (4 Kirs)	Kantars Cane per Plot	Met. Tons Cane per Feddan	Richesse (Sucrose in Cane)	Purity	Kgms. Sugar per Feddan
----------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------	------------------------------

I.—FIRST-YEAR CANE HARVESTED 3rd APRIL, 1934

A.—Nitrogen Only

2	235.87	—	14.14	85.0
4	239.16	—	13.11	82.4
6	237.73	—	14.13	84.6
8	242.40	—	12.91	82.4
10	224.22	—	13.98	83.5
12	211.73	—	11.98	80.0
Averages	1,421.11	63.84	13.38	83.0

B.—Nitrogen and Superphosphate

1	249.16	—	13.02	81.2
3	247.73	—	13.48	83.1
5	261.13	—	12.29	81.8
7	255.73	—	12.51	80.6
9	265.38	—	12.33	80.5
11	262.36	—	12.00	79.5
Averages	1,544.45	69.38	12.60	18.1

II.—SECOND-YEAR CANE HARVESTED 28th JANUARY, 1935\*

N.	1,164.54	52.32	10.96	77.1
N.P.	1,282.17	57.60	10.74	76.6

III.—AVERAGES FOR THE TWO YEARS

N.	1,292.83	58.08	12.17	80.1	5,581
N.P.	1,413.33	63.49	11.67	78.9	5,854

\*Kantars Cane Produced by Each Replicated Plot as 2nd-Year Cane

Plots	2 and 1	4 and 3	6 and 5	8 and 7	10 and 9	12 and 11	Per Fed.
Nit. Only	187.02	198.02	186.11	197.56	189.07	203.16	1,164.5
and Phos.	209.11	216.81	217.16	212.84	220.75	211.47	1,282.1
Incr. for Addition Phos.	22.09	12.22	28.05	15.28	31.68	8.31	117.6

*Negative Results at Three Nizarchs.*—The trends of the Kom Ombo Bahari, Abbassieh and Raghama Shark experiments are practically identical and should here be considered together. It will be noted that the Richesse and Purity of the cane have increased with the lateness of harvesting both as first and second-year cane. In 1934 the order of harvesting was Kom-Ombo Bahari, Raghama Shark and Abbassieh and the cane quality ratios are also in this order, while in 1935 the order was Abbassia, Kom-Ombo Bahari and Raghama Shark with the average quality of the cane improving with the respectively later harvesting dates. This again emphasizes our often repeated statement (36) that, as regards cane quality in a subtropical country, the length of the growing season would seem to be by far the most important factor. While tonnage is inevitably affected, also, by the length of the growing season, if this factor be kept constant, the amount of crop obtained will directly reflect soil, plant food and moisture conditions.

Examining first the detailed figures for first-year cane, it will be noticed that in no case are there any statistically significant differences between the results of the two types of treatment either in tonnage or quality of cane produced on any of these three nizarchs. At Kom-Ombo Bahari the phosphate plots have yielded a statistically insignificant amount of cane (17 kantars) per feddan less than the control plots, while the quality of the phosphate-treated cane is insignificantly superior to that of the controls. At Raghama Shark similar insignificant differences are all in favour of the controls, while at *Abbassieh*—where there was a slight and rather ephemeral colour reaction—the phosphate plots have produced five kantars more cane per feddan than the controls, but both in Richesse and Purity the cane from the non-phosphate plots is about  $\frac{1}{2}$  point the better. In other words, the results from these three first-year experiments are distinctly negative, showing no need of phosphate fertilization under the conditions prevailing therein.

The second-year results and the average annual results for the two years on these three nizarchs are very similar in trend, but with not a single case of the cane juice purity from the phosphate plots being superior to that of the cane from the controls. Consequently the average annual yield of sugar per feddan (over  $5\frac{1}{2}$  tons in each case) from the Nitrogen-only plots in all three experiments is consistently slightly superior to that of the treated plots, although this difference is in no case statistically significant, except that it indicates no need of adding phosphoric acid to these soils under the actual conditions prevailing. A concentrated summary of the average annual results from these three experiments is given in Table VII.

TABLE VII.—ANNUAL AVERAGES OF TWO CROPS IN THREE NEGATIVE EXITS.

Nizareh	Cane per Feddan		Richesse	Purity	Kgs. Sugar per Feddan
	Kantars	Met. Tons			
<i>A. - Nitrogen Only.</i>					
K.-O. Bahari	1,211.39	51.12	12.82	81.7	—
Abbassieh	1,123.97	50.49	13.01	82.8	—
Ragh. Shark	1,078.90	48.47	13.81	83.5	—
Averages	1,138.09	51.13	13.23	82.7	5,410

## B.—Nitrogen and Superphosphate.

K.-O. Bahari ... ..	1,208.32	54.24	12.82	81.7	—
Abbassieh ... ..	1,156.05	51.91	12.65	82.2	—
Ragh. Shark ... ..	1,073.97	48.24	13.71	82.9	—
Averages ... ..	1,116.15	51.47	13.06	82.3	5,379

Finally, then, we note that, while the control plots have given an average annual tonnage inferior to that of the phosphate plots by the statistically insignificant quantity of one-third of a ton of cane per feddan, the quality of the control cane is sufficiently — the insignificantly — superior to that of the treated cane to give the control plots a statistically insignificant superiority of 31 kilograms of sugar per feddan. Once again any ripening effect of added phosphoric acid has most decidedly failed to manifest itself.

These results are quite in accordance with those obtained over a long period and with several distinct cane varieties by M. R. Roche at Nag Hamadi, whose conclusions in a recent paper (31) may well be quoted here:—

"The cane is little or not affected by phosphate fertilizer alone, in spite of the small content of  $P_2O_5$  in the soil, and responds only slightly more to phosphate combined with nitrogen. But if we bear in mind that, without phosphate, Egypt has produced for centuries abundant harvests of wheat — which require much phosphorus — one cannot be surprised at the little effect produced by  $P_2O_5$ . It is to be logically supposed that this element, even though in moderate quantity, must be in a very assimilable form."

*The Positive Sabah Gebli Results.*—An analysis of Table VI, showing the detailed results from the experiment at Sabah Gebli—it will be remembered that this was the best soil type and that here the colour difference in the phosphate plots was most notable and lasting — shows a statistically significant and consistent trend towards higher tonnage in each individual plot receiving superphosphate. As both first — and second — year cane the highest yield of the individual control plots was significantly smaller than the lowest yield of any treated plot, while the treated plots produced an average cane tonnage superior by some  $5\frac{1}{2}$  tons per feddan to the splendid — and, in the case of the first-year cane, probably record-breaking — yields of the controls. While, in the three previously considered experiments, the phosphate plots did not in any case produce quite as much sugar per feddan as the controls, at Sabah Gebli we find these plots producing an average annual sugar yield superior by almost three bags per acre to the excellent return of the controls.

As regards the effect of the phosphate on the juices, even though the distinct colour differences in the experimental cane indicated some phosphorous deficiency (in quantity or degree of availability) in this soil, there was no evidence of the traditional ripening effect of phosphoric acid, whether the cane was harvested in good season, as in 1934, or very early, as reflected by the 1935 analyses. While the differences in Richesse and Purity are too small to be statistically significant, the cane from the control plots shows an average Richesse and Purity one-half point and 1.2 points, respectively, better than the product of the treated plots.

## CONCLUSIONS

There seems to be no doubt, therefore, that, while most of the cane soils of Upper Egypt do not give a commercial response to applications of phosphatic manures, the type represented in the Sabah Gebli experiment may be expected to yield a most satisfactory return on a small investment in such fertilizers. Unlike the procedure in determining the nitrogenous manuring program, where the planter should determine the *commercial optimum application* (37) of this uniformly necessary ingredient, spot manuring should probably be resorted to on these few soils which definitely respond to phosphoric acid. It is possible that the marked colour response noted in the Sabah Gebli experiments may be utilized in evolving a simple method of roughly determining whether or no such applications should prove profitable. This point, as well as the inter-relations of time and quantity of applications of nitrogen and the N —  $P_2O_5$  balance in the soil, are being further investigated at Mataana and Mallawi, as well as at Kom-Ombo.

# SUMMARY

There is little or no experimental evidence anywhere to substantiate the very widespread idea that the employment of abundant phosphatic manures will inevitably result in richer sugar cane irrespective of the  $P_2O_5$  content of the soil on which it grows, though many investigators in Hawaii, the Philippines, Puerto Rico, the West Indies, etc., have demonstrated satisfactory response to this element in soils where its deficiency constituted it the limiting factor in the plant food balance.

The present writer, during a great many years of studies along this line in subtropical countries, has seldom obtained a commercial response from applications of phosphates to cane soils of a sedimentary type similar to those of Upper Egypt, long series of experiments in Argentina and Louisiana having given uniformly negative results.

Four identical replicated experiments were laid out in 1933 on as many nizarehs and soil types of the large Kom-Ombo estates, each experiment being two feddans in area, one of which received two sacks of  $16\frac{1}{2}$  per cent calcium superphosphate in addition to its normal supply of nitrogenous manure. Soil types, representing a rather complete range from the poorest to the most fertile of the region, were selected at Kom-Ombo Bahari, Abbassieh, Raghama Shark and Sabah Gebli.

From the outset the Sabah Gebli phosphate plots presented darker coloured and faster growing cane than the controls, until by May the field had a checker-board appearance. The colour difference was distinctly noticeable until the end of July. At Abbassia there was a very slight colour reaction which quickly faded out, while at the other two nizarehs no colour differences could be observed.

The results from all but the Sabah Gebli experiment, where the distinct colour reaction was so noticeable, were uniformly negative, while at the latter nizareh the phosphate plots as both first-year (when they produced the record average yield of 1,550 qantars of cane per feddan) and second-year cane, showed a consistent and highly significant increase over the controls of more than 120 qantars per feddan.

In none of the experiments was any indication of the supposed ripening effect of phosphoric acid shown by the juice analyses — in fact the trend, though not statistically significant, was rather toward a slight depression of the sucrose content.

The conclusion is reached that, while most of the Upper Egyptian cane soils show no need of applications of phosphoric acid, the type represented in the Sabah Gebli experiment may be expected to yield

a most satisfactory return on a small investment in such manures. It appears that "spot" fertilizing may be useful with phosphatic fertilizers and it is possible that the marked colour reaction noted in the Sabah Gebli trials may be utilized in evolving a simple field test for roughly determining whether or no such applications should prove profitable. This latter point, as well as the interrelations of time and quantity of nitrogenous applications and the  $N - P_2O_5$  balance in the soil, are being further investigated at Mataana and Mallawi, as well as Kom-Ombo.



# BIBLIOGRAPHY

- (1) AGEE, H. P.—Fertilization for Soil Amendment and Maintenance. Repts. H.S.P.A. Anl. Mtg., L. Hulu., 1931.
- (2) BOOBERG, G.—Gooit de suikerindustrie geld weg bij de toepassing van kunstbemeesting. Arch.v.d. Skind. Ned.—Ind., 1933, No. 15, pp. 501-12.
- (3) BROWNE AND BLOUIN.—Chemistry of Sugar Cane and its Products. La. Agr. Expt. Sta. Bull. 91, 1908.
- (4) BOWLES, SIDNEY J.—Fertilizer Recommendations for Sugar Cane. Sug. Bull., XI, No. 13, pp.5-6, 1933.
- (5) CONNOR AND ABBOT.—Unproductive Black Soils. Ind. Agr. Expt. Sta. Bull. 157, 1912.
- (6) DEER, NOEL.—Cane Sugar. Ludn., 1921.
- (7) DODDS, H. H.—The Manuring of Sugar Cane. Empire Jn. Exptl. Agr., I, 4, 1933. Notes on Some Fertilizer Experiments Harvested in 1934. Proc. Anl. Cong. Sou. Af. Sug. Technols. Assn., IX, Durban, 1935.
- (8) EARLE, F. S.—Sugar Cane and its Culture. N.Y., 1928.
- (9) FERNANDEZ GARCIA, R.—Informes Anuales de la Seccion de Química. Estn. Exptl. Ins. de P. Rico, Informes Anles, 1924-5 and 1927-8.
- (10) FISKE AND SUBBUROW.—Colorimetric Determination of Phosphorus. Jo. Biol. Chem., LXVI, 1925.
- (11) FRAPS, G. S.—Availability of Phosphoric Acid of Soil. Jour. Amer. Chem. Soc., XXVIII.
- (12) GRACIE, KHALIL AND ENAN.—An Analysis of the Factors Governing the Response to Manuring of Cotton in Egypt. Min. Agr., Tech. Bull. 152, Cairo, 1935.
- (13) HEDLEY AND BEATER.—Absorption of Plant-Foods by Sugar Cane. Proc. Anl. Cong. Sou. Af. Sug. Technols. Assn., VII, 1933.
- (14) KERR, H. W.—Farm Fertility Trials. Qnsld. Bur. Sug. Expt. Stas., Farm Bulls. 1 and 3, 1931 and 1932.

- (15) KLINGE, GERARDO.—Politica de Irrigacion. La Vida Agricola, XII, 1935.
- (16) LEE, H. ATHERTON.—Annual Reports of Director of Resch. Proc. Anl. Conv. Philipp. Sug. Assn., 1928-30.
- (17) DO. —Fertilizer Constituent Tests. Sug. News, X, pp. 1-4, 1929.
- (18) LOPEZ DOMINGUEZ, F. A.—Sugar Cane Soil and Fertilizer Research in Peru. Proc. Cong. Int. Soc. S. Cane Technols., IV, Bul. 78. S. J., 1932.
- (19) MAZÉ, P.—Influence, sur le Développement de la Plante, des Substances Minérales Résidus d'Assimilation. Compte Rendu, CXXVIII, 1899.
- (20) MARTIN, J. P.—Sugar Cane Growth in Nutrient Solutions. Haw. Pltrs. Rec., XXXIX, No. 2, pp. 79-96, 1935.
- (21) McALLEP AND BOMONTI.—Haw. Pltrs. Rec., XXVI, 136, 1922.
- (22) McCOLL AND WELDON.—Effect of Sodium Nitrate on Composition of Expressed Sap. Jour. Amer. Soc. Agron., XXII, 1930.
- (23) McGEORGE, W. T.—Absorption of Fertilizer Salts by Haw. Soils. Haw. Expt. Sta. Bull. 35.
- (24) DO. —Study of Phosphates in Sugar Soils. H.S.P.A. Expt. Sta. Bul. 47, 1923.
- (25) DO. —Influence of Silica, Lime and Soil Reaction on Availability of Phosphates. Soil Sci., XVII, 1924.
- (26) McNAUGHTON, E. J.—Conocimiento Científico de la Nutrición de Vegetales. La Henda., XXX, pp. 365-8, 1935.
- (27) MITSCHERLICH, E. A.—Physical Properties of Soils and Crop Yields (Trans. Tit.). Publ. Inst. Belge Amélior. Betterave, III, No. 3, pp. 93-102, 1935.
- (28) MOIR, W. W. G.—The Plant Food Problem. Proc. 9th Anl. Mtg. Assn. Haw. Sug. Technols. Hnlu. 1930.
- (29) DO. —Hawaiian Soils and Fertilizer Research. Cong. Intl. Soc. S. Cane Technols., IV, Bul. 94. S. Juan, 1932.
- (30) O'NEAL, HURST AND BREAUX.—Fertilizer Requirements of Sugar Cane on "Sandy Land". Sug. Bull. XII, No. 11, pp. 3-5. N. Orlns., 1st. Mch., 1935.

(31) ROCHE, R.—Report on Soil Work from Egypt. Cong. Intl. Soc. S. Cane Technols., IV, Bull. 109, 1932.

(32) ROSENFELD, ARTHUR H.—Ensayos con Abonos. Rev. Indstl. y Agr. Tucuman, II, 1911, and V, 1915.

(33) *do.* —La Estacion Experimental de la Sociedad Nacional Agraria de Peru. Lima, 1926. *Ibid* de Java. Bol. Un. Panamericana, No. 68. Wshgtn., 1930.

(34) *do.* —Results of Some Co-operative Fertilization Tests. Sug. Bull. VI, 15, 1928; VII, 9, 1929; VIII, 11 and 16, 1930; IX, 9 and 18, 1931. Fertilizer Experiments in Louisiana. Intl. Soc. Sug. Cane Technols., IV, Bull. 95. Sn. Juan, 1932.

(35) *do.* —Wasteful Sugar Cane Fertilization. Intl. Sug. Jour., XXXV, 1933.

(36) ROSENFELD, ARTHUR H.—Optimum Sugar Cane Planting Date in Egypt. Min. Agr. Tech. Bull. 156, 1935. The Spacing of Sugar Cane in Egypt — and Elsewhere. *Ibid*, 164, 1936.

(37) *do.* —The Manurial Requirements of Sugar Cane in Egypt. *Ibid*, 173, 1936.

(38) RUSSELL, E. J.—Plant Nutrition and Crop Production. Univ. Cal. Press, 1926.

(39) SAINT, S. J.—Reports of Agr. Chemist. Repts. Dept. Sci. and Agr. Barbados, 1928-31. Manurial Experiments on Sugar Cane, 1928-1932. Agric. J. Barbados, Oct., 1932.

(40) SPENCER, G. L.—Handbook for Cane-Sugar Manufacturers. N.Y., 1917 *et seq.*

(41) STUBBS, W. C.—Cultivation of Sugar Cane. N. Orlns., 1900.

(42) TURNER, P. E.—Manurial Experiments with Sugar Cane. Trop. Agr., IX, p. 177, 1932, and X, p. 60, 1933.

(43) VANSTONE, E.—Available Phosphate in Soils. Jour. Agr. Sci., XV, 1925.

(44) VERRET, J. A.—Effect of Phosphoric Acid and Potash on Quality of Cane. Haw. Pltrs. Rec., XXVII, 1923.

(45) WILLIAMS AND FOLLETT-SMITH.—Field Experiments with Sugar Cane. Br. Guiana Dept. Agr. Bull. 1, 1933.

# List of Technical Staff of the Plant Breeding Section

DR. LAWRENCE BALLS.

DR. J. TEMPLETON.

DR. ARTHUR H. ROSENFELD.

DR. J. PHILP.

MR. BROWN.

ARMINAC BEDIVIAN EFF.

MOHAMED MOHAMED EL DEEB EFF.

MAHMOUD FAYEK EFF.

MOHAMED ABDALLAH ZAGHLOUL EFF.

HUSSEIN SABET EFF.

MOHAMED SAID ABOU EL ATA EFF.

MOHAMED ABDEL AZIZ EL KOICHEIRI EFF.

ABD EL HAMID GALAL MIHREZ EFF.

MAHMOUD GAWHAR EFF.

DR. MOHAMED ALY EL-KILANI EFF.

ABD EL HAMID SWELEIM EFF.

AHMED MOUNIR EFF.

ABD EL GHAFFAR SELIM EFF.

ALBERT WENSTEIN EFF.

YOUSSEF SHABETAI EFF.

MOHAMED BADR EL DIN EFF.

MOHAMED AFIFI HUSSEIN EFF.

RIAD NEGUIB EFF.

AHMED YOUSSEF EFF.

MOHAMED MAHMOUD SALEH EFF.

MAHMOUD FAHMY EL-KATED EFF.

MAHMOUD ABD EL BAKI EFF.

AHMED ZAKI ABOU EL-NAGA EFF.

FAWZI SAWIRIS BASTA EFF.

SELIM NAZIF EFF.



Manure requirements can be established only by field experiments.

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT

---

Technical and Scientific Service

Botanical Section

---

BULLETIN No. 195

---

## SUGAR CANE PLANTING EXPERIMENTS

1933-1937

BY

ARTHUR H. ROSENFELD,

*Government Sugar Cane Technologist*

(Recommended for publication by the Publications Committee  
of the Ministry of Agriculture, which is not, as a body,  
responsible for the opinions expressed in this Bulletin)

Government Press, Cairo, 1939

Government Publications are on sale at the "Sale  
Room," Ministry of Finance. Correspondence  
relating to these publications should be addressed  
to the "Publications Office," Government Press,  
Bulldg. Cairo.

Price - - - - - P. T. 7.

# Contents

	Page
Introduction	1
CHAPTER I.—The Optimum Sugar Cane Planting Date in Egypt	
New Experiments	4
Mallawi	4
Mataana	7
Conclusions	10
CHAPTER II.—Sugar Cane Spacing Experiments	
General Experimental Procedure	13
The original Mataana and Mallawi Experiments	13
Mataana	14
Mallawi	14
Incidental Observations on Late Irrigation Applications	14
The Kom Ombo Experiments	17
Further Experiments at Mallawi	19
Conclusions	22
CHAPTER III.—Cane Tops as Planting Material	
Experiments in Argentina	25
Trials in Egypt	26
Conclusions	29

## Sugar Cane Planting Experiments, 1933-1937

### INTRODUCTION

The three planting factors considered in the present Bulletin—time of sowing, optimum spacing and type of seed material—are fundamental to a successful economic outcome from the cultivation of all annual crops under any environment. With sugar cane, the value of which depends not only on the tonnage produced but also in large manner on the quantity of sucrose therein contained, which is in turn vitally influenced—particularly in the subtropics—by the length of the growing season and the environmental conditions tending to rapid ripening in a necessarily early crop season, these considerations assume unique importance.

Indeed, in all subtropical countries, the production of satisfactory tonnages of cane of good sugar content is a race against time, for sugar cane is a plant which normally requires far more time for proper development and maturity than is available where growth is inhibited or the cane destroyed by low temperatures. Provided, however, that the cane has had a growing season of sufficient length for reasonably good physical development, these same falling temperatures in the autumn and early winter, if combined with decreasing supplies of moisture and available nitrogen, should induce an early ripening and, as demonstrated by the results of the experiments discussed in the following pages, enable the Egyptian planter to produce crops of a quantity and quality comparing very favourably with those of tropical cane-growing regions.\* Since, however, our growing season is, as pointed out above, rigorously limited by Nature and under-developed cane cannot, as in the Tropics, be left to add tonnage and sucrose through another season, it is evident that everything that can be done to utilize this curtailed growing season to the fullest extent will materially enhance the probabilities of eventual success at harvest time. Obviously, since we cannot prolong the developmental period when Nature limits growth at the end of the season, we must plant our cane early enough to permit it to take advantage of the very earliest "growing" weather in the spring.

\* ROSENFIELD, ARTHUR, H. ... Egypt as a Sugar Producer. Address before the South African Association for the Advancement of Science, Durban, May, 1937.

As to spacing, it is evident that for each type of plant, soil and climate there must necessarily exist a theoretical maximum of agricultural yield obtainable. In other words, each soil type in any climate should be capable, under ideal conditions, of producing an optimum crop of, let us say well developed sugar cane for example, and this maximum can be obtained only under optimum conditions of climate, moisture, food supply and cultivation. Likewise, this optimum crop can be obtained only by means of such an ideal spacing of the plants as will allow each stool to attain its optimum development and each unit of area to produce the largest possible number of well developed canes. Hence, it is logical that too small a space between our cane rows may result in too large a number of subnormally developed canes, while excessively wide spacing may produce splendid individual specimens, whose reduced numbers will not only fail to yield the tonnage obtainable from the theoretically ideal quantity of plants of normal development, but will vastly stimulate the continuous production of suckers (bull shoots), with the consequent difficulty of harvesting canes of any reasonable average age or sugar content. The present writer\* has frequently emphasized the fact that in subtropical regions the harvesting of a large proportion of late *mamones*, however well developed they may be physically, can be just as disastrous in its effect on average sucrose and purity of the cane as unseasonably late planting of the fields.

The Egyptian planter long ago arrived empirically at the optimum spacing of his cotton fields as later determined by Drs. Lawrence Balls† and J. Templeton‡ and our investigations indicate that he has just as unerringly established the proper spacing for sugar cane.

Since in most tropical countries the upper portion of the cane stalk is largely employed for seed, we have conducted at Kom Ombo an experiment in which only the extreme tops, usually discarded at harvest, were employed as planting material, as in some similar trials conducted years ago in Argentina§. Although the experiment was largely of a demonstrational nature and only the extreme tops were employed, the results are sufficiently suggestive to warrant the initiation of new trials in which the upper third of the stalks, instead of only the tender tops, will be compared as planting material with the entire stalks usually employed in Egypt.

## CHAPTER I

### The Optimum Sugar Cane Planting Date in Egypt

In a bulletin under this title published in 1935 it was stated that in all subtropical countries the production of high tonnages of good-quality cane is a race against time, since the growing season is rigorously limited by Nature and underdeveloped cane cannot, as in the Tropics, be left to add tonnage and sugar content during another season\*. Experiments carried out in 1933-1934 at Mataana and Mallawi, wherein cane was planted in successive months, from January to May inclusive, indicated that the period from mid-February to mid-March is the optimum one for cane planting in Egypt, and pointed to the categorical conclusion that the planter who waits until the middle of May (after taking off his *shitri* crops) to sow his cane will crop several hundred qantars of cane per feddan less than he can obtain, by arranging his rotations in such a manner as to plant during the established optimum period.

If the differences in yields obtained in the first-year cane were mainly due to the time of plantation and, hence, varied directly with the length of the growing season†, then the second-year crops, with identical growing periods, should show no such marked variation in production. Such proved to be the case when the second-year crop from the Mataana experiments was harvested on February 21, and that of Mallawi on March 6 and 7, 1935. In neither experiment did replications reveal any statistically significant differences in either yield or quality of cane, although in both experiments there was a consistent trend towards a slightly lower field return from the plots planted later in the season two years before, indicating a more firmly established stand of cane from the earlier plantings. The condensed figures for the two crops at Mallawi in Table I clearly show these trends.

\* ROSENFIELD, ARTHUR, H.—Ministry of Agriculture, Tech. and Sci. Serv., Bull. 196.

† L. D. Cleare in discussing the effect of late tillering on cane population in British Guiana (Agr. Jour, VIII, p. 89, June, 1937), concludes that "it is evident that the effect must be that at the time of reaping although a field may be considered mature, there is a considerable proportion of stalks which are immature, the practical outcome of which is poorer juice and lower yields".

\* How Old is Ten-Months-Old Cane? Facts about Sugar, XX, 1935.

† Analysis of Agricultural Yield, Phil. Trans., B, Vols. 206, 1915-1916, and 208, 1918.

‡ Watering and Spacing Expts. with Egyptian Cotton, Min. Agr. Tech. Bull. 112, 1932.

§ ROSENFIELD, ARTHUR, H.—Tops vs. Whole Canes for Planting, Sugar, N.Y., Jan., 1918.

TABLE I—THE FIRST MALLAWI MONTHLY PLANTING EXPERIMENT

Planted on 15th of	First-Year Cane—1934(?) Qantars per Feddan		Second-Year Cane—1935(?) Qantars per Feddan	
	Total	Less than Feb.	Total	Less than Feb.
February ... ..	1,064	—	960	—
March ... ..	1,004	60	954	6
April ... ..	910	154	919	41
May ... ..	658	406	900	60
AVERAGE ... ..	909	155	933	27

(<sup>1</sup>) Harvested March 11 to 13.

(<sup>2</sup>) Harvested March 6 and 7.

Little comment on these figures is necessary. While in the first year results each decrease in yield as the plantings were made later was highly significant (see detailed figures in Bull. 156) and became increasingly so with each month's delay in sowing in the second-year cane, even though there is the slight trend above mentioned, in no case are the yield difference statistically significant. It should be mentioned in this connection that in the second-year cane the variations amongst the individual replications of each series were wider than in the first-year crop, hence the experimental error and degree of significance were correspondingly raised. However, it will be observed that the largest decrease in yield from the second-year cane is identical with the smallest decrease in the first-year cane.

#### NEW EXPERIMENTS

While the results from the original experiments were very conclusive indeed, it is recognized that they applied strictly to the soil types employed and to the climatic conditions prevailing during the particular period they were under way. Hence, it was decided to duplicate both series on distinct soil types, laying out new trials at Mallawi and Mataana in alternate years.

The Mallawi experiments were located on a fairly light loam of apparently quite uniform texture, which had not been planted to cane for several years. It was well plowed and cross-plowed with a tractor on January 13 and 25, 1935, respectively and levelled on the first of February. The *hods* were divided on Feb. 9

and the land ridged and laid out into sixteen plots, according to the accompanying plan, on subsequent days, all receiving an application of calcium superphosphate (16 %  $P_2O_5$ ) at the rate of 200 kg. per feddan. Wet planting with *P.O.J. 105* seed was carried out in four plots on the 15th of each month from February to May inclusive.

All plots received three dressings as conditions warranted, the February and March plots receiving the final one at the end of May and the later planted ones only on July 10. In addition to the planting waterings, the February and March plots were irrigated 19 times, the April planting 17 and the May ones but 14 times. The final watering was given on February 18, 1936—only 3  $\frac{1}{2}$  weeks before harvesting began on March 14. All plots received nitrate of lime (15  $\frac{1}{2}$  % nitrogen) at the rate of 300 kg. per feddan in three doses, the final one for the May planting necessarily being given very late in the season.

The differences in height and development between the February and March plots were apparent into May, while on July 22, the April plantings were still evidently behind the earlier plantings and the May plots most notably so. At the end of the growing season not a great difference in stand and height could be noted between the plots of the first three months' planting but the May sowings were distinctly inferior to the others in population and vigour right up to crop time, the middle of March.

Harvesting and milling procedure at both Mallawi and Mataana were exactly as described for the earlier experiments, and our sincere appreciation is again expressed to the gentlemen mentioned in Bulletin 156 for their intelligent and painstaking co-operation which enabled us to carry out every detail of control as planned. The results of the second experiments at Mallawi are detailed in Table II, along with average figures for the first-year crops in two trials. Analytical data are omitted for the sake of clarity of presentation, since these showed absolutely no statistically significant differences in cane quality due undoubtedly to the long ripening season and exceptionally open winter of 1935-1936.



TABLE II.—SECOND MONTHLY PLANTING EXPERIMENT AT MALLAWI HARVESTED MARCH, 14 AND 15, 1936

Planted 15th of	Plots (1/6th Feddan)	Kg. Cane per Plot	Qantars per Feddan		% Increase over May	Averages for 1931 and 1936 Experiments		% Increase over May
			Total	Less than Feb.		Average	Less than Feb.	
February	A-1	8,020	—	—	—	—	—	—
"	A-7	8,380	—	—	—	—	—	—
"	A-10	9,230	—	—	—	—	—	—
"	A-16	9,010	—	—	—	—	—	—
"	February Average	8,660	1,144	—	27	1,104	—	42
March	B-2	7,410	—	—	—	—	—	—
"	B-8	8,210	—	—	—	—	—	—
"	B-11	8,460	—	—	—	—	—	—
"	B-13	7,856	—	—	—	—	—	—
"	March Average	7,984	1,055	89	17	1,030	74	32
April	C-3	7,320	—	—	—	—	—	—
"	C-5	7,970	—	—	—	—	—	—
"	C-12	8,180	—	—	—	—	—	—
"	C-14	8,060	—	—	—	—	—	—
"	April Average	7,885	1,042	102	16	976	128	25
May	D-4	5,870	—	—	—	—	—	—
"	D-6	7,520	—	—	—	—	—	—
"	D-9	6,680	—	—	—	—	—	—
"	D-15	7,170	—	—	—	—	—	—
"	May Average	6,813	900	244	—	779	325	—

While uniformly higher yields were given by all plots in the 1936 crop, the trend of the results to lower yields with shortened growing season was remarkably similar to that shown by the 1934 figures, as illustrated by the curves on the accompanying graph. Again the absolute necessity for optimum results of terminating planting operations not later than the middle of March is strikingly emphasized by these figures. The yield of 900 qantars per feddan from the plots planted in May is exceptionally good for Minya Province, but the February plots have produced 27 % more cane and the March ones 17 % more, again indicating that if planting is more generally carried out at the optimum time in this northerly cane region, the tonnage obtained should compare very favourably with those of the better situated zones to the south. The increase in yield of the February plots over those planted in May averages about 42 % for the first-year crops.

The *Mataana* experiments of 1936-1937 were located in the *Kharaga* section on about the poorest soil type of the Ministry of Agriculture Farm\* a weak, irregular (chemically and physically), over-compact clay, which was in marked contrast to the fertile fairly light loam of quite uniform texture on which the first series of experiments were made at Mataana. Cane had not been planted in this field for many years. The preceding crop was *ful* (beans).

In laying down the experiments on this very poor type of soil, it was with the full realization that its extreme irregularity would probably make the experimental error assume such a large proportion as to render the results incapable of proper statistical analysis, since, as Gracie, Khalil and Enan have aptly pointed out in their "Analysis of Factors Governing Response to Cotton Manuring in Egypt"†, the outstanding feature of trials on such soils is frequently "that the variation due to error is so large that the treatment effect is not statistically significant and there is in fact no point in doing the experiments". Inasmuch, however, as these experiments are to a large extent demonstrational and some scepticism at the striking results from the first series had been evinced by neighbouring planters on account of the fact that they had been carried out on soils considerably better in quality than the average of the district, it was decided to select a type decidedly poorer than the regional average for the 1936-1937 experiments and then make the 1937-1938 series on an intermediate soil type (which is now being done at Mataana).

\* The thanks of the writer are due to Moustafish Ali Foad, in charge of the Mataana Farm, for his untiring co-operation in all phases of the experimental work.

† Egyptian Min. Agr. Tech. Bull. 152, 1935.

Preparation, lay-out and planting of the plots were practically identical to the corresponding operations above described for the Mallawi 1935-1936 experiments, except for the fact that dry planting was practised at Mataana, with the *bongha*\* (irrigation just after planting) usually following the next day. As at Mallawi, too, all plots received three tassings (hoeings) as conditions warranted, the February and March plantings receiving the final one on June 21, 1936, the April sowings on first July and the last-planted plots not until the end of the month. The February plantings were irrigated 23 times, each successive planting receiving one watering less. The final watering was given on January 15, 1937, almost seven weeks before harvesting of the experiment on March 3, 1937. All plots received nitrosulphate of ammonia (26 % nitrogen) at the rate of 300 kg. per feddan in three equal doses, the final application to the February and March plantings being made on the satisfactorily early date of June 22 and that to the April sowings on July 3, while it was again the end of that month before the last manure could be given to the May plots.

Despite considerable irregularity in development due to the aforementioned soil variability, in general a height difference between the plots planted in February and March could be noted into May, while in the middle of July it was apparent that, on the whole, the April plantings were still behind the earlier sowings and the May ones generally inferior to the April ones. While these notable differences became less apparent toward the latter part of the growing season, Moufattish Ali Fouad was still able to report in November that the height of the cane in the various plots varied from 2 1/2 to 3 1/2 metres "according to date sown".

The results of the harvesting on March 3, 1937, are detailed in Table III, along with average figures for the second series of experiments at both Mataana (1937) and Mallawi (1936).

As feared from the evident soil variability in the *Kharaga* field where these experiments were laid out, none of these results have any statistical significance, but the general trend is in the direction of previous experiments in time of planting on more uniform soil types, hence they may safely be considered as confirmatory at least. The February plantings show definitely better cane yields and slightly better sucrose in cane than later planted plots, the May planted cane showing a distinctly lower *Richesse* than any of the earlier sowings.

TABLE III.- SECOND MONTHLY PLANTING EXPERIMENT AT MATAANA HARVESTED MARCH, 3 1937

Planted 15th of	Plots (1/6th Feb.)	Kg. Cane per Plot	Quinters per Feddan		Richesse	Averages for 2nd Expts. at Mataana and Mallawi, Quinters Cane per Feddan		% Increase over May
			Total	Less than Feb.		Average	Less than Feb.	
February	A-1	6,590	.....	.....	14.75	.....	.....	.....
	A-8	7,840	.....	.....	14.48	.....	.....	.....
	A-11	9,820	.....	.....	15.14	.....	.....	.....
	A-14	7,760	.....	.....	14.33	.....	.....	.....
	February Average	8,003	1,069	.....	14.68	1,107	.....	18
March	B-2	6,980	.....	.....	14.96	.....	.....	.....
	B-5	8,900	.....	.....	13.97	.....	.....	.....
	B-12	7,730	.....	.....	14.98	.....	.....	.....
	B-15	5,950	.....	.....	15.01	.....	.....	.....
	March Average	7,390	987	82	14.63	1,021	86	9
April	C-3	6,670	.....	.....	15.04	.....	.....	.....
	C-6	6,560	.....	.....	14.95	.....	.....	.....
	C-9	7,930	.....	.....	13.90	.....	.....	.....
	C-16	6,110	.....	.....	14.50	.....	.....	.....
	April Average	6,818	911	158	14.62	977	130	4
May	D-1	5,450	.....	.....	15.01	.....	.....	.....
	D-7	9,510	.....	.....	14.49	.....	.....	.....
	D-10	7,070	.....	.....	13.40	.....	.....	.....
	D-13	6,610	.....	.....	12.98	.....	.....	.....
	May Average	7,310	976	93	13.97	938	169	1

\* Egyptian. Min. Agri. Tech. Bull. 152, 1935.

# CONCLUSIONS

A consideration of the averages for the second series of experiments at Matalana and Mallawi will probably give a better picture of what may be expected from plantings of cane ranging from the apparently optimum period between the middle of February and March to the definitely lower expectancy period represented by the May plantings. These follow identically the same trend shown by the results from the earlier series of experiments, but to a lesser degree. The conclusions are evident—maximum yields of sugar cane will always be obtained under any set of Egyptian conditions when sowing is carried out from mid-February to mid-March. The percentage gain over May-plantings becomes distinctly smaller as the growing season is shortened by later plantings.

These conclusions are most strikingly reinforced if the results of the first-year cane crops of the two series of ridging experiments at Mallawi, discussed in the chapter on cane spacing in this Bulletin are studied from the standpoint of time of planting in each series. The 1933-1934 and 1935-1936 distance experiments are duplicates in every sense—the same randomized layout on very similar soil types and almost identical cultural treatment throughout—except that the earlier series was not planted until May 9, while the second series was laid down on March 18. Table IV shows the average figures for the respective first-year crops (both were harvested in mid-March).

TABLE IV.—EARLY VS. LATE PLANTING IN THE MALLAWI

## RIDGING EXPERIMENTS

(First-Year Canes)

Crop Year	Planted	Qantars Cane per Feddan		Chemical Data			Kg. Sugar per Feddan	
		Yield	% Increase	Richesse	Purity	Glucose Ratio	Yield	% Increase
1933-1934	May 9	837	—	10.82	75.5	10.4	2,708	—
1935-1936	March 18	1152	38	12.82	83.7	5.3	5,849	16

Certainly the greater part of the enormous increase in yield of 315 qantars of cane and over three tons of sugar per feddan of the 1936 crop over that of 1934 must be attributed to the more optimum time of planting—as determined by our previous experiments—of the second series of distance tests. In fact, these comparative yields are in line with the trends shown in the first monthly planting experiments at Mallawi, as found in Table I. Comparing the yields for March and May plantings therein set forth, we obtain the picture shown in little Table V.

TABLE V.—THE MALLAWI MONTHLY PLANTING EXPERIMENT  
(1933-1934)

Planted 15th of	Qantars Cane per Feddan		Kg. Sugar per Feddan	
	Yield	% Increase	Yield	% Increase
May	658	—	2,402	—
March	1,004	53	3,928	64

Here it is seen that the March-planted cane yielded 346 qantars of cane and over 1 ½ tons of sugar per feddan more than the later planted plots.

In our previous Bulletin\* on this subject a letter was published from Director Demulling of the Abu Kurkas Sugar Factory, giving the comparative analyses in January, 1934, of canes planted on the Mallawi Farm in March, April and May, the pertinent figures of which are set forth in Table VI.

TABLE VI.—ANALYSES AT ABU KURKAS OF CANE OF VARYING AGE

Planted in	Richesse (Sucrose and Cane)	Purity	Glucose Ratio (Reduct. % Sucrose)
March	13.72	87.1	4.0
April	11.34	84.1	9.5
May	10.62	79.3	10.1

\* Tech. Bull. 156, p. 5.

We can probably best summarize our own conclusions on the planting date experiments in general by quoting M. Demulling's remarks on the above investigations :—

"The cane planted at the proper time is of much superior quality to that tardily sown. Furthermore, the canes planted in March are longer and of better girth than those sown in April and May. From these two facts it must be concluded that timely planting is of greater value to both planter and manufacturer. The industry would profit materially if all cane planters were informed of these results."

## CHAPTER II

### Sugar Cane Spacing Experiments

In technical Bulletin No. 164\* of the Ministry of Agriculture consideration was given to six large-scale replicated cane spacing experiments at Mallawi, Mataana and Kom Ombo and a detailed analysis was made of the individual and collective crop data for the first-year cane harvested in 1934 and the second-year crop of 1935. The conclusion reached was that these figures furnished no reason for changing in either direction from the practically standard system in Egypt of planting nine rows of cane per two qasabas (about 80 cm. between the rows) which has been empirically arrived at by the fellah with the same uncanny accuracy, with which he gradually developed an optimum spacing for his cotton fields.†

The present paper deals with the third-year cane of the six original experiments and the first two years of a new series of experiments started at Mallawi in 1935.

The writer wishes to acknowledge his indebtedness for whole-hearted and intelligent co-operation throughout the many details of these experiments to Secretary-General, Hussein Bey Enan (who was Director of the Agronomic Section of the Ministry during the early years of these trials), the present Director, Abdel Fattah Noor Bey and Inspectors, Hassan Ahmed Khalifa, Ali Fouad and Mohammed Mahmoud, the two latter in charge of the Mataana and Mallawi, respectively, farms.‡

\* ROSENFIELD, ARTHUR H.—The Spacing of Sugar Cane in Egypt—and Elsewhere. Cairo, 1936.

† TEMPLETON, J.—Watering and Spacing Expts. with Cotton. Min. Agr. Tech. Bull. 112, 1932.

‡ The writer also wishes to acknowledge the excellent assistance rendered by Dr. Mohammed Aly el-Kilany of the Botanical Section of the Ministry and his assistants Selim Nazif Eff., H. Nazgar Eff. and Rashid Moukhtar Eff. and to emphasize the fact that, without the experienced suggestions and enthusiastic co-operation of Directors, Hughes Naus of the *Ermant Sucrierie*, Demulling of Abu-Kurhas and Favre of Kom Ombo, the securing of the very complete and reliable chemical data would have been impossible and the results of these experiments much less valuable.

### GENERAL EXPERIMENTAL PROCEDURE

In all cases the variety of cane employed was Egypt's present standard, *P.O.J. 105\**. A typical randomized layout for the spacing experiments is shown in the frontispiece of the aforementioned Technical Bulletin No. 164. As pointed out in that Bulletin, the area of four qirats, or just one-sixth of an acre, for the individual replications has been adopted as a standard in all of our experiments, since a plot of this size produces sufficient cane for convenient handling at the factories without complicating or unduly slowing down their operation and permits of all the cane from each replication being ground and thus eliminating the complicated and, at best, highly hypothetical factor of obtaining "representative samples".

The harvesting procedure for our experiments has also been standardized. A pre-determined number of plots is cut each day. Workmen are concentrated in one plot at a time and the cane from that replication loaded on to one troop of camels or specified Decauville railway cars (at Kom Ombo) before any cane is allowed to be loaded from other plots. No plot is ever left partially loaded overnight, i.e. the crop from each replication is always loaded into cars and shipped to the sugar factory the night after harvesting, so that all data be comparable. The factory managers not only gave of their counsel as regards organizing and handling the shipments, but each assigned a special assistant to receive, check and weigh trains of experimental cane and supervise the milling, juice sampling and analyses, etc. To their great credit it should be noted that there has hardly been a hitch in all the quite complicated routine of handling a great bulk of large samples running into thousands of tons of cane—an eloquent testimony to the efficiency of their organizations. In order to reduce chances of confusion to a minimum, also, no other than the experimental cane is shipped from the Ministry Farms while harvesting of the experiments is in progress.

### THE ORIGINAL MATAANA AND MALLAWI EXPERIMENTS

Both of the original experiments were located on fairly light loams of apparently quite uniform texture on the respective Ministry of Agriculture Farms.

\* Vide Rosenfeld, Arthur H. "Tonnage Tests of Some Imported Sugar Cane Varieties". Min. Agr. Tech. Bull. 163, Cairo, 1936.

At *Mataana*, the second-year cane was harvested the 22nd of February, 1935, and the first water was given to the stubbles a month later—some four weeks earlier than in the previous year. A second irrigation was made a fortnight later, and during the last week of April the middles were thoroughly plowed out, the plot borders reconstructed, etc.—again considerably in advance of the period at which cultivation was started in these plots in 1934. The first application of manure (100 kg. of nitrosulphate of ammonia per feddan) was made the first of May, coincident with the third watering, the second and third manurial applications at the same rate being given on May 22 and the first of July, respectively. 11 plots received a total of 27 irrigations, the final one being on January 17, 1936—only two weeks before they were harvested the last of that month. Due to the much inferior stand of the third-year as compared with the second-year cane in which fassing was unnecessary, the rows were hoed the middle of June. No consistent differences in stand, height or vigour of the cane planted at varying distances could be detected at any time during the year.

At *Mallawi* the third-year cane received its first watering the middle of April, 1935, and on the 25th of that month superphosphate of lime was applied to all plots at the rate of 100 kg. (16 %  $P_2O_5$ ) per feddan, the middles plowed out and the rows fassed. In addition to the superphosphate, all plots received 300 kg. of nitrate of lime (15 ½ % nitrogen) per feddan, in three equal applications. A second fassing was given the last week in May and a final cultivation on June 10, 1935. Fifteen irrigations were made, the final one at the end of November, 1935, thus permitting of optimum ripeness of cane when cropped on March 10, 1936.

*Some Incidental Observations on Late Irrigation Applications.*—The second-year cane in these experiments received its last irrigation over two months later than this third-year cane, and a glance at the chemical analysis as given in Bulletin 164\* serves to show the enormous difference in quality between the late-irrigated cane, cropped in 1935, and that of the third-year cane to which no late applications of water were made in 1936, as shown in Table VIII of this Chapter. If we average the figures for each year, we obtain the following striking comparison.

TABLE VII.—EFFECT OF LATE IRRIGATIONS ON CANE QUALITY AT MALLAWI

Crop	Age of Cane	Irrigation Discontinued	Qantars Cane per Feddan	Richesse (Suc. % cane)	Purity	Glucose Ratio (Gls. % Suc.)	Kg. sugar per Fed.
1935 ...	2nd Year	Early February...	1,008	11.84	79.4	8.1	4,121
1936 ...	3rd "	End November ...	1,055	13.58	85.0	5.3	5,925

In discussing the 1934-1935 results in Bulletin 164\*, after mentioning that fourteen waterings were given to the second-year spacing experiments, *the final one not until the beginning of February 1935*, the writer remarked:—

"Again it is probable that the comparatively low sucrose and purity of the Mallawi cane (and the glucose ratios some three times higher than the earlier harvested second-year cane at Mataana) shown in Table XI may be partially due to the late application of irrigation water."

This tentative conclusions would appear to be most strikingly justified by the above little Table VII, as also the advantages in water efficiency, which may be obtained by reducing the intervals between irrigations so as to bring all waterings into the warm weather *growing season* of the crop. There is practically no cane growth, as opposed to *ripening*, in the winter months and, hence, very little need of additional water during that period. The third-year cane received one more watering than the second-year in these experiments, but the intervals were so altered as to throw all of them into the period when maximum returns in development could be obtained from all applications. The writer is convinced that *most of the expense of winter cane irrigation is a dead loss to the Egyptian planter*, resulting, as in the case of late and excessive fertilizer applications, only in lower *quality* without any corresponding increase in *quantity* of cane produced per feddan. Once again, "a pound saved is a pound gained".

In this case we have the extraordinary result of third-year cane producing 1 ¼ tons more sugar per feddan than did the quite good second-year crop—an increase of 88%, of which a very large part must be attributed to the more efficient timing of water applications. These are significant figures indeed.

\* Table XI. p. 27.

The detailed average results of the third-year harvest of the Mataana cane at the end of January and of the Mallawi experiment the middle of March, 1936, together with those for the three crops at both farms, are found in Table VIII.

TABLE VIII.—ORIGINAL RIDGING EXPERIMENTS AT MATAANA AND MALLAWI

Number of Ridges per 2 Qasaba (7.1 M.)	Qantars Cane per Feddan		Purity	Richesse	Glucose Ratio (Gluc. % Suc.)
	2nd-Year Cane 1935	Average of 3 Crops			

3rd-Year Cane. I.—*Mataana* (Harvested I—30-36)

8 (90 cm.) ... ..	949	1,008	13.86	86.0	2.6
9 (80 " ) ... ..	929	1,019	13.80	85.9	2.6
10 (70 " ) ... ..	960	1,039	14.17	86.7	2.5

3rd-Year Cane. II.—*Mallawi* (Harvested III—12-36)

8 ... ..	1,046	954	13.45	84.8	5.7
9 ... ..	1,048	977	13.98	85.0	5.3
10 ... ..	1,070	969	13.31	85.1	5.0

III.—*Annual Averages for the Combined Experiments (6 Crops)*

8 ... ..	998	981	12.95	82.7	5.7
9 ... ..	989	998	13.09	82.8	5.6
10 ... ..	1,015	1,001	12.85	82.8	5.9

The third-year results at both Mallawi and Mataana show that the narrowest spacing has produced slightly the best results, as in the case of the second-year cane\*, but the differences are so small

\* Vide again Table XI on page 27 of Tech. Bull. 164.

(the extreme range in each case is one of less than  $1\frac{1}{2}$  tons of cane per feddan) as to fall well within the experimental error, and are, hence, by no means statistically significant, *except as again indicating no economic advantage in altering the standard Egyptian cane spacing of nine rows per 120 qasabas*. The averages for the six crops (Section III of Table VIII) show an insignificantly small increase in yield of cane (the extreme range between the 90 cm. and 70 cm. middles is of a magnitude of less than a ton of cane per acre, while the advantage of the narrowest spaced rows over the normal nine rows per two qasabas is less than a seventh of a ton) as the spacing between the rows becomes narrower, while the normal spacing has given juices of the highest quality, but again by a margin so small as to be statistically of absolutely no significance.

THE KOM OMBO EXPERIMENTS

As pointed out in Bulletin 164, these experiments were originally laid out early in 1933 in four distinct and widely scattered sections embracing soil types from the best to the worst on this extensive property. At *Sabah Gebli* and *Kom Ombo Bahari* the experiments were on very fertile and homogeneous silt loams, the former being a bit superior in homogeneity, although both are first-class lands. The *Raghanu Shark* soil is a fertile, homogeneous clay loam, while the experiment at Abbassia was purposely placed on one of the poorest soil types of the plantation, an irregular (chemically and physically) over-compact clay of below average fertility for the state. Acknowledgement is again due to Moufattish S. Mezrahi \* of Kom Ombo and to Director-General René Bey Cattani and M. Simon Zagloun of the Cairo Office for their interested and constructive co-operation during the whole course of these experiments.

The cultivation of the third-year cane during 1935 was along practically the same efficient lines described in Tech. Bull. 164 for the preceding years, being initiated at an optimum early date so as to allow of a maximum growing season. In all cases the stand of the third-year cane has deteriorated considerably, compared with earlier crops, as indicated by the 1936 crop figures in Table IX, although comparative results in each experiment were along very similar lines to those obtained with both first and second-year cane and the small differences in yields similarly fall short of statistical significance.

\* M. Mezrahi also kindly supplied the photographs illustrating this Bulletin.

TABLE IX.—RIDGING EXPERIMENTS AT KOM OMBO CONDENSED  
RESULTS OF THE FOUR EXPERIMENTS

Number of Ridges per 2 Qasabas (7.1 Met.)	Qantars Cane per Feddan		Richesse (Suc. % Cane)	Purity	Glucose Radius (Red. % Sucrose)
	3rd-Year Cane	Average of 3 Crops			
3rd-Year Cane. I.— <i>Kom Ombo Bahari</i> (Harvested II—13 and 14-36)					
8 ... ..	911.07	1063.39	13.95	84.5	3.4
9 ... ..	991.12	1128.74	14.10	85.1	3.6
10 ... ..	924.60	1088.83	13.84	84.2	3.8
11 ... ..	939.21	1081.68	14.00	85.0	3.4
3rd-Year Cane. II.— <i>Ablassia</i> (Harvested II—9 and 10-36)					
8 ... ..	819.88	916.03	13.74	84.7	3.6
9 ... ..	882.62	975.77	13.28	83.6	4.3
10 ... ..	892.68	998.79	13.65	84.9	4.3
11 ... ..	905.00	1030.63	13.33	83.7	4.4
3rd-Year Cane. III.— <i>Sabah Gehli</i> (Harvested I—6 and 7-36)					
8 ... ..	902.60	1112.98	12.65	82.4	6.1
9 ... ..	896.78	1067.79	12.82	83.1	5.9
10 ... ..	877.27	1056.94	12.89	82.9	5.6
11 ... ..	905.64	1084.07	12.41	81.7	6.3
3rd-Year Cane. IV.— <i>Raghama Shark</i> (Harvested II—1 and 2-36)					
8 ... ..	1077.86	1102.62	12.14	81.7	5.8
9 ... ..	1006.07	1103.11	12.14	81.4	6.1
10 ... ..	934.33	1070.45	12.05	81.2	4.9
11 ... ..	1123.65	1139.57	12.05	81.2	5.9
V.—Annual Averages for the Combined Experiment for 3 years (12 Crops)					
8 ... ..	950.35	1048.76	13.37	82.9	5.4
9 ... ..	944.15	1068.85	13.31	82.8	5.6
10 ... ..	907.22	1053.75	13.33	82.8	5.4
11 ... ..	968.38	1083.99	13.17	82.4	5.8

Examining the condensed data in Section V of Table III, we find the yield figures for the different distances closely bunched both in the third-year cane and in the averages of the four crops for the full three years. No definite trend can be observed. In both cases the narrowest spaced plantings have given slightly the best tonnages, but for the third-year cane the increase over the normal spacing of nine rows per two qasabas is one of just about a ton of cane per feddan, whilst the average annual increase during the three years has been just over two-thirds of a ton. On the other hand, the narrowest spaces cane has shown slightly the poorest average juice quality, although here again the indefinitely small variations cannot be considered statistically significant.

At all events, if we consider the additional expense and various disadvantages of planting and cultivating cane at eleven ridges per two qasabas, as detailed on pages 36 and 37 of Technical Bulletin 164, the slight annual increment in yield from such closely spaced cane would be more than offset even though statistically significant. Hence, the conclusion is obvious that this extensive series of experiments has failed to produce any incentive towards varying the standard cane planting distance of about 80 cm. between the rows on any of the soil types at Kom Ombo.

#### FURTHER EXPERIMENTS AT MALLAWI

Early in 1935, after consultation with Supt. Mohammed Mahmoud Eff. and officials of the Agronomic Section of the Ministry of Agriculture it was decided to initiate a new spacing experiment on the Mallawi farm along lines exactly duplicating the original one except that planting of the new experiment at the optimum period indicated by our experiments was assured. The land selected was again a fairly light, apparently homogeneous loam, of very similar quality to that occupied by the former trials, although located in a different section of the farm.

Whereas in 1933 the first plowing was not given until April 23, in these experiments this was carried out in a thorough manner the middle of January, the second plowing and *zahuffing* (harrowing) taking place the first week in February 1935. During the following week the *hods* were divided and the plots laid out and ridged at the proper spacings, with careful checking. Early in March calcium superphosphate (16%) was applied to all plots at the rate of 200 kg. per feddan, and the middle of that month the experiment was "wet" planted—almost two months in advance of the sowing of the first series of distance trials in 1933. A little dirt was thrown in the rows and the plots

irrigated the last week of March. Eighteen additional waterings were given the plots up to the end of November, 1935, and a final light one (twenty irrigations as compared with seventeen in the first series of experiments) after the annual canal cleaning period (*elqafaf*), when no irrigation water is available for a month or six weeks, on February 18 1936, exactly one month before the experiment was harvested. Although early planting gave the new experiments a growing season almost two months longer than the plant cane of the first series of tests, only three fassings were required as compared to four in the earlier trials—another excellent reason for cane sowing before the weeds and grasses have had time for luxurious development the first the middle of April (as compared with the first week in June in 1933) and the last one the latter part of May, 1935, as against the 22nd July in the original plant cane experiments. A final cultivation was given the middle of June. All plots received calcium nitrate at the rate of 300 kg. per feddan, in three equal "doses", the final one on the very satisfactory date of June 22, 1935—five weeks earlier than the corresponding final application of manure to the 1933 plant cane. No consistent differences in germination, height or general vigour between the distinct spacings could be observed throughout the growing season of 1935.

As ratoons the plots were watered during the first week in May (rather late) and a fortnight later the rows were hoed and ridges opened. The first of three applications of nitrate of lime at the rate of 100 kg. per feddan each—a total of 46 ½ kg. of nitrogen for the season—was supplied on May 23, 1936, the second a month later and the final one on July 4. On June 10 the ridges were opened, a final cultivation given and the canals and plot borders re-established. No further fassings were necessary. Sixteen waterings were given, the final one on November 20. As in the case of the first-year cane, no consistent differences in stand, height or vigour were apparent at any time during the growing season of 1936.

In Table X will be found the detailed results of the plant cane crop the middle of March, 1936, the figures for the ratoon crop the middle of February, 1937, and the annual averages for the three series of experiments at Mallawi and Mataana, embracing a total of eight distinct crops.

TABLE X.—THE SECOND SERIES OF RIDGING EXPERIMENTS AT MALLAWI

I.—First-Year Cane

(Harvested III—17 and 18-36)

Number of Ridges per 2 Qasabas (7.1 Met.)	Plots (4 Qirots)	Kg. Cane per plot	Qantars Cane per Feddan	Richesse (Suc. % Cane)	Purity	Glucose Ratio
8 (90 cm.) ...	A — 1	7,030	—	12.34	82.2	5.3
8 ... ..	A — 4	8,350	—	12.88	81.9	5.8
8 ... ..	A — 6	9,350	—	12.58	82.0	5.9
8 ... ..	A — 11	8,430	—	13.49	86.2	3.9
8 (90 cm.) Average ...		8,290	1,107	12.82	83.3	5.2
9 (80 cm.) ...	B — 3	8,750	—	13.15	83.9	5.2
9 ... ..	B — 5	9,780	—	12.87	83.4	4.7
9 ... ..	B — 8	8,100	—	14.44	80.4	4.4
9 ... ..	B — 10	9,130	—	12.27	83.7	5.1
9 (80 cm.) Average ...		8,940	1,194	13.18	85.1	4.9
10 (70 cm.) ...	C — 2	9,100	—	11.51	79.3	6.9
10 ... ..	C — 7	9,020	—	13.32	85.5	5.4
10 ... ..	C — 9	8,150	—	11.53	79.9	6.7
10 ... ..	C — 12	8,350	—	13.42	85.9	4.2
10 (70 cm.) Average ...		8,655	1,156	12.45	82.7	5.8

II.—Second-Year Cane

(Harvested 18 Feb., 1937)

Number of Ridges per 2 Qasabas	Qantars Cane per Feddan		Richesse	Purity	Glucose Ratio
	2nd-Year Crop	Average of 2 Crops			
8 ... ..	1,047	1,047	11.16	80.9	11.0
9 ... ..	1,042	1,118	11.82	83.2	10.1
10 ... ..	1,053	1,105	11.57	81.5	9.8

III.—Annual Averages for the Combined Experiments.

Mallawi and Mataana 8 Crops

8 ... ..	1,005	12.71	82.6	6.3
9 ... ..	1,028	12.94	83.1	6.1
10 ... ..	1,027	12.64	82.6	6.4



The first-year figures in Table X, if compared with the corresponding data for the plant cane harvest of the first series of distance experiments in March, 1934, as set forth in Table X of Technical Bulletin 164\*, afford another striking comparison, the 1936 crop showing positively enormous increases in tonnage per feddan, and in cane quality, over that of the late-planted first-year cane in the earlier trials. As this remarkable increase in yield of cane and sugar per acre appears to be due almost entirely to the longer growing season permitted by early sowing, it is discussed in detail at the conclusion of the chapter dealing with the optimum sugar-cane planting date in the present Bulletin.

The juices of the second-year cane in the current experiments (Part II of Table X) reflect the effects of the early and persistent heavy frosts of December, 1936, and January, 1937—the most damaging for many years. Suddenly following exceptionally warm, “growing” weather, the frosts caught the cane in full vegetative development and precluded the normal slow ripening which usually succeeds a gradual reduction of atmospheric temperatures and irrigation water.

The differences in quantity and quality of cane yielded by the plots planted at varying distances are again too small and variable to attain statistical significance in either the first- or second-year crop from the new experiments, the extreme variation between the average yields for the two crops (Section II of Table X, third column) being one of less than two tons of cane per feddan. An examination of the average annual results for all three series of experiments at Malawi and Mataana, involving eight distinct crops (Section III of Table X), reveals the fact that the figures for all categories are very closely bunched, the extreme difference between the yields of cane being of the order of just about one ton per acre. The normal plantings at 80 cm., have consistently shown slightly the best juice quality throughout, but the degree of superiority is almost infinitesimal and falls far short of statistical significance. All of which again emphasizes the previous indications of these experiments that there seems to be no advantage in modifying our present standard spacing of nine ridges per two qasabas.

#### CONCLUSIONS

These indications are strengthened by a study of Table XI, showing the average annual results from the twenty crops of cane planted at 8, 9 and 10 ridges per 2 qasabas represented by first-, second- and third-year cane in the four experiments at Kom Ombo and the original ones at Mataana and Mallawi and the first- and second-year cane in the second series at Mallawi.

TABLE XI.—AVERAGE ANNUAL RESULTS OF ALL SEVEN-DISTANCE EXPERIMENTS FOR THE FOUR YEARS (20 CROPS)

Experiments	Location	A — 8 (90 cm.)				B — 9 (80 cm.)				C — 10 (70 cm.)			
		Qantars per Feddan	Richesse	Purity	Gluc. Ratio	Qantars per Feddan	Richesse	Purity	Gluc. Ratio	Qantars per Feddan	Richesse	Purity	Gluc. Ratio
4	Kom Ombo	1048.76	13.37	82.9	5.4	1068.85	13.31	82.9	5.6	1053.75	13.33	82.8	5.4
1	Mataana	1008.00	13.82	83.3	3.1	1019.00	13.87	85.5	3.1	1039.00	13.86	85.8	3.1
2	Mallawi	1003.00	12.04	80.8	8.2	1033.00	12.39	81.7	7.8	1023.00	11.91	80.8	8.2
7	Grand Average*	1029.86	13.05	82.6	5.9	1031.49	13.13	82.9	5.9	1042.86	13.00	82.7	5.9

\* Weighted.

The normal spacing at 80 cms, between the rows shows slightly the best results in both quantity and quality of cane, but the extreme range between the average annual figures for the three spacing variants is one of only about a ton of cane per year, slightly over one-tenth of a point *Richesse* and less than one-third of a point in *Purity* differences which, even for such a large number of experiments, fall far short of statistical significance. They do, however, strongly reinforce the conclusion arrived at in Tech. Bull. 164 to the effect that the large amount of experimental data shows absolutely no reason for changing in either direction from the practically standard system of planting nine rows of cane per two *qasabas*, which has been empirically arrived at by the Egyptian planter with the same uncanny accuracy displayed in his gradual development of an optimum cotton spacing.

### CHAPTER III

#### Cane Tops as Planting Material

In cane-growing, as in most other things, each country has its peculiarities, some due to climatic or soil exigencies, others due only to established customs and practices. In Cuba cane is left as stubble for many years; in Java the Government allows no ratoons; in Egypt and the Argentine\* cane tops are regarded as excellent forage for work animals; in Louisiana they are burned without any use being made of them. In Java, Hava, Hawaii and many others of the most progressive cane-growing countries, only tops are used for planting. In Egypt, Louisiana and in the Argentine, from 3 to 4 tons of whole canes are used per acre for planting. It is of this latter point that we propose to treat in this section.

Repeated experiments in all parts of the world have demonstrated that the upper part of the cane stalk germinates more quickly than the lower part† and Stubbs‡ has shown conclusively, by ten year of planting tops from tops, that no degeneration of the cane takes place from planting the upper third of the cane, as is suggested by many opponents of this system, on the ground that that portion of the cane, not being mature and having very low sugar content, will not,

logically, produce well developed, high-sugar-content progeny. Dr. A. McMartin has recently\* stated categorically that "it is generally known that the top portion of the stalk is better from this point of view than the bottom. The superiority in vigour..... is generally recognized. (See graph.)

Everyone who has grown sugar cane or manufactured sugar knows that it is precisely the upper part of the cane which contains the greater portion of the impurities and, therefore, gives the juices of lowest purities and most difficult working in the factory. In other words, one may say that, generally speaking in the subtropics, on cutting any mature cane into three pieces, extracting and analyzing the juice of each piece, going from bottom to top, one will find that the purity of the juice and the sugar content decrease as he nears the top of the cane. The custom of Java, Hawaii, etc., then, of planting their tops and grinding the most valuable part of their cane, from the sugar-producing standpoint seems most logical, as from the lower part of the cane, which they grind, a juice is secured in the factory which, on account of its high purity, renders the work of defecation, clarification and evaporation comparatively easy, while the planting is done with cane, a good proportion of which is usually flung away as worthless, although it is the top portion which always contains the highest proportion, of easily broken-down reducing sugars (glucose, etc.) which so readily supply the carbon dioxide and water which control the vigour, with which a bud commences to develop. †

With these points in mind, therefore, the writer resolved in the first years of the Tucumán Sugar Experiment Station in Argentina, to make a thorough investigation of this subject. A plot of land, which seemed to have equal conditions throughout, was chosen and prepared for the experiment. Half of the plot was then planted with whole canes and the other half with tops taken from a consignment of leaves and tops used for feeding the animals of the institution, which had been received from one of the nearby factories.

\* Pathological Conditions Affecting Growth of Sugar Cane from Cuttings in Natal. Proc. Soc. Af. Sug. Technals. 1937.

† The more easily the carbohydrates are broken down the more quickly can the bud make use of them and inasmuch as sucrose has to be inverted to the reducing sugar forms before it can be assimilated by the plant, it would seem logical to infer that the higher invert sugar content in the tops may be reflected in superior germination of the buds of the top portion of the cane. In Esch, H. Evans, in the Fifth Annual Report of the Mauritius Sugar Cane Research Station (1934, p.46) has shown that a significant negative correlation does exist between the invert sugar content of the seed piece and the number of days required for germination—the higher the reducing sugars the fewer days required for sprouting.

\* ROSENFELD, ARTHUR H.—Despunte vs. Cañas Entoras. Revista Industrial Agrícola de Tucumán Año, V, pp. 100-3, 1911.

† Mc-MARTIN, A.—Estudios Botánicos sobre la Caña de Azúcar. El Mundo Azucarero, p. 183, N.Y., 1936.

‡ Stubbs, W. C.—Sugar Cane, New Orleans, 1907.

The selection of the tops from the consignment for forage was not adopted as the most practical method, but merely because an extremely drastic comparison would be furnished, as the tops planted were actually those which had been thrown aside as useless.

The experiments were carried through first year stubble and later a second series was started, which was also carried through second-year cane.

In all cases the results were similar. The tender tops, due to the long period in the ground essential in sub-tropical countries as compared to the immediate germination that is possible in tropical ones, naturally suffered more from decay than the more resistant whole canes and gave a slightly more irregular stand of cane, which was reflected in average yields of cane per acre some 11 per cent smaller than were obtained from the whole cane "seed". For the two experiments (two crops each of first- and second-year cane) the tops (*Bouts-Blancs*) yielded an average of 24.4 tons of cane for the factory against 27.4 tons for the whole canes.

Otherwise the appearance of the cane and its quality at crop time was identical throughout the two series of experiments, the better yield from the normal planting material being apparently due entirely to the superior germination resulting from its greater hardiness. Also the yield differences were greatest in first-year cane, suckering in the second-year cane to some extent compensating for the reduced first-year stand.

Inasmuch as the writer was frequently consulted during his first months in Egypt as to the practicability of utilizing tops for seed in this country as in the Tropics, it was decided to lay out a demonstrative replicated experiment at Kom Ombo along the same lines as the Argentine ones just discussed again utilizing the extreme top seed instead of the upper third of the cane which is more commonly employed in tropical regions.

After consultation with General Manager René Bey Cattau and Waquil S. Mezrahi of the Kom-Ombo Co., to whom the writer is much indebted for suggestions and co-operation, an area of two feddans of a very fertile and homogenous silt loam at Kom Ombo Bahari was selected for the experiment. This was divided, after thorough preparation according to standard Kom Ombo practice, into twelve plots of four *qirats* (1/6th acre) each, each alternate plot being planted on February 9, 1933, with the usual whole-cane *bouture* of the standard P.O.J. 105—(*Meyya Khamisa*) variety selected by M. Mizrahi and the others with the *Bouts-Blancs* from cane harvested that day. Thus one feddan was devoted to each type of planting material.

The preparation, irrigation, fertilization and general cultivation as well as method of harvesting the distinct replications, were identical with those described for the spacing experiments \*at Kom Ombo.

Again it was observed that the germination from the tops was slightly inferior to that from the usual *boutures*, otherwise the development of the cane from the two types of seed, as regards height, colour, etc., was apparently identical throughout the three years of the experiment. Nor did the analyses, kindly made under the direction of M. Favre at the Kom Ombo Factory reveal any statistically significant differences in the quality of the cane produced during the three crops.

The first-year cane was harvested on March 18, 1934, the second-year on March 1, 1935, and the third-year on February 10, 1936, with the results shown in the Table. next page.

The excellent tonnage harvested from the plots where tops were used for seed averaged 54 % less than that from normal *tagawi* over the three years, as compared with just about twice that difference shown in the Argentine experiments. The compensation from suckering reducing the gaps in stand in the *Khelfa* may be measured by the comparative percentage differences in annual yields. As first-year cane, the top seed produced 66 % less cane than the control plots, while in second- and third-year cane the production was 5.4 % and 4 % respectively less. In other words, the tops produced 93.4 % as much cane as the full cane seed as plant cane, the second-year cane 94.6 % and the third-year 96 % of the normal.

\* ROSENFELD, ARTHUR H.—Min. Agr., Tech. and Sci. Ser., Bull. 164, 1936.

TABLE XII.—TOPS VS. WHOLE CANES FOR PLANTING

Plots (4 Qirats)	Quintars 1st Year Cane, 1934		Quintars 2nd Year Cane, 1935		Quintars 3rd Year Cane, 1936		Averages Quintars, 1934-1936	
	Normal	Tops	Normal	Tops	Normal	Tops	Normal	Tops
1 and 2	182.04	179.02	175.11	161.24	173.33	163.62	176.83	167.96
3 " 4	203.25	191.11	180.49	180.31	177.39	172.54	187.04	181.32
5 " 6	196.89	179.51	196.89	174.80	171.47	167.16	188.42	173.82
7 " 8	217.78	197.96	200.71	186.53	188.58	186.62	202.36	190.37
9 " 10	204.04	202.04	187.96	191.29	182.22	187.65	191.41	183.66
11 " 12	185.47	162.04	184.89	171.11	171.22	144.65	180.53	159.27
Per Feddan ...	1,189.47	1,111.68	1,126.05	1,065.28	1,064.21	1,022.24	1,126.59	1,066.40

## CONCLUSIONS

These results confirm those of previous experiments made by M. Mezrahi in Mataana in 1919-1920 and at Kom Ombo (Sebil) some ten years later, indicating that the planting of *Bouts-Blancs* as general practice in Egypt would not be advisable. While it is probable that the employment of the upper third of the cane, instead of the extreme tender tops, would result in yields just as heavy as from the *tagawi* of whole cane normally employed, M. Mezrahi is probably eminently correct in considering that the inconvenience and expense of handling this type of seed cane as routine practice on the plantation would more than nullify a slightly lower cost per ton for the top-third seed. Nevertheless, new experiments are being initiated in which the upper third of the cane will be employed as *tagawi* instead of merely the *Bouts-Blancs*, as in the case of the present extreme trials.

Under one set of conditions—not too uncommon in some sections of the Egyptian cane-growing area—the use of the upper third of the cane as *tagawi* should prove advantageous. Where cane is planted too late in the season\* it may have an extremely low sucrose content† at the time the first-year cane must be sent to the factory. If the planter has his land prepared for the current year's sowing he could top such cane lower than is ordinarily done, employ the top third as *tagawi* to be planted immediately and despatch to *Sucrerie* cane which has been vastly improved in quality by the removal of these unripe portions.

\* ROSENFELD, ARTHUR H.—Optimum Sugar Cane Planting Date in Egypt. Min. Agr. Tech. and Sci. Serv., Bull. 166, 1935.

† Says McMartin (*loc. cit.*) in this connection, "Where the planting season coincides with the milling season, there appears no reason why it could not be arranged..... to cut a larger top..... reserving this portion for planting..... By doing so, not only superior planting material is obtained, but better cane will be sent to the mill".

**List of Technical Staff of the Botanical Section**

DR. JAMES TEMPLETON, *Chief Botanist.*

MR. C. H. BROWN.

MR. H. A. HANCOCK.

DR. J. PHILP.

DR. A. H. ROSENFELD.

MR. F. DUNKERLEY.

ARMENAK BEDIVIAN EFF.

M. MOHAMED EL-DEEB EFF.

MR. M. ALI KILANY EFF.

MAHMOUD FAYEK EFF.

M. ABDALLAH ZAGHLOUL EFF.

M. SAID ABOUL-ATTA EFF.

DR. WADIE CHAROUBIM EFF.

M. ABDEL-AZIZ EL-KOSHEIRI EFF.

A. H. GALAL MEHREZ EFF.

MAHMOUD GOHAR EFF.

AHMED MOUNIR EFF.

ABDEL-HAMID SOUELEM EFF.

ALBERT WEINSTEIN EFF.

ADEL-GHAFFAR SELIM EFF.

YOUSSEF SHABETAI EFF.

MOHAMED BADR EL-DIN EFF.

AHMED AHMED YOUSSEF EFF.

MOHAMED ATIFI HUSSEIN EFF.

ARMED ZAKI ABOU EL-NAGA EFF.

RIAD NAGUIB EFF.

MOHAMED MAHMOUD SALEH EFF.

MAHMOUD FAHMY EL-KATER EFF.

MAHMOUD ABDEL-BAKI EFF.

MOHAMED SADER EFF.

ABDEL-FATTAH M. EL-SAYED EFF.

FAWZI SAWIRIS BASTA EFF.

DR. HUSSEINI IBRAHIM EL-MOQIER EFF.

AHMED ZAKI ABDEL-GAWAD EFF.

SERIM NAZIF EFF.

IBRAHIM HANDI EFF.

ABDEL-AZIZ MOUSTAFA OMAR EFF.

OSMAN ABDEL-HAFEZ EFF.

MOHAMED ALY BASSIM EFF.



FIG. 1.—Boughs (planting irrigation)



FIG. 2.—The first tassing




FIG. 3.—Plowing at Kom-Oumbo with Fowler tackle




FIG. 4.—Appearance of field after first steam plowing



FIG. 5.—Preparing tagawi at experimental field.



FIG. 6.—Ready for planting.





FIG. 7.— Selecting the seed pieces



FIG. 8.— The tagawi is transported by camels



FIG. 9.—Distribution of seed pieces  
in planting furrow



FIG. 10.—Covering tagawi with the fass


# MONTHLY PLANTING EXPERIMENTS

4	2	3	2	2	1
3	D	C	B	A	
8	B	A	D	C	
12	C	B	A	D	
16	A	D	C	B	

Size of plots : 4 Quints ( $\frac{1}{4}$ th Acre)

Planted 10th : (A) Feb. (B) March (C) April (D) May

Variety : P.O.J. 108



# DEVELOPMENT OF PRIMARY SHOOTS ON SUGARCANE CUTTINGS




FIGURE 57. *SYMPTOM*

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT

---

Technical and Scientific Service

(Sugar-Cane Investigation Division)

---

BULLETIN No. 196

---

FURTHER TONNAGE TESTS  
OF IMPORTED SUGAR CANE VARIETIES

BY

ARTHUR H. ROSENFELD,

*Government Sugar Cane Technologist*

(Recommended for Publication by the Publications Committee of the  
Ministry of Agriculture, which is not, as a body, responsible for the  
opinions expressed in this Bulletin)

Govt. Press, Bulâq, Cairo. 1939

Government Publications are on sale at the "Sale  
Room" Ministry of Finance. Correspondence relating  
to these publications should be addressed to  
the "Publications Office" Government Press,  
Bulâq, Cairo.

Price - - - - - Mills. 15.



ONE OF THE VARIETY PLOTS

## Further Tonnage Tests of Imported Sugar Cane Varieties

In a previous paper<sup>(1)</sup> the writer outlined the varietal revolution which has occurred in the sugar industry during the present century and briefly reviewed the history of introductions of cane varieties into Egypt beginning with the historical importation of what is now our standard variety—*P.O.J. 105*—from Java by M. Henri Naus Bey in 1902, finally describing the tonnage trials, on the Ministry of Agriculture Farm at Mataana, of nine of the more promising imported varieties in comparison with *P.O.J. 105* as the control. In the first-year cane harvest *P.O.J. 105* yielded some five tons of cane and 350 kilogrammes of sugar per feddan more than its nearest competitor and sister cane <sup>(2)</sup>, *P.O.J. 36 (M)*.

These experiments, as well as duplicate ones on the Ministry Farm at Mallawi, were laid down on fairly light fertile loams of apparently quite uniform texture, each variety being replicated three times. Planting distance was uniformly nine ridges per two qassabas (about 80 cms).

### SECOND-YEAR RESULTS AT MATAANA.

The first-year cane was harvested at the end of February, 1935, and the stubble was not watered until almost two months later. The middles were thoroly plowed out on 10th May, the plot borders reconstructed etc., and a week later, along with the second irrigation, the first application of manure (100 kgs. of 26% Nitrosulphate of Ammonia per feddan, i.e. 26 kgs. of nitrogen) was made. The second and third fertilization at the same rate were given at the end of May and on 24th June, respectively, all plots receiving their only fassing at the time of the final application. Due to the late start of cultivation, a total of only 22 irrigations could be given — two less than to the first-year cane—the final one on the very satisfactory date of 18th December, 1935, some seven weeks earlier than the last application

<sup>(1)</sup> Tonnage Tests of some Imported Sugar Cane Varieties, Min. Agr. Tech. Bull. 168, Cairo, 1936.

<sup>(2)</sup> For parentage of all canes herein discussd, see the writer's "Sugar Cane Breeding in Egypt," Min. Agr. Tech. Bull. 161, 1936, or "Nomenclature and Genetics of Sugar Cane Seedlings", in Intl. Sug. Jour., XXXVII, 1935.



of water to the plant cane. The earlier stoppage of irrigation is obviously reflected in the uniformly high sucrose shown by all varieties when harvested on first February, 1936 (Table I).

TABLE I.—THE FIRST EXPERIMENT AT MATAANA

Variety (1)	Cane per Feddan		Richesse Suc. % Cane	Kgs. Sugar per Feddan
	Metric Tons	Qantars		

I. SECOND-YEAR CANE HARVESTED 1ST FEB., 1936

P.O.J. 105	43,466	968	15.36	5346
.. 36 (M)	41,680	928	13.98	4608
.. 36	40,440	900	15.31	4934
.. 979	39,160	872	14.81	4621
Co. 281	41,706	928	14.89	4963
P.O.J. 234	32,640	727	15.41	4015
H. 109	25,546	569	13.73	2810
P.O.J. 2714	13,814	307	14.50	1602
B.H. 10 (12)	17,226	383	15.41	2119
P.O.J. 2725	13,784	307	16.17	1778

II.—AVERAGES FOR 1ST AND 2ND YEAR CANE

P.O.J. 105	47,133	1049	14.52	5442
.. 36 (M)	43,813	975	11.08	4930
.. 36	41,767	929	14.84	4945
.. 979	39,914	888	14.77	4710
Co. 281	39,800	886	14.43	4604
P.O.J. 234	31,000	757	14.88	4041
H. 109	30,400	677	13.52	3274
P.O.J. 2714	21,667	483	14.34	2469
B.H. 10 (12)	19,973	445	14.65	2318
P.O.J. 2725	17,052	380	16.11	2190

As in the case of the first-year cane in 1935, a glance at the table shows that the standard control cane, *P.O.J. 105*, has again out-distanced all the other varieties in production of cane and sugar per feddan, altho its advantage in cane production over *P.O.J. 36 (M)* and *Co. 281* is one of but forty qantars per acre. Due to its high juice quality, it has again produced over 350 kgs. of sugar per feddan

(1) Explanation of Initials. P.O.J. = Proefstation Oost Java (East Java Expt. Sta.) Co = Coimbatore (India). H. = Hawaii. (M) = Minka (Striped). B.H. = Barbados Hybrid.

more than its nearest competitor, in this case *Co. 281*. Again, too, the differences between the yields of the striped (*M. = Minka*, the Japanese word for striped) and ordinary form of *P.O.J. 36* are not statistically significant, altho, as with the previous crop, the normal slight superiority in tonnage and inferiority in sucrose of *P.O.J. 36*, as compared with its mutant, has been reversed. *P.O.J. 2725 & 234* and *Co. 281* have all maintained their reputation as early-ripening high-sucrose canes, while *H. 109* again shows the lowest sucrose-content of all varieties.

All thru the growing season the last four varieties *H. 109*, *B.H. 10 (12)* and *P.O.J. 2714 & 2725* were notably short and stunted, indicating that they are typical tropical canes for which our growing season is too short, a conclusion which is confirmed by the writer's experience with these varieties in other sub-tropical countries.

THE MALLAWI EXPERIMENTS.

On account of the necessity of increasing our seed supply to an amount adequate for replicated experiments, a duplicate to the Mataana trial just described could not be laid down on the Mallawi Farm until 1935. Except for the fact that the experimental field was plowed about a month earlier than in the case of the second series of spacing experiments at Mallawi and that one irrigation less was given the first year cane, the details of preparation, planting, cultivation, fertilization, irrigation, etc., were practically identical for both 1st and 2nd year cane to those described in the chapter dealing with the ridging experiments in the recent Technical Bulletin entitled "Cane Planting Experiments." Even the final irrigation was supplied to the first year cane just one month before the harvest on 18th March, 1936, which probably accounts for the much lower sucrose figures for the Mallawi varieties than for those harvested at Mataana some six weeks earlier (*c.f.* first sections of Tables I & II).

From the early part of both growing season it was noticeable that *P.O.J. 2725 & 2714*, *B.H. 10 (12)* and *H. 109* were slower growing and shorter than the other varieties, altho strangely enough, if we consider the more northerly climate of Mallawi, this contrast was not so extreme as in Mataana. *P.O.J. 2725* particularly, which gave uniformly the poorest tonnage at Mataana, while notably shorter than the first six varieties at Mallawi, had excellent stands of cane both years and was fifth in tonnage as first-year cane and sixth as second-year in the more northerly location. Indeed, its characteristically high sucrose content as first-year cane caused *P.O.J. 2725* to take second-place in production of sugar per feddan. The freezes of December, 1936, and January, 1937, however, visibly affected

the shorter canes more than the better developd ones and, for the first time in our Egyptian experiments, *P.O.J. 2725* showed a low *Richesse*, with the result that as second-year cane it dropt to fifth place in sugar production per acre. The sugar contents of the second-year cane of all varieties as compared with the first-year cane (Table II) indicate, however, that all varieties were affected by the early freezes, altho the first six varieties showed only the tips of the leaves "burnt" by frost, in contrast to the entirely straw-colored appearance of the shorter-growing varieties.

In Table II will be found the detailed crop data for 1st and 2nd year cane and the averages for the two.

TABLE II.—THE MALLAWI EXPERIMENTS

Variety (1)	Cane per Feddan		Richesse	Kgs. Sugar per Feddan
	Metric Tons	Qantars		
I. - FIRST-YEAR CANE HARVESTED 18TH MARCH, 1936				
P.O.J. 105	54.368	1210	12.28	5328
" 36 (M)	51.173	1139	14.04	5731
" 36	48.827	1087	13.69	5371
" 979	46.720	1040	12.28	4579
Co. 281	51.608	1149	12.46	5161
P.O.J. 231	39.547	880	14.92	4706
H. 109	31.760	774	12.08	3372
P.O.J. 2714	32.240	718	13.72	3546
B.H. 10 (12)	36.000	801	12.22	3528
P.O.J. 2725	47.120	1049	14.22	5372
II. - SECOND-YEAR CANE HARVESTED 15TH FEB., 1937				
P.O.J. 105	44.746	996	11.87	4251
" 36 (M)	44.054	981	11.62	4097
" 36	41.414	922	12.09	4017
" 979	38.614	860	12.67	3900
Co. 281	48.586	1082	13.53	5247
P.O.J. 231	37.040	825	13.49	4000
H. 109	33.720	751	12.02	3237
P.O.J. 2714	16.534	368	12.31	1620
B.H. 10 (12)	29.400	654	11.40	2675
P.O.J. 2725	37.280	830	11.61	3467



*P.O.J. 2725 AT AGE OF 4 YEARS*

(1) Detailed descriptions of all varieties herein discussd will be found in Ministry of Agriculture—Tech. Bull. 168, pp. 13-16.

TABLE II.—THE MALLAWI EXPERIMENTS (contd.)

Variety. (1)	Cane per Feddan		Richesse	Kgs. Sugar per Feddan
	Metric Tons	Qantars		
III.—AVERAGES FOR 1ST AND 2ND YEAR CANE				
P.O.J. 105	49.557	1103	12.08	4745
.. 36 (M)	47.614	1060	12.83	4914
.. 36	45.121	1005	12.89	4694
.. 979	42.667	950	12.48	4240
Co. 281	50.087	1115	13.00	5204
P.O.J. 234	38.294	852	14.21	4353
H. 109	34.240	762	12.05	3305
P.O.J. 2714	24.387	543	13.02	2583
B.H. 10 (12)	32.700	727	11.81	3102
P.O.J. 2725	42.200	939	12.92	4420

As first-year cane *P.O.J. 105* has again produced the statistically significant quantity of about three tons of cane per feddan more than *Co. 281*, and *P.O.J. 36(M)*, but the high sucrose content of *P.O.J. 36(M)* has resulted in that variety producing over 400 kilogrammes more sugar per acre than the control variety. The differences in sugar yields between *P.O.J. 36, 105* and *2725* are of too low an order to attain statistical significance. *P.O.J. 234* shows the best *Richesse* and *H. 109* once more the poorest.

As ratoons (Section II) *Co. 281* shows a statistically significant increase of some four tons of cane per acre over the yields of *P.O.J. 105* and *36 (M)*, its high sucrose content resulting in the production of a ton of sugar per feddan more than the standard variety (2nd place). The extreme variation in sugar production amongst *P.O.J. 36(M)*, *36* and *234* (*Richesse* 13.49 per cent) is of the order of less than 100 kilogrammes of sugar per acre and these differences are, therefore, not statistically significant.

Considering the average figures for the two Mallawi crops (Section III), the difference of less than 1/2 ton of cane per feddan per annum in the yields of *Co. 281* and *P.O.J. 105* is entirely too small to be statistically significant, but the fact that the superior *Richesse* of *Co. 281*

(1) Detailed descriptions of all varieties herein discussed will be found in Ministry of Agriculture Tech. Bull. 168, pp. 13-16.

has enabled it to produce an average of almost 1/2 ton of sugar more than the control cane indicates that this Indian cane is very much at home in its Minya environment. It has shown excellent ratooning qualities at both Mallawi and Mataana, being the only variety in the latter experiments to give more cane and sugar per feddan as second-year cane than it did in the plant cane crop. That it is a variety of wide adaptability is shown by its rapid increase in cultivation of late years in countries of such distinct environment as Louisiana (Gouaux and Simon<sup>(1)</sup> have recently reported that it is now one of the most valuable of their commercial field canes, consistently as good as *P.O.J. 234* from the sucrose standpoint and far superior as regards tonnage of both plant and ratoons) and Natal.<sup>(2)</sup>

The annual increase of less than 170 kilogrammes of sugar per feddan shown by *P.O.J. 36 (M)* over the yield of *P.O.J. 105* is not statistically significant. As at Mataana, it is evident that *H. 109*, *P.O.J. 2714* and *B.H. 10(12)* are definitely unsuited to our conditions. The latter shows the lowest average sucrose content and *P.O.J. 234* the highest by a wide margin.

The average annual results from the 1st and 2nd year crops of both experiments are shown in Table III.

TABLE III.—AVERAGES FOR FOUR CROPS AT MATAANA AND MALLAWI<sup>(3)</sup>

Variety	Cane per Feddan		Richesse	Kgs. Sugar per Feddan
	Metric Tons	Qantars		
<i>P.O.J. 105</i> ... ..	48.345	1076	13.30	5094
" <i>36 (M)</i> ... ..	45.714	1018	13.46	4922
" <i>36</i> ... ..	43.414	967	13.87	4820
" <i>979</i> ... ..	41.291	919	13.63	4475
<i>Co. 281</i> ... ..	44.949	1001	13.72	4904
<i>P.O.J. 234</i> ... ..	36.147	805	14.55	4197
<i>H. 109</i> ... ..	32.320	719	12.79	3290
<i>P.O.J. 2714</i> ... ..	23.027	513	13.68	2526
<i>B.H. 10 (12)</i> ... ..	26.337	586	13.23	2710
<i>P.O.J. 2725</i> ... ..	29.626	659	14.52	3305

(1) Sugar Cane Variety Report, Season of 1935. La. Bull. 274, p. 17, 1936.

(2) See the writer's "Sugar Over South Africa" in International Sugar Journal, XXXIX, London, Oct., 1937.

(3) One crop of first and second-year cane at each farm.

The figures show that *P.O.J. 105* leads all varieties in average annual production of both cane and sugar per feddan, averaging over 2 1/2 tons of cane and 172 kilogrammes of sugar more than its nearest competitor, *P.O.J. 36(M)*. There is little to choose between the cane and sugar yields of *P.O.J. 36(M)*, and *36* and *Co. 281*. The other six varieties have shown inferior yields and little likelihood of offering serious competition to *P.O.J. 105* in Egypt. *P.O.J. 234* and *P.O.J. 2725* have maintained by far the best sucrose content and *H. 109* definitely the poorest, all other varieties being very closely grouped.

#### SELECT *P.O.J.* VARIETY TRIALS AT MATAANA.

Early in 1935 it was decided to try out the four highest yielding *P.O.J.* varieties - *36, 36 (M), 979* and, of course, *105* on the irregular (chemically and physically) over-compact clay soil of the rather unproductive *Kharaga* section of the Mataana Farm. As in the case of the monthly planting experiments which were planted out at the same time in this section, it was realized that the extreme irregularity of this type of soil would probably result in such a large experimental error as to render the results difficult of intelligible statistical interpretation, but it was felt that information was needed as to the general behavior of these hardy varieties on some types of soil inferior to the very good ones on which our varietal trials had hitherto been conducted and fairly common in the sugar areas.

As with our other varietal trials, three randomized replications of each variety were employed and all details of preparation, planting, cultivation, irrigation, fertilization etc. were practically identical to those described for the February plantings (the varieties were sown on 25th February, 1936) of the monthly planting experiments in the *Kharaga* section described in the writers' aforementioned bulletin on Cane Planting Experiments (Chapter I). The preceding crop was (*fid*) beans.

Germination of all varieties was good, as was growth throughout the season, *P.O.J. 36* and *36 (M)* appearing to have slightly the best stand and *P.O.J. 979* the weakest. At the end of November the *P.O.J. 36* and *36 (M)* appeared to be slightly taller on the whole than *P.O.J. 105*, while *P.O.J. 979* seemed to have slightly less height than the control variety. The height range was from about 3.2 to 3.7 metres.

Harvesting was carried out on 4th March, 1937, each replication being out and ground separately at the Ermant *Sucrerie* under the direct supervision of Director Hugues Naus, whose useful cooperation

the writer must again gratefully acknowledge. The results of the first-year crop will be found in Table IV, along with the weighted averages for the four varieties from the five crops at Mataana and Mallawi.

TABLE IV.—*The Select Trials at Mataana*  
First-Year Cane

Variety	Kgs. Cane Per Plot ( )	Cane per Feddan		Richesse	Kgs. Sugar per Feddan
		Metric Tons	Quntars		
I.—FIRST YEAR CANE HARVESTED 4TH MARCH, 1937					
P.O.J. 105	6990	—	—	14.78	—
"	8390	—	—	13.93	—
"	8220	—	—	13.98	—
P.O.J. 105 Ave.	7867	47.200	1051	14.23	5381
P.O.J. 36 (M)	8487	—	—	14.82	—
"	7760	—	—	14.39	—
"	8530	—	—	14.09	—
P.O.J. 36 (M) Ave.	8259	49.554	1103	14.43	5699
P.O.J. 36	7900	—	—	14.79	—
"	9510	—	—	14.06	—
"	8290	—	—	14.62	—
P.O.J. 36 Ave.	8567	51.400	1141	14.49	5962
P.O.J. 979	5250	—	—	15.22	—
"	8120	—	—	12.77	—
"	7860	—	—	14.41	—
P.O.J. 979 Ave.	7177	31.060	959	14.13	4866
II. —WEIGHTED AVERAGES FOR THE FIVE CROPS AT MATAANA AND MALLAWI					
P.O.J. 105	—	48.116	1071	13.49	5151
" 36 (M)	—	46.482	1035	13.65	5077
" 36	—	45.025	1002	13.99	5044
" 979	—	41.645	927	14.73	4553

(1) 4 quntars (10 Acre).

As expected, the soil irregularity has resulted in too great a variation in the yields of the individual replications of all varieties to make the average differences in tonnage between the varieties of statistical significance, but the results on the whole indicate that, under the irregular soil conditions of this experiment, both *P.O.J. 36* and its mutant are quite capable of competing economically with our standard *P.O.J. 105* as first-year cane at least. The extremely wide variations of *P.O.J. 979* in the individual replications are quite in accord with the normal behavior of this variety under field conditions. Mr. R. Roche, the capable Director of the Nag-Hamadi sucrerie many years ago recognized the excellent juice qualities of this variety and its satisfactory tonnages on the best soils and for several years developed fairly large acreages of it. Its extreme susceptibility to any unfavorable conditions, however, soon made itself manifest as plantings of *P.O.J. 979* were extended to other than the very highest quality soils and its growth is now being discontinued at Nag-Hamadi. In previous experiments on superior soil types at both Mataana and Mallawi it has always proved definitely inferior as a cane and sugar producer to the other three varieties in the present trials, as shown by its low standing in the second section of Table IV.

This section, too, affords us an excellent opportunity to compare these varieties as general purpose canes, as the averages represent a rather wide range of conditions and point to the general superiority of the time-tested *P.O.J. 105*. It will be noted in both sections of the table that the extreme difference in sucrose content between the varieties is of a magnitude of but 1.2 point and, therefore, of no statistical significance whatsoever. Due to the timely discontinuance of irrigation seven weeks before the 1937 crop at Mataana, all varieties showed excellent *richesse*, even in a season when frost caused a rather general lowering of the sucrose content.

## CONCLUSIONS.

Experience over the past five years indicates that, of the nine imported varieties for which we have sufficient data to enable definite conclusions to be drawn, only *P.O.J. 36 (M)* and *36* and *2M* have approached the leading *P.O.J. 105* to a degree warranting further trials. All the other varieties herein considered have proved definitely inferior as cane and sugar producers under Egyptian conditions to *P.O.J. 105*.

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT

---

Technical and Scientific Service

---

BULLETIN No. 210

---

MANURIAL REQUIREMENTS OF  
SUGAR-CANE IN EGYPT

IV.—Further Phosphate Experiments

BY

Arthur H. Rosenfeld

*Government Sugar-Cane Technologist*

(Recommended for Publication by the Publications Committee of the  
Ministry of Agriculture, which is not, as a body, responsible for  
(the opinions expressed in this Bulletin)

Govt. Press 7230-1237-1065 os.

Govt. Press, Bulâq, Cairo, 1939.

Government Publications are on sale at the "Sale  
Room," Ministry of Finance. Correspondence  
relating to these publications should be addressed  
to the "Publications Office," Government Press,  
Bulâq, Cairo.

Price - - - - - P. T. 4

## CONTENTS

	Page
Introductory Review . . . . .	1
Experiments at Kom-Ombo . . . . .	1
Third-year Cane Results (Table I) . . . . .	5
Three-year Average „ ( „ II) . . . . .	4
Experiments at Mallawi . . . . .	6
Preparation, Cultivation and Irrigation . . . . .	6
First-year Cane Results (Table III) . . . . .	8
Second-year „ „ ( „ IV) . . . . .	9
Rate of Nitrogen Studies (Table V) . . . . .	12
Comparison with Earlier Studies (Table VI) . . . . .	13
A New Series of Experiments . . . . .	14
Detailed Crop Figures (Table VII) . . . . .	15
The Effects of Late Flooding (Table VIII) . . . . .	16
Three-year Average Results ( „ IX) . . . . .	17
Rate of Nitrogen Results ( „ X) . . . . .	18
Summary . . . . .	19
Bibliography . . . . .	21

## Graphs

No. 1.—Nitrate of Lime and Phosphates . . . . .	Frontispiece
„ 2.— „ Soda „ „ . . . . .	Opposite page

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT

MANURIAL REQUIREMENTS OF SUGAR-CANE  
IN EGYPT

IV.—Some Further Phosphate Experiments

In a previous publication (30)\* it was pointed out that there is little experimental evidence anywhere to substantiate the very widespread idea that the employment of abundant phosphatic manures will inevitably result in richer sugar-cane irrespective of the  $P_2O_5$  content of the soil, although many investigators in Hawaii (23, 24, 25 and 35), the Philippine Islands (22), Puerto Rico (13), the West Indies (34), etc., have demonstrated satisfactory response to this element in soils where its deficiency constituted it the limiting factor in the plant food balance.

The present writer, during a great many years of studies along this line in subtropical countries, has seldom obtained a *commercial* response from applications of phosphates to cane soils of a sedimentary type similar to those of Upper Egypt, long series of experiments in Argentina (28) and Louisiana (29) having given uniformly negative results.

EXPERIMENTS AT KOM-OMBO

In Technical Bulletin 173 of this Ministry consideration was given to two years' results from four identical experiments (of six replications each) on as many *nizarehs* and soil types of the large Kom-Ombo estates. Each experiment was two feddans in area (the size of each replicated plot being 4 qirats, or  $\frac{1}{3}$ th acre), one of which received 200 kilograms of  $16\frac{1}{2}$  per cent calcium superphosphate in addition to its normal supply of nitrogenous manure (Nitro-Sulphate of Ammonia). Soil types, representing a rather complete

---

\* Numbers in parentheses refer to Bibliography at back.



range from the poorest to the most fertile of the region, were selected by Waqil S. Mezrahi, for whose hearty cooperation in every phase of the experiments the writer is much indebted.\* at Kom-Ombo Bahari, Abbassieh, Raghama Shark and Sabah Gebli.

At *Sabah Gebli* and *Kom-Ombo Bahari* the soils chosen are very fertile and homogenous silt loams, the former being decidedly superior in respect of homogeneity. At *Raghama Shark* the soil is a homogenous clay loam, while the *Abbassieh* experiments were located on an irregular (chemically and physically), over-compact clay soil of below average fertility for Kom-Ombo.

The results from all but the *Sabah Gebli* experiment, where there was a distinct colour reaction in the young cane, were uniformly negative, while at the latter *nizareh* (the most fertile soil type) the phosphate plots, as both 1st year (when they produced the record average yield of 1,550 qantars of cane per feddan) and 2nd year cane showed a consistent and highly significant increase over the controls of above 120 qantars (5½ tons) per feddan.

In none of the experiments was any indication of the supposed ripening effect of phosphoric acid shown by the juice analyses—in fact the trend, though not statistically significant, was rather consistently toward a slight depression of the sucrose content and purity.

The conclusion was reached that, while most of the Upper Egyptian cane soils show no need of additional phosphoric acid, the highly fertile type represented in the *Sabah Gebli* trial may be expected to yield a most satisfactory return on a small investment in such manures.

*The Third-Year Cane.*—Cultivation, irrigation, etc., in all experiments were timely and according to the usual highly efficient Kom-Ombo routine. Harvesting and control methods were identical to those described for the earlier crops of these experiments in Technical Bulletin 173,† the detailed third-year cane results being found in Table I, and the average results for the three crops at each *nizareh* in Table II.

\* The writer wishes, also, to again express his appreciation of the interest and helpfulness of Director General René Cattauil Bey and Mr. S. Zagloun of the Kom-Ombo Company and of Directr Fawre of the Sucrerie at Kom-Ombo, who supervised the grinding and analyses of the cane from each replication.

† Page 8.

TABLE I.—SUPERPHOSPHATE EXPERIMENTS AT KOM-OMBO  
THIRD-YEAR CANE.

Treatment	Cane per feddan		Chemical Analyses	
	Qantars	Metric Tons	Richesse (Sucrose in Cane)	Purity

I.—*Kom-Ombo Bahari*.—Harvested III-8 and 9-36

Nitrogen only ...	1,088.78	48,912	12.74	83.1
N. and Phosphate ...	1,132.46	50,874	12.73	83.2

II.—*Abbassieh*.—Harvested II-8 and 9-36

N ...	927.31	41,658	12.76	82.8
NP ...	1,031.27	46,329	12.66	81.9

III.—*Raghama Shark*.—Harvested II-2 and 3-36

N ...	927.31	41,658	13.06	83.4
NP ...	920.37	41,346	12.43	81.9

IV.—*\*Sabah Gebli*.—Harvested I-4 and 5-36

N ...	1,153.97	51,841	11.71	80.5
NP ...	1,266.14	56,880	11.35	80.2

\*QANTARS CANE PRODUCED BY EACH REPLICATED PLOT AS  
3RD-YEAR CANE

Plots	2 and 1	4 and 3	6 and 5	8 and 7	10 and 9	12 and 11
N ...	189.71	203.53	183.11	190.82	180.49	205.31
NP ...	198.20	191.27	213.71	219.91	222.76	220.29
Inc. for Add. Phcs.	8.49	—12.26	30.60	29.09	42.27	13.98

TABLE II.—SUPERPHOSPHATE EXPERIMENTS AT KOM-OMBO.—AVERAGES FOR THE 3 CROPS.

Treatment	Cane per Feddan		Chemical Analyses	
	Qantars	Metric Tons	Richesse (Sucrose% Cane)	Purity
I.—Kom-Ombo Bahari.				
Nitrogen only ...	1,170.52	52,584	12.79	82.2
Nit. + Phosphate ...	1,183.03	53,146	12.79	82.2

II.—Abbassieh.

N ... ..	1,058.41	47,548	12.94	82.8
NP ... ..	1,114.52	50,068	12.65	82.1

III.—Raghama Shark.

N ... ..	1,028.37	46,198	13.58	83.5
NP ... ..	1,022.77	45,947	13.28	82.6

IV.—Sabah Gebli.\*

N ... ..	1,246.54	55,999	12.02	80.3
NP ... ..	1,364.27	61,288	11.56	79.3

\* QANTARS CANE PRODUCED BY EACH REPLICATED PLAT ANNUALLY.

Plats	2 and 1	4 and 3	6 and 5	8 and 7	10 and 9	12 and 11
N ... ..	204.20	213.77	203.32	210.26	197.93	217.07
NP ... ..	218.82	216.61	231.87	229.49	236.30	231.37
Inc. for Add. Phos.	14.62	2.84	28.35	19.23	38.37	14.30

Considering first Table I, we find that the third-year cane at Kom-Ombo Bahari shows a gain of under two tons of cane per acre for the phosphate plats, although no effect of phosphates was noted in this *nizarch* in the previous two years, while at Abbassieh the phosphate plats showed the highly significant increase of over 4½ tons of cane per feddan over the Nitrogen-only plats. At Raghama Shark the tonnages from the two series of plats are again slightly, but not significantly, in favour of Nitrogen only and at Sabah Gebli we obtain just about the same highly significant increase in yield from the addition of superphosphate as was obtained in the first and second year cane, around five tons of cane per acre more than the splendid yield (of more than 1,150 qantars) of the cane receiving no phosphates. An examination of the detailed replication yields in the latter *nizarch* reveals that, with but one exception, each pair of plats shows a consistent tonnage gain from the phosphate applications.

As regards the sucrose content of the cane with or without phosphate applications, it is notable that the third-year cane receiving superphosphate again shows slightly lower *richesse* in each of the four experiments, while in Table II it will be seen that, averaging the quality figures for each *nizarch* for the three years, in no case has either sucrose or purity been higher in the phosphate than in the Nitrogen-only plats. It is necessary to consider again the tonnage figures in Table I, which shows that in three of the four *nizarchs* the third-year cane has apparently responded to phosphate applications, although as first and second year cane the only statistically significant response obtained was in the Sabah Gebli experiment. This, however, instead of being contradictory, would appear to be quite a logical development in cane growing several years after the legume planting in the rotation. It is a recognized fact that legumes exercise a beneficial effect on the availability of existing soil phosphates and in previous papers the writer (28-30) has emphasized that the deep-rooted legumes not only add atmospheric nitrogen to the soil supply, but also effectively pump up phosphoric acid from the lower soil levels.\* By the time we have reached third-year cane, the effects of the legume rotation will have been largely dissipated and it seems that by that time the cane can utilize slightly more phosphates than remain available in the soil.

Hence, the inference to be drawn from the third-year results may well be that, where cane is kept to this age, it might respond commercially to two sacks of superphosphate per feddan, applied as early in the season as possible. At the same time reference to

\* Vide, also, Philip L. Gile's "The Effect of Different Colloidal Soil Materials on the Efficiency of Superphosphate," U.S. Dept. Agr. Tech. Bull. 371, 1933.

Table VII in Technical Bulletin 173 and to Table II herein indicates that it would not have been a paying proposition except, on the Sabah Gebli soil type, to apply phosphates during the first two years. Third-year cane seldom occupies as much as 10 per cent of the cane area.

#### EXPERIMENTS AT MALLAWI

In early 1935, it was decided to combine the rate of nitrogen experiments on the Mallawi farm (32) with phosphate trials in order to ascertain if the reaction of the plant to phosphates might be different in the presence of varying supplies of nitrogen. To this end a randomized replicated experiment was planned to study the effect of applying 2, 3 and 4 sacks of nitrate of lime (15½ per cent nitrogen) per feddan both alone and in combination with uniform applications of two 100-kilogramme bags of calcium superphosphate (16½ per cent  $P_2O_5$ ). Each plat was exactly four kirats ( $\frac{1}{4}$ th acre) in area and was replicated four times, the total area of the experiment being, therefore, just four feddans. The land selected for the experiment is a fairly light loam of apparently quite uniform texture.

*Preparation, Cultivation and Irrigation.*—The field was ploughed and reploughed the middle and end, respectively, of January, 1935, levelled on February 8, divided into *bods* on the 10th, and furrowed at 9 ridges per 2 qassabs on February 14, then laid out in plats according to plan in the immediately following days. The superphosphate was applied to the indicated plats the day before "wet" planting the *P.O.J. 195 tagari* on March 16, 1935.

22 irrigations were given to the plant cane, the first on March 21, 1935, and the last not until February 18, 1936—after the *gafaf*—which was less than four weeks before the experiment was harvested on March 14. Only three fassings were necessary, at the end of April and the middle and end of May, the middles being lightly ploughed in mid-June, to complete the actual cultivation. The nitrate of lime was applied to the respective replications in three equal doses on May 19, June 23, and July 3—a timely distribution. Observations throughout the growing seasons of both plant cane and ratoons showed no consistent difference in appearance of the cane receiving the varied treatments.

As ratoons all plats were irrigated the first day of May, 1936, and fassing and opening of the ridges carried out on the 19th of that month, the indicated replications receiving superphosphate at the rate of 200 kilogrammes per feddan a few days thereafter, when the

second watering was given. Fourteen additional irrigations were supplied, making a total of sixteen, the final one being on November 20, 1936, i.e. no water was applied after the *gafaf*, crop being carried out the middle of February 1937.

The second-year cane ridges were ploughed and opened at the beginning of the second week of June 1936, and one third of the total indicated nitrosulphate application given to the proper plats. The second nitrogenous "dose" was supplied a fortnight later and the final one on July 4, 1936. No fassing was necessary, the stand of the second-year cane being excellent.

The detailed results of the two crops, as well as the annual averages for each treatment, are set forth in Tables III & IV, and the monetary values are charted in Graph I.

**TABLE III.—MALAWI RATE OF NITROGEN AND PHOSPHATE EXPERIMENTS  
DETAILED RESULTS.**

*First-Year Cane.—Harvested March 15-17, 1936.*

Nitrate Sacks per Feddan	Plats		Cane per Feddan		Chemical Analyses			Kgs. Sugar per Acre
	No.	Kgs. Cane	Metric Tons	Quintars	Richness (Suc. % Cane)	Purity	Gluc. Coef.	
A.—Nitrogen only								
2	A- 1	8,140	—	—	11.85	78.2	8.4	—
2	12	8,290	—	—	13.50	84.5	5.4	—
2	15	8,490	—	—	11.55	81.1	8.2	—
2	22	8,490	—	—	12.72	81.4	7.3	—
2 (31 kgs. N.) Average...		8,338	50.025	1,114	12.41	81.3	7.3	4,952
3	B- 4	7,830	—	—	12.59	81.6	6.8	—
3	7	8,650	—	—	11.23	78.4	8.8	—
3	18	8,060	—	—	13.70	83.4	5.4	—
3	21	8,820	—	—	12.25	80.7	7.7	—
3 (47 kgs. N.) Average...		8,340	50.040	1,114	12.44	81.0	7.2	5,004
4	C- 2	8,520	—	—	10.75	75.1	9.3	—
4	10	8,290	—	—	12.52	82.2	5.8	—
4	13	9,450	—	—	11.49	77.7	8.0	—
4	23	8,320	—	—	13.24	84.2	5.5	—
4 (62 kgs. N.) Average...		8,645	51.870	1,155	12.00	79.8	7.2	4,979
N. Average ... ..		8,441	50.645	1,127	12.78	80.7	7.2	4,978

**B.—Nitrogen plus 200 kgs. Superphosphate per Feddan**

2	D-5	7,710	—	—	13.01	81.9	5.9	—
2	8	8,540	—	—	11.23	78.4	8.8	—
2	16	8,360	—	—	12.55	81.9	6.1	—
2	19	8,490	—	—	9.84	73.5	13.1	—
2 (31 kgs. N.) Average...		8,275	49.650	1,105	11.66	78.9	8.5	4,617
3	E-3	8,340	—	—	11.95	81.3	6.4	—
3	11	8,140	—	—	11.59	78.3	7.3	—
3	14	8,840	—	—	11.90	79.4	6.6	—
3	24	8,260	—	—	13.52	83.4	6.5	—
3 (47 kgs. N.) Average...		8,395	50.370	1,121	12.24	80.6	6.7	4,936
4	F-6	7,230	—	—	12.07	79.3	7.9	—
4	9	9,040	—	—	13.09	87.9	4.4	—
4	17	8,540	—	—	11.28	76.1	9.0	—
4	20	9,210	—	—	10.79	75.8	10.6	—
4 (62 kgs. N.) Average...		8,505	51.030	1,136	11.81	79.8	8.0	4,797
N.P. Average ... ..		8,392	50.350	1,121	11.90	79.8	7.7	4,783

**TABLE IV.—MALAWI RATE OF NITROGEN AND PHOSPHATE EXPERIMENTS  
SECOND-YEAR CANE CROP AND TWO-YEAR AVERAGES**

Calc. Nitrate Sacks per Feddan	Cane per Feddan		Chemical Analyses			Kgs. Sugar per Acre
	Met. Tons	Quintars	Richness (Sucrose % Cane)	Purity	Glucose Coef.	

*Second-Year Cane.—Harvested February 14-16, 1937.*

**A.—Nitrogen only**

2 (31 Kgs. Nitr.)...	40.950	912	11.31	81.2	8.2	3,686
3 (47 " )...	42.990	926	11.36	81.8	8.2	3,909
4 (62 " )...	46.905	1,044	11.17	80.8	8.6	4,175
Nitrogen Only Average ... ..	43.605	971	11.28	81.3	8.2	3,923

**B.—Nitrogen plus 200 kgs. Superphosphate per Feddan**

2 (31 Kgs. Nitr.)...	43.485	968	10.88	80.0	8.3	3,783
3 (47 " )...	45.135	1,005	11.22	81.1	8.5	4,062
4 (62 " )...	45.870	1,021	10.71	79.4	10.2	3,945
N.P. Average ... ..	44.830	998	10.94	80.2	9.0	3,930*

**Weighted Averages for the Two Crops:**

**A.—Nitrogen Only.**

2 (31 Kgs. Nitr.)...	45.488	1,013	11.86	81.3	7.8	4,319
3 (47 " )...	46.500	1,035	11.90	81.4	7.7	4,457
4 (62 " )...	49.888	1,099	11.59	80.3	7.9	4,577
Nitrogen only Average ... ..	47.126	1,049	11.78	81.0	7.8	4,451

**B.—Nitrogen plus 200 kgs. Superphosphate per Feddan.**

2 (31 Kgs. Nitr.)...	46.568	1,037	11.27	79.5	8.4	4,200
3 (47 " )...	47.753	1,063	11.73	80.9	7.6	4,499
4 (62 " )...	48.450	1,078	11.26	79.6	9.1	4,371
N.P. Average ... ..	47.590	1,059	11.42	80.0	8.4	4,357

\* Weighted.

Considering the first-year cane results in Table III, we find no statistically significant differences whatsoever in either quantity or quality between the plats with or without phosphates at any of the nitrogen ranges or between the plats receiving various quantities of nitrogen, *irrespective of whether they received phosphates or not*. Averaging all the nitrogen-only plats, we find that they have produced the insignificant quantity of six qantars more cane per feddan than have the averaged N.P. plats, hence we may conclude that the results of phosphate applications to the first-year cane has been negative. The first section of Graph I shows clearly that in each nitrogen range the application of phosphates has resulted in a monetary loss slightly greater than the cost of the two sacks of superphosphate per feddan. These results in the Mallawi section are particularly interesting, as superphosphate is widely applied to cane in that region.

As regards the quality of the cane, a comparison of the *richesse* of the cane from plats receiving the different rates of nitrogen, with and without phosphates, reveals the fact that invariably the non-phosphate plats have produced slightly richer cane than those to which superphosphate was applied at the same nitrogen range. Although the spreads are hardly wide enough to merit statistical significance, the trend is remarkably consistent and tends to confirm our previous indications that, under the conditions of these experiments, phosphatic manuring has either no effect at all or a slightly negative one on the maturity and, hence, the sucrose content of the cane. The nitrogen-only plats have produced cane with an average *richesse* of 12.28 per cent against 11.90 per cent for the plats receiving superphosphate in addition to the nitrogen—by no means a statistically significant figure.

The trend of the purity and invert sugar ratios is very similar. In no case is the degree of purity of the N.P. cane superior to that of the nitrogen-only cane at the same range, the average for the cane *not* receiving phosphates being 80.7 per cent against 79.8 per cent for the N.P. cane—a difference of almost one full point—while the important glucose ratio averages just one-half point higher in the cane from the N.P. plats.

Taking the effect of these quality factors on factory recovery into consideration and calculating out the amount of sugar per acre produced by each series of plats, the last column in Table III shows that at all three ranges of nitrogen supply, without exception, the nitrogen-only plats have produced materially more sugar per feddan than the N.P. ones, the difference averaging two sacks of sugar per acre.

Examination of the second-year cane results shown in the first section of Table IV reveals the fact that there are again no statistically significant differences between the respective nitrogen-only and N.P. plats as regards either quantity or quality of the cane produced at the various nitrogen ranges, although the trend to lower quality where phosphates have been supplied is even more consistent than in the plant cane, the nitrogen-only cane averaging 11.28 per cent *richesse*, 81.3 per cent purity and invert sugar ratio of 8.3 per cent against 10.94 per cent, 80.2 per cent and 9 per cent respectively. All analyses, it will be noted, are inferior to those of the first-year cane, due to freezes in January, 1937. The outturn of sugar per acre is practically identical for nitrogen-only and N.P. plats, and about 25 per cent lower than in the previous crop.

As regards the response to increasing quantities of nitrogen, however, the results obtained in both nitrogen-only and N.P. plats are quite different from those of the first-year crop and confirm our previous conclusions that older cane, or that farther removed from the "free" nitrogen of a legume in the rotation, responds to increasingly larger applications of nitrogenous manures than does plant cane (29, 30 and 32). In both series there is a highly significant tonnage increase from two sacks of nitrate right up to four (62 kilogrammes N. per feddan). This phase of the trials can best be studied in Table V, in which the phosphate applications are ignored (since they have produced no significant effects) and the results are grouped into the three series receiving the different rates of nitrogenous fertilization.

As first-year cane there is a slight, but statistically and commercially insignificant, tonnage increase with each additional nitrogenous increment, the first producing slightly the largest amount of sugar per acre. As second-year cane, however, each additional increment has produced a very consistent and highly significant increase of the order of about two tons of cane per feddan, although, if the quantity of sugar per acre is considered, the optimum was probably reached with the three sacks roughly corresponding to the 50 kilogrammes of nitrogen already indicated by previous experimentation as the optimum for second-year cane on the better soils of the Minya region. Section C of the table shows that over the two years there has been a consistent annual increase in tonnage, but on a smaller and less remunerative order, with each additional sack of nitrate of calcium, but that, from the standpoint of sugar per acre, the same average production per annum was obtained from 47 kilogrammes of nitrogen per feddan as from 62 kilogrammes. The average figures are given here simply to demonstrate that we should not

attempt to establish an optimum nitrogenous application for cane of all ages, and that, by applying the established optima for plant and ratoons separately, percentage returns from the heavier applications to the latter are very largely increased.

TABLE V.—MALLAWI RATE OF NITROGEN AND PHOSPHATE EXPERIMENTS  
Average Yields for Various Nitrogen Applications, Disregarding Phosphates

Lime Nitrate Sacks per Feddan	Cane per Feddan		Chemical Analyses			Kgs. Sugar per Acre*
	Met. Tons	Qantars	Richesse	Purity	Gluc. Coef.	

A.—First-year Cane, 1936.

2 (31 Kgs. Nitr.)...	49.838	1,109	12.04	80.7	7.9	4,785
3 (47 " " )...	50.205	1,118	12.34	80.8	7.0	4,970
4 (62 " " )...	51.450	1,145	11.91	79.8	7.0	4,888

B.—Second-year Cane, 1937.

2 (31 Kgs. Nitr.)...	42.218	940	11.10	80.6	8.3	3,735
3 (47 " " )...	44.048	981	11.29	81.5	8.4	3,986
4 (62 " " )...	46.388	1,033	10.94	80.1	9.4	4,060

C.—Average for the Two Crops

2 (31 Kgs. Nitr.)...	46.028	1,025	11.57	80.4	8.1	4,260
3 (47 " " )...	47.126	1,049	11.82	81.1	7.7	4,478
4 (62 " " )...	48.919	1,089	11.42	80.0	8.5	4,474

In the same spirit should be considered the weighted average figures for the plant and ratoon crops in the final section of Table IV, which merely emphasize the already stressed lack of statistically significant average differences between corresponding nitrogen-only and N.P. plats yields of cane and the substantially inferior average quality of the cane receiving phosphates, which has averaged but 11.42 per cent sucrose in cane, 80 per cent purity and an invert sugar ratio of 8.4 per cent, as compared with 11.78 per cent, 81 per cent and 7.8 per cent respectively. On account of this quality inferiority, the N.P. plats have produced an annual average of one sack of sugar per acre less than the nitrogen-only plats.

\* Weighted.

The results of these trials strikingly confirm those of previous rate of nitrogen trials at Mallawi and particularly, of the mixed manures experiment made on the Government Farm there several years ago in cooperation with the Chilean Nitrate Agencies (30). Inasmuch as the nitrates of lime and soda have about the same nitrogen content (cerca 15½ per cent), a review of the average results obtained from these sodium nitrate applications, with and without superphosphate, to first- and second-year cane, is of decided interest. Furthermore, inasmuch as we had no unfertilized control plats in the experiments just described, these of the control plats in the nitrate of soda experiment—on the same soil—afford us a reliable basis for calculating the financial benefits from our basic nitrate of lime applications. The nine replications of the unmanured controls in the nitrate of soda experiment, as shown in Table VI and Graph II, gave an annual average yield for first- and second-year cane of just 684 qantars of cane per feddan and it will be seen that there was an economic response to nitrate applications up to two sacks, but no further, a very similar result to that shown in Graph I of the nitrate of lime experiments in comparable ranges, i.e. up to three sacks, or 47 kgs. of nitrogen per feddan.

If the average annual yield of 1,024 qantars per acre from the two sacks of nitrate of soda be compared with the almost identical figure of 1,025 qantars from the corresponding quantity of nitrate of lime, as shown in the final section (C) of Table V, we are quite justified in assuming that our first two sacks of lime nitrate have resulted in increasing the tonnage yield by at least 342 qantars—or over 15 tons—of cane per feddan. On the same analogy, taking Table VI as a basis, 1½ sacks of nitrate of lime should have given us the same increase over the controls as did that quantity of nitrate of soda, or just over 200 qantars of cane per acre (9 tons).

TABLE VI.—MALLAWI NITRATE OF SODA EXPERIMENTS  
Average Results for First and Second-year Cane

Sacks Nitrate per Feddan	Qantars Cane per Feddan*	
	Treatment Yield	Incremental Increase
Control (No Manure) ... ..	684	—
1 ½ (23 Kgs. Nitrogen) ... ..	886	202
1 ½ (23 " " ) + 2 Sacks superphosphate ...	924	38
2 (31 " " ) ... ..	1,024	138
2 ½ (39 " " ) ... ..	1,029	5
3 (47 " " ) ... ..	1,051	22

\* Averages of nine replications of 1/42nd feddan each. Experiments in cooperation with Chilean Nitrate Agencies.

Compare with this large and statistically significant increase that of 38 qantars of cane from the addition of 2 sacks of superphosphate to the  $1\frac{1}{2}$  sacks of sodium nitrate and the incremental increase of 138 qantars obtained from using an additional one-half sack of nitrate of lime (worth P.T. 35) instead of the two sacks of superphosphate (worth P.T. 60). The monetary return from the two manurial investments is clearly brought out in Graph II. Also, from the standpoint of return on the investment in nitrogenous manures alone, compare the increase in cane yield of 343 qantars obtained from the first two sacks of nitrate of lime with the incremental gain of but 64 qantars of cane per feddan from the second two sacks (Section C of Table V). It is evident here that the *percentage return* on the capital invested in the first two sacks is overwhelmingly greater than that from the additional two.

*A New Series of Experiments*, on the same soil type and with a duplicate layout to that just described, was initiated on the Mallawi farm early in 1937. All details of preparation, cultivation, fertilization, irrigation, etc., were practically identical to those already recorded for the first-year cane in the previous experiment, except for the fact that planting was carried out exactly three weeks earlier — on February 23 — and two irrigations less were given (20 instead of 22). Unfortunately, at the time of the final irrigation on December 8, 1937, the field was virtually flooded with the idea of providing sufficient moisture to carry the cane through the *gaja* period and up to crop, with the result that, as the cane was very heavy and evaporation was correspondingly reduced and, also, heavy rains fell on two occasions during the winter, the ground was still soaked at crop time and, although the harvest was purposely delayed until early April, the cane never ripened up properly, as may be seen by comparing the figures for the 1938 crop, given in Table VII, with those for the first-year cane harvest in 1936 as found in Table III.

TABLE VII.—SECOND SERIES OF RATE OF NITROGEN AND PHOSPHATE EXPERIMENTS  
DETAILED RESULTS  
*First-Year Cane.—Harvested April 14-16, 1938.*

Nitrate Sacks per Feddan	Plats		Cane per Feddan		Chemical Analyses			Kgs. Sugar per Acres
	No.	Kgs. Cane	Metric Tons	Qantars	Richesse (Suc. % Cane)	Purity	Gluc. Coef.	
A.—Nitrogen only								
2	A- 1	8,730			10.31	72.4	16.7	
2	12	8,100			12.29	77.3	11.4	
2	15	8,490			11.79	76.7	11.1	
2	22	8,100			12.54	81.3	6.6	
2 (31 kgs. N.) Average ...		8,355	50.130	1,116	11.73	76.9	11.5	4,111
3	B- 4	7,850			10.51	73.1	14.0	
3	7	8,720			10.68	71.0	15.4	
3	18	8,430			10.69	68.9	20.5	
3	21	9,240			11.04	75.6	12.0	
3 (47 kgs. N.) Average ...		8,560	51.360	1,143	10.73	72.2	15.5	3,184
4	C- 2	8,860			10.28	68.6	19.2	
4	10	6,900			11.51	73.0	14.3	
4	19	8,890			10.39	73.2	13.6	
4	23	8,100			11.00	72.7	11.9	
4 (62 kgs. N.) Average ...		8,188	49.125	1,094	10.80	71.9	14.8	3,045
Nitrogen only Average...		8,365	50.205	1,118	11.09	73.7	13.9	3,447
B.—Nitrogen plus 200 kgs. Superphosphate per Feddan								
2	D- 5	8,930			13.12	79.5	9.6	
2	8	8,410			10.66	72.6	13.2	
2	16	8,400			12.02	76.1	11.7	
2	19	8,470			11.28	76.4	12.1	
2 (31 kgs. N.) Average ...		8,553	51.315	1,142	11.77	76.2	11.7	4,105
3	E- 3	6,880			10.19	72.3	14.4	
3	11	8,510			13.05	79.5	8.9	
3	14	8,630			14.15	81.5	5.2	
3	24	8,730			9.30	62.8	23.6	
3 (47 kgs. N.) Average...		8,188	49.125	1,094	11.67	74.0	13.0	3,586
4	F- 6	8,440			11.52	76.0	13.2	
4	9	9,920			11.75	73.3	12.9	
4	11	8,600			11.77	78.3	10.5	
4	20	8,860			10.46	72.2	15.9	
4 (62 kgs. N.) Average ...		8,955	53.730	1,196	11.36	75.0	13.1	3,922
N.P. Average ... ..		8,565	51.390	1,144	11.60	75.1	12.6	3,871*

\* Weighted.

### EFFECT OF LATE FLOODING OF CANE

A study of these two tables will again serve to emphasize the economic fallacy of late and heavy applications of water to sugarcane in Egypt, as was pointed out in a previous publication (31), with the idea of increasing tonnage. As a matter of fact the average cane tonnages in the two crops are almost identical—50½ tons per acre in 1936 and 50¾ in 1938—but low sucrose content and purity, as a result of lack of opportunity to mature, have been the cause of the overwatered 1938 cane producing an average of over twelve sacks of sugar per feddan less than the 1936 crop of this experiment—but 3,659 kilogrammes of sugar per acre against the 1936 yield of 4,881 kilogrammes, a 25 per cent loss which can be chargeable only to the excessively heavy final irrigation.

The comparison is facilitated by the condensation of the average yields of the two comparable first-year crops in the following little Table VIII.

TABLE VIII.—EFFECT OF FLOODING SUGAR-CANE AT FINAL IRRIGATION  
AT MALLAWI.

### Comparison of Results of First-Year Crops in 1936 and 1938

Crop of	Final Irrigation	Cane per Feddan		Chemical Analysis			Kgs. Sugar Per Acre *
		Metric Tons	Qantars	Richness (Suc. % Cane)	Purity	Glucose Coef.	
1936 ...	Normal	50.498	1,124	12.09	80.3	7.5	4,881
1938 ...	Flooded	50.798	1,131	11.35	74.4	13.3	3,650
Loss through Flood-Induced Immaturity				74	5.9	5.8	1222=25%

Considering, now the detailed results from the 1938 crop set forth in Table VII, we find striking confirmation of those of the first series of experiments. Again there are no statistically significant differences whatsoever in either quantity or quality between the plats with or without phosphates at any of the nitrogen ranges, *irrespective of whether they received phosphates or not*. A glance at the figures for the individual replications shows that, in every case, there is a greater variation amongst the individual replications of any single treatment than there is between the average figures of the various treatments, this rendering the results absolutely insignificant statistically, except as confirming once again our previous indications

• Weighted.

that, under the conditions of these experiments, about thirty kilograms of nitrogen alone per feddan gives the optimum investment return on plant cane in the Minya region and that money spent on additional nitrogen or on phosphates is largely wasted.

In both the nitrogen-only and N.P. series, the cane receiving two sacks of nitrate shows materially better *richesse*, purity, invert sugar ratio and production of sugar per feddan than the plats receiving more nitrogen, again giving evidence to confirm the results of our previous experiments.

In Table IX will be found the weighted average annual results from the three crops in this series—two of plant cane and one of ratoons. Like the averages for the first two crops, shown in the final section of Table IV, they merely serve to emphasize the already stressed lack of statistically significant average differences between corresponding nitrogen-only and N.P. plot yields of cane and the slightly—but not statistically significant—inferior average quality of the cane receiving phosphates. The average production of sugar per acre is almost identical in the series with and without superphosphate.

TABLE IX.—MALLAWI RATE OF NITROGEN AND PHOSPHATE EXPERIMENTS  
*Weighted Average Annual Results for the 3 Crops.*

Calcium Nitrate Sacks per Feddan	Cane per Feddan		Chemical Analyses			Ks. Sugar per Acre
	Metric Tons	Qantars	Richesse (Suc. % Cane)	Purity	Glucose Coef.	
2 (31 kgs. Nitr.) ...	47·035	1,047	11·82	79·8	9·0	4,250
3 (47 " " ) ...	48·120	1,071	11·51	78·3	10·2	4,032
4 (62 " " ) ...	49·300	1,097	11·32	77·5	10·2	4,067
Nitrogen-only Ave- rage ... ..	48·152	1,072	11·55	78·5	9·8	4,116
<i>B.—Nitrogen plus 200 kgs. Superphosphate per Acre</i>						
2 (31 kgs. Nitr.) ...	48·150	1,072	11·44	78·4	9·5	4,168
3 (47 " " ) ...	48·210	1,073	11·71	78·6	9·4	4,193
4 (62 " " ) ...	50·210	1,118	11·29	78·1	10·4	4,221
N.P. Average ...	48·857	1,088	11·48	78·4	9·8	4,193



In Table X we have again calculated out the first-year (1938) and average results on the basis of a rate of nitrogen study, disregarding the phosphate applications, since they have never produced any significant effects. Neither the first-year results nor the three-year averages show any statistically significant differences between the quantity and quality figures of the cane receiving varying ranges of nitrogen, although it should be noted once more, as confirmatory of previously noted trends, that in both sections of the table the cane receiving but two sacks of nitrate shows consistently better sucrose content, purity, invert sugar ratio and production of sugar per acre than the plots receiving heavier applications of nitrogen.

TABLE X.—MALLAWI RATE OF NITROGEN AND PHOSPHATE EXPERIMENTS

Average Yields for Various Nitrogen Ranges, Disregarding Phosphates

Lime Nitrate Sacks per Feddan	Cane per Feddan		Chemical Analyses			Kgs. Sugar per acre
	Metrie Tons	Qantars	Richesse (Suc. % Cane)	Purity	Glucose Coef.	
A.—First-Year Cane, 1938						
2 (31 kgs. Nitr.) ...	50·723	1,129	11·75	76·6	11·6	4,108
3 (47 „ „) ...	50·243	1,118	11·20	73·1	14·3	3,385
4 (62 „ „) ...	51·428	1,145	11·08	73·5	13·5	3,484
B.—Annual Average for the Three Crops.						
2 (31 kgs. Nitr.) ...	47·593	1,059	11·63	79·1	9·3	4,209
3 (47 „ „) ...	48·165	1,072	11·61	78·4	9·9	4,114
4 (62 „ „) ...	49·755	1,108	11·31	77·8	10·2	4,144

A third series of these experiments was laid down at Mallawi in February, 1938.

\* Weighted.

## SUMMARY

The present paper deals with the results from nitrogen and phosphate experiments with sugar-cane in four distinct *nizarehs* and as many soil types at Kom-Ombo and from two series of rate of nitrogen and phosphate trials at Mallawi.

At Kom-Ombo the experiments were of a simple type, using a fixed quantity of nitrogen in all replications and applying two sacks of superphosphate of calcium per feddan to one-half of them (each series was replicated six times in each of the four experiments and each experiment covered an area of just two feddans). Nitrosulphate of Ammonia (26 per cent Nit.) was the source of nitrogen employed at Kom-Ombo, while Nitrate of Lime (15 ½ per cent Nit.) was used in the Mallawi trials.

The latter experiments were of a more complicated nature, in order to study the effect of phosphates in the presence of varying supplies of nitrogen. In fact, the Mallawi experiments were designed as duplicate rate of nitrogen experiments, one series receiving two sacks of superphosphate per acre each year and the other series being left without phosphates. These large experiments were, of course, replicated and randomized. The results from the plant and ratoon crops of the experiments laid down in 1935 and of the first-year cane crop from an identical series planted in 1937 are included in this paper. They are of particular interest in view of the fact that superphosphate is widely applied to cane in Minya.

In three of the four third-year cane experiments at Kom-Ombo (Table I) there was apparently some statistically significant response to phosphate applications, although as first and second-year cane the only significant response was obtained consistently in the Sabah Gebli trials. This, however, instead of being contradictory, is in effect quite logical in view of the recognized beneficial rôle of legumes in the rotation in increasing the availability of existing soil phosphates and the time lapse between the legume and third-year cane. Hence the inference to be drawn from the third-year cane and the average results for the three crops (Table II) may well be that, where cane is retained as second ratoons (*khelfa tani*), it might be good insurance to apply two sacks of superphosphate as early in the season as possible to soils of all the types in the Kom-Ombo experiments. At the same time the results of previous years, as shown in Table VII of Technical Bulletin 173, demonstrate categorically that it would not have been a paying proposition, except on the Sabah Gebli soil type, to apply phosphates during the first two years. Since third-year cane seldom

occupies as much as ten per cent of the cane area, the cost of supplying phosphates at the proper time would be minimum, with the prospects of maximum commercial returns therefrom.

At Mallawi the results of the first-year crops in 1930 and 1938 (Tables III and VII) were identical in trend, showing no statistically significant differences whatsoever in either quantity or quality of cane from the plats with or without phosphates at any of the nitrogen ranges, or between the plats receiving various quantities of nitrogen, *irrespective of whether they were supplied with superphosphate or not.*

The second-year cane results shown in Table IV reveal the fact that there were again no statistically significant differences between the respective nitrogen-only and N.P. plats as regards either quantity or quality of the cane produced at the varying nitrogen ranges, although the trend to lower quality in the cane receiving phosphates was even more consistent than in the plant cane crops. As regards response to increasing quantities of nitrogen, however, the results obtained in both nitrogen only and N.P. plats confirm our previous conclusions, that older cane, or that further removed from the free nitrogen furnished by the legumes in the rotation, responds to increasing larger applications of nitrogenous manures than does first-year cane. In both series there was a highly significant tonnage increase from two sacks of lime nitrate right up to four (62 kgs. nitrogen per feddan). However, if the slightly inferior quality of the cane receiving phosphates is considered and the quantity of sugar produced per acre is calculated at each nitrogen range (Table V), it will be seen that the optimum was probably reached with the three bags of nitrate roughly corresponding to 50 kgs. of nitrogen per feddan.

These results strikingly confirm those obtained in earlier rate of nitrogen and phosphate experiments at Mallawi in which Nitrate of Soda was used as the nitrogen source material, as set forth in Table VI.

In none of the experiments at either Kom-Ombo or Mallawi has there been obtained any indication whatsoever of the supposed ripening effect of phosphoric acid on sugar-cane—in fact the trend, although never statistically significant, has always been rather consistently towards a *slight quality depression.*

Finally, the opportunity was afforded, through the late flooding of the 1937-1938 plant cane, to again study statistically the disastrous effects of excessively late or heavy applications of water to Egyptian canefields (Table VIII).

## BIBLIOGRAPHY


1. BARKE, E. J. R.—Fertilizer Trials on Fallowed and Non-Fallowed Land Queensland Bur. Sug. Expt. Stas., Annl. Rept. 1931.
2. BEAUCHAMPS, C. E.—Field Experiments in Variety and Fertilizer Studies. Proc. Conf. Anl. Assn. Tec. Azros. Cuba, Havana, 1932.
3. BOOBERG, G.—Gooit de suikerindustrie geld weg bij de toepassing van Kunstbemesting. Arch. v.d. Skrind. Ned. Ind., 1933, No. 15.
4. BORDEN, R. J.—Availability of Principal Soil Nutrients during Crop-Growth Period. Haw. Pltrs. Rec., XLI, 1, 1937.
5. COLEMAN, L. C.—Report of the Mysore Agr. Dept. for Year Ending 1931
6. CONNOR and ABBOTT.—Unproductive Black Soils. Ind. Agr. Expt. Sta. Bull. 157, 1912.
7. DASH, J. SYDNEY.—Report of Director of Agr. of British Guiana for 1936,
8. DENLEY, C. L.—Experimental Work in Godchaux Sugar Estates in Louisiana, 1928-1936. Mss.
9. DEVENTER, W. VAN.—De cultuur van het suikerriet. Amsterdam. 1914.
10. DICKINSON, W. E.—Action of Different Phosphatic Materials in Fertilizers Proc. Conf. Anl. Assn. Tec. Azros. Cuba, V, 1931.
11. DODDS, H. H.—Some Fertilizer Experiments. Proc. Anl. Cong. Sou. Af. Sug. Technols. Assn., IX, 1935.
12. ELLAPPA CHETTY, C.—Annual Report of the Jeevanray—Ankette Agr. Demonstration Plot. India. Dept. Agr., Mysore Rept., I and II, 1930. *Ibid* of Mysore Circle for 1929-1930.
13. FERNANDEZ GARCIA, R.—Informes Anuales de la Seccion de Quimica. Estn. Exptl. de P. Rico, Informes. Anles., 1924-1925 and 1927-1928.
14. GAMORRA, D. L.—Abonamiento para las Plantas Cultivadas. Bol. Cía. Adma. del Guano, XIII, 7, Lima, Peru, 1937.
15. GERBTS, J. M.—Med. v.h. Proefst. v.d. Java-skrind. Landbouwikund-Serie No. 5, Pasoeroean, 1920.
16. HARRISON and BOVELL.—Sugar Cane Manurial Tests. Sugar Cane, XIX, 509, 1937.

17. HURST and McKAY.—Effect of Fertilizer on Composition of Cane Juice. Sug. Bull., XI, 6, 1932-1933.
18. KALIS, K. P.—Some Soil and Fertilizer Problems (Trans. Tit.) Arch. Suikerind., XXXIX, Pt. I, p. 609. Pasoeroean, 1931.
19. Knapp, W. H. C.—The Best Fertilizer for Sugar Cane. La Revue Agricole Maurice, No. 74, p. 53, 1934.
20. KUTSUNAI, Y.—Notes on Interpretation of Experimental Results. Haw. Pltrs. Assoc., XXXV, p. 279, 1931.
21. LEDEBOER, F.—Java Archief, XX, 144, 1912.
22. LEE, H. ATHERTON.—Ann. Reports of the Director of Research. Proc. Anl. Conv. Sug. Assn. Philippines, 1928-1930. Fertilizer Constituent Tests. Sug. News, X, pp. 1 and 2, Manila, 1929.
23. McALLEP and BOMONTI.—Haw. Pltrs. Rec., XXVI, 136, 1922.
24. McGEORGE, W. T.—Absorption of Fertilizer Salts by Hawaiian Soils. Haw. Expt. Sta. Bull. 35. Study of Phosphates in Sugar Soils. H.S.P.A. Sta. Bul. 47, 1923.
25. MOIR, W. W. G.—Hawaiian Soils and Fertilizer Research. Cong. Intl. Soc. Sta. S. Cane Technol., IV, S. Juan, 1932.
26. OSHIMA, K.—Discussion on Fertilizer Practice in Formosa. *Ibid* III. Sourabaya, 1929.
27. PATERSON, D. D.—Experimentation and Applied Statistics for the Practical Agriculturist. Trop. Agr., X, p. 26. Trinidad, 1933.
28. ROSENFELD, ARTHUR H.—Ensayos Con Abonos. Rev. Ind. y Agr. Tucuman, II, 1911, and V, 1915. The Sugar Industry of Peru. Trop. Plant Resch. Found., Sci. Cont. 6. Wshgtn, 1926.
29. ROSENFELD, ARTHUR H.—Fertilizer Experiments in Louisiana. Proc. Intl. Soc. S. Cane Technol., IV, Bull. 95, S. Juan, 1932. Wasteful Sugar Cane Fertilization. I.S.J., XXXV, London, 1933.
30. ROSENFELD ARTHUR H.—Manurial Requirements of Sugar Cane in Egypt. I. Optimum Rate of Nitrogen Experiments. Min. of Agr. Tech. Bull. 169. Cairo, 1937. *Ibid*, II. The Kou-Ombo Phosphate Experiments. *Ibid*, 173, 1936.
31. ROSENFELD, ARTHUR H.—Sugar Cane Planting Experiments, 1933-1937. *Ibid*, 195. Cairo, 1938.

32. ROSENFELD, ARTHUR H.—Manurial Requirements of Sugar Cane in Egypt. III. Further Rate of Nitrogen Experiments. *Ibid*, No. 198, 1938.
33. ROUF.—Annales Agronomiques, V, 1879.
34. SAINT, S. J.—Manurial Experiments on Sugar Cane, 1928-1932. Agr. Jour. Barbados, Oct., 1932.
35. STUBBS, W. C.—Cultivation of Sugar Cane. N. Orlns., 1900.
36. VERRET, J. A.—Effect of Phosphoric Acid and Potash on Quality of Cane. Haw. Pltrs. Rec., XXVII, 1923.
37. WATTS, FRANCIS.—Manurial Experiments with Cane in the Leeward Islands. W. Ind. Impl. Dept. Agr. Pamphlet 30, 1906.
38. WILLIAMS and FOLLETT SMITH.—Fertilizer Experiments with Sugar Cane. Brit. Gna. Agr. Jour., V, 4, 1931. Field. *Ibid* B. G. Sug. Bull., Nos. 1 and 2, 1933.
39. WORSLEY, R. R. Le G.—Hydrogen-Ion Concentration of Egyptian Soils. Min. Agr. Tech. Bull. 83, 1929.
40. YATHIRAJA, A. R.—Sugar Cane in Bellary. Madras Agr. Jour., I, 139, 1931.

# MALLAM, RATE OF NITROGEN AND PHOSPHATE EXPERIMENTS

Effect of Phosphate at Varying Nitrogen Ranges on Monetary Value of Crop per Feddan



# NITRATE of SODA EXPERIMENTS at MALLANI

Effect of Increasing Nitrogen and Phosphate on Monetary Value of Crop per Feddan.


Average Results for 1<sup>st</sup>/2<sup>nd</sup> Year Cane

1 Quarter Sugar Cane = P.T. 3.5

100 Kgs. Nitrate of Soda = " 70.0

100 " Superphosphate = " 30.0

Shaded Space = Cost of Manure



MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT.

---

Technical and Scientific Service

(Botanical Section)

— BULLETIN No. 213 —

# MANURIAL REQUIREMENTS OF SUGAR CANE IN EGYPT

## V.—Time and Number of Nitrogenous Fertilizer Applications

BY

ARTHUR H. ROSENFELD

*Government Sugar Cane Technologist*

(Recommended for publication by the Publications Committee  
of the Ministry of Agriculture, which is not, as a body,  
responsible for the opinions expressed in this Bulletin).

Govt. Press, Bulâq, Cairo, 1939

Government Publications are on sale at the "Sale  
Room," Ministry of Finance. Correspondence  
relating to these publications should be addressed  
to the "Publications Office," Government Press,  
Bulâq, Cairo.

Price - - - - - P.T. 2

## Contents

---

	Page
Introductory ... ..	v
Some Early Research ... ..	1
Monthly Composition of Cane Plant (Table I) ... ..	2
Mineral Matter of Cane Leaf (Table II) ... ..	4
Varying Nitrogen Doses in Java (Table III) ... ..	5
Applied Practice in other Countries ... ..	5
Experiments in Egypt ... ..	8
The Matana Trials ... ..	8
First-Year Cane Results (Table IV) ... ..	10
Second-Year Cane Results (Table V) ... ..	11
The Mallawi Trials ... ..	12
Summarized Results (Table VI) ... ..	13
Conclusions ... ..	14
Bibliography ... ..	15

## INTRODUCTORY

Early applications of nitrogenous fertilizers are indicated by all experimental investigations of this important subject, cane fields supplied with readily available nitrogen making a rapid and vigorous growth and being less affected by droughts subsequent to their establishment. Nitrogen seems to be largely responsible for the rising of the sap in the young cane stalk. As the leaves in the early stages of growth do not appear to be able to elaborate this sap, the development of the underground buds of the rhizomes, known as suckering or tillering, is stimulated and it is desirable that this suckering, which results in a large number of stalks per stool, should occur as early as possible in the development of the crop in order that the entire stand of cane may be of approximately the same age and the chances of even ripening enhanced. Nitrogen, too, stimulates the development of the root system and the plant is thus given greater opportunity of utilizing the food in the soil and the limited supply of moisture which results from sustained droughts, while a readily available supply of this element leads to the abundant leaf development which is of such vital importance, in turn, to the growth of the stalks.

The custom of supplying readily available nitrogen in one or more doses is one that is largely governed by the length of the growing season and climatic conditions in general. In countries where cane grows for from sixteen to twenty-six months before being harvested, as in Hawaii and Peru, the practice in this regard will naturally be quite distinct from that employed in such subtropical countries as Egypt, Louisiana or Argentina, where, with actual growing seasons which range from but six to nine months, fertilizer applications must be made just as soon as possible after growth has started in the spring in order to avoid or reduce the depressing effect on the sucrose content of the cane juice which occurs when vegetative growth is maintained by a large available nitrogen supply too late into what should be the ripening period (24).\* In Hawaii, for example, every effort is made to avoid fertilizer applications within a year, or at least nine or ten months, of the projected harvest time of the canefields

---

\* Numbers in parentheses refer to bibliography at back of bulletin.



and, even with this long period elapsing between the last fertilizer application and the harvest, nitrogen applications must be so regulated that, although larger applications would result in considerably greater tonnage per acre, no more nitrogen must be applied than can be utilized by the crop before harvest without materially depressing the sucrose content and thus offsetting, in tons of cane required to be handled for the manufacture of a ton of sugar, the benefits of this increased tonnage.

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT.

## MANURIAL REQUIREMENTS OF SUGAR CANE IN EGYPT

### V.—TIME AND NUMBER OF NITROGENOUS FERTILIZER APPLICATIONS

#### Some Early Research

The classic investigations of Rouf (29) in Martinique as early as the first years of the final quarter of the last century indicate that the absorption of minerals commences as soon as the development of the cane allows and is evidently far more pronounced if the plant encounters them at its disposal immediately climatic conditions are favourable for growth. He concluded that fertilizers should be applied early, so as to place the necessary food at the disposal of the cane roots and thus accelerate the elaboration of sugar.

In carrying out his studies Rouf month by month harvested, weighed and analyzed a crop of cane, beginning when the cane was six months old and continuing the experiment until the cane had attained thirteen months growth. His results, calculated in pounds per acre, were as shown in Table I.

The progress of mineral absorption by the plant would appear to be moderated from the sixth to the tenth month, according to Rouf's conclusions from these studies, rising to the tenth and eleventh month, which seems to be the period of maximum absorption and, also, of the highest total weight of stalks and leaves under the conditions of this experiment. At this period the cane had absorbed all of the minerals and nitrogen and the dry matter was also at its maximum weight. By the tenth month this cane had absorbed the maximum quantities of both phosphoric and sulphuric acid, potash, soda and silica and at the eleventh month of lime, magnesia and nitrogen, those elements reaching their maximum at the tenth month already showing indications of elimination at the eleventh. The elimination of lime, magnesia and nitrogen was apparently initiated in the twelfth month.



TABLE I.—MONTHLY COMPOSITION OF THE WHOLE CANE PLANT.

Age of Cane	Green Weight	Dry Weight	Ash	Nitrogen	Phosphoric Acid	Sulphuric Acid	Potash	Soda	Lime	Magnesia	Silica
Six months ...	21,054	4,072	275	20.2	10.3	14.1	36.0	2.2	7.1	13.1	139.1
Seven months ...	44,608	7,366	360	35.5	15.2	14.8	44.4	8.6	23.8	15.5	163.1
Eight months ...	73,302	10,597	444	38.0	27.3	18.7	79.0	7.9	26.1	24.6	200.5
Nine months ...	76,682	12,100	504	44.9	27.7	20.0	79.7	9.7	28.4	25.7	245.3
Ten months ...	82,008	16,290	628	55.2	39.2	21.9	97.3	21.4	46.7	26.2	322.0
Eleven months ...	76,558	17,363	576	60.4	37.3	19.4	71.5	13.6	58.4	36.7	293.3
Twelve months ...	65,377	16,505	467	55.2	36.7	14.3	62.0	8.8	33.0	25.9	232.4
Thirteen months ...	79,150	17,756	468	39.8	29.0	17.3	62.6	7.0	33.0	27.5	210.5

Rouf considers that the elimination of the excess potash, soda and chlorides from the stalk and their transportation to the top and leaves terminate with the ripening of the cane, the alkaline chlorides, glucose, and albuminoid and pectic bodies being accumulated in the top. The return of plant food to the soil in the ripening process of the cane plant indicates the advisability of harvesting the crop at its stage of optimum maturity, not only because at that period the largest amount of sugar may be obtained per acre, but with the object of reducing the drain on the plant food in the soil. This is one of the unusual points brought out by Rouf's investigations.

Some thirty years after the above studies were initiated the late Sir Francis Watts (34) published the results of his investigations of the problem of one or two fertilizer applications to cane in the Leeward Islands. These indicated the desirability of but one early application and Watts' reasoning in arriving at this conclusion is so uniquely interesting that he is quoted rather fully below :—

"These results lead us to make the suggestion that manures applied to sugar canes will probably be found to be more efficient, both physiologically and pecuniarily, if given in quick acting forms at a very early stage of the cane's growth, and we are led to speculate if this may not be accounted for, on botanical grounds, by the structure and manner of growth of the cane. We have perhaps been too prone, when thinking of manuring crops, to have in our mind dicotyledenous branching trees, with many growing points, in stead of the sugar cane, with its one growing point, or 'top' to each stem. The cane having lost its habit of seeding may be regarded as a growing top and a stem. When the former has arrived at its full development it may be taken roughly to be a fixed quantity; old leaves fall away and are replaced by new ones, so that the top remains fairly constant. The stem constantly receives additions, and gradually ripens to form a dormant sugar house chiefly filled with sugar, doubtless originally destined to provide for the growth of flowers and the production of the seed, but now developed to a greater extent than the feebly fertile flowers demand.

"The elements of plant food, including nitrogen, potash and phosphate, are found in greater abundance in the 'top' and leaves than in the stem; hence it is reasonable to suppose that in the early development of the cane plant, with its system of top and stem, greater demand is made upon the plant food supply of the soil in order to build up this top rich in plant food than occurs later on when the top, a comparatively fixed quantity, has been

developed, and additions are being made to the stem, which additions demand relatively large amounts of carbohydrates, with comparatively small amounts of nitrogen, potash and phosphates. Transference of plant material from point to point takes place freely, and it is reasonable to suppose that the cells of the stem, as they pass into the dormant condition, may pass on some of their nitrogen, potash and phosphate to be used in building up newer structures. We are aware of this transference of plant food in the case of the leaves, where the faded and falling cane leaves contain much less plant food than the actively growing ones.

" In order to have fresh information on this point analyses have been made of fresh cane leaves, and of dry cane leaves just as they were about to fall from the plant but not actually fallen.

" The results are as follows, and show in a striking manner the nature of the transference of plant food material from the leaf back to the stem as it ripens and as its lower portion becomes dormant :—

TABLE II.—GRAMS OF MINERAL MATTER IN ONE LEAF.

One fresh cane leaf contains 0.9588 gram of ash.

One fresh trash leaf contains 0.5304 gram of ash.

	Green Leaf	Trash Leaf
Silica ... ..	0.4419	0.3321
Carbon ... ..	0.3336	0.0182
Iron Oxide ... ..	0.0047	0.0020
Alumina ... ..	—	0.0002
Lime ... ..	0.0448	0.0350
Potash... ..	0.1645	0.0340
Soda ... ..	0.0630	0.0188
Phosphoric anhydride ... ..	0.0134	0.0048
Sulphuric anhydride ... ..	0.0520	0.0272
Carbon dioxide ... ..	0.0228	0.0103
Chlorine ... ..	0.0868	0.0096
Water ... ..	0.0118	0.0136
Deduct oxygen equal to chlorine ... ..	0.0193	0.0021
	0.9586	0.5304
Nitrogen ... ..	0.094	0.033

" If this manner of regarding the cane as a growing organism is correct, it may lead us to modify some of our ideas concerning the manuring of sugar canes, and may account for the better result obtained by applying considerable quantities of nitrogen in one dose at an early stage, and for the smaller results obtained from the use of such a slow-acting manure as dried blood."

Six years after the publication of Watts' results, above discussed, Ledeboc (12) made public in the *Java Archief* the results of an extensive series of experiments wherein he divided total applications of 462 pounds of sulphate of ammonia per acre of cane into from two to five varying applications, as follows :—

TABLE III.—EFFECT OF VARYING APPLICATIONS OF NITROGEN ON JAVA CANE.

Pos. Am. Sulph. per Acre	Tons Cane per Acre	Yield Saccharose % Cane
0-308-154-0-0 ... ..	57.8	11.54
0-154-308-0-0 ... ..	56.7	11.58
0-77-231-154-0-0 ... ..	56.0	11.64
38-116-154-154-0 ... ..	59.0	11.57
38-38-154-116-116 ... ..	58.2	11.48

There is remarkably little difference in the results from the various times and sizes of applications — either in tons of cane per acre or in the factory yields from the cane of the different plots.

### Applied Practice in other Sugar Countries

Current practice in *Java*, according to Booberg (1), is to apply sulphate of ammonia in two or three doses, the first when the field is being replanted and the last within two months after planting. When phosphate, potash, lime, molasses, stable manure, oil and filter press cake, boiler ashes and other amendments are employed, they are supplied to the cane fields prior to planting.

In *Formosa* (18) mixed fertilizers (10.13 % N., 7½–10 % P205 and 3-7½ % K2O) are usually applied in three fractions.

In *Puerto Rico* two fertilizer applications are general (8), one of a complete fertilizer (about 12 %  $\text{NH}_3$ , 6 %  $\text{P}_2\text{O}_5$  and 5 %  $\text{K}_2\text{O}$ ) from six to eight weeks after planting or harvesting (in the case of ratoons) and another of sulphate of ammonia (from 200 to 400 lbs. per acre) about two months after the first application.

In the *Philippine Islands* Lee (13) considers that all inorganic nitrogenous fertilizers should be applied as early in the growth of the crop as is possible, the optimum to apply depending very largely upon the period to elapse between the time of fertilizer application and the normal initiation of heavy rains, in proportions something along the line of the following tentative schedule for districts on the island of Negros: 500 to 550 kgs. of sulphate of ammonia per hectare or its equivalent if the fertilizer applications are to be made in December, 425 to 500 kilos if to be made in January, 350 to 425 kgs. if applications are not to be made before February and only 300 to 350 kgs. if application is delayed until March. Inasmuch as Philippine weather records show a rather high expectancy of heavy rains and possibly typhoons in November, it is considered that fertilizers should never be applied before the first of December because of the possibility of considerable loss through leaching and washing if excessive rains should occur immediately following fertilizer application. On account of the likelihood of the occurrence of early excessive spring rains, also, all fertilizer application should be completed by the end of March. Fertilizer application is generally made in the Philippines in one dose.

In the *Hawaiian Islands* phosphoric acid and potash fertilizers are usually applied in one dose, either preliminary to planting or very shortly after harvesting in the case of ratoons, while nitrogen applications vary from two to four. The first small dose of nitrogen is commonly supplied with the phosphoric acid and potash. Formerly still a larger number of nitrogenous applications was made, but the current tendency seems to be toward an increase in the size and decrease in the number of applications. The supply of nitrogen is divided into several doses, not only because of the probable loss by leaching where only one or two applications are made early in the growth of the crop, but also because it is considered that when the cane is quite young extremely heavy applications might stimulate its growth to such an extent that the physiological balance might be disturbed. As mentioned earlier in this section, the last application is made if possible a full year before the fields are scheduled for harvesting—never later than nine or ten months before the calculated cropping

date for the fields in question—to avoid the depressive effect of large supplies of available nitrogen on the sucrose content of the cane. The principal object of the late applications appears to be that of stimulating the development of the suckers which contribute so largely to the enormous yields per acre obtained in Hawaii, it being generally considered that without the stimulation of these late supplies of readily available nitrogen this second growth would not encounter the conditions necessary for proper food assimilation and rapid growth to maturity.

Recent investigations by Moir (15) indicate that the interrelations of the nitrogen, phosphoric acid and potash in particular Hawaiian soils may call for considerable variation from any established practice as to time and number of applications not only of nitrogen, but of potassic fertilizers as well. He finds, in general, that, where soils do not respond to applications of phosphatic or potassic manures to the extent of showing higher yields than from nitrogen applications alone, such soils will probably show no gain and possibly even a loss from nitrogenous fertilization at planting time. On the contrary, where soils show good response to both phosphate and potash applications, particularly the former, large gains from such early nitrogenous applications are probable. Moir considers that these apparent conclusions may quite well explain the very conflicting fertilizer practices on some of the best managed Hawaiian sugar plantations:—

“Ewa has maintained that very early fertilization is not profitable. Ewa has no phosphate and few potash deficient soils, nitrogen being the greatest requirement. Almost all the irrigated plantations on red or brown upland or sloping fields, in contrast to the type of land at Ewa and the lowlands of Kekaha, show large responses to fertilizers applied with the seed or immediately after harvesting. These lands nearly all show definite responses to phosphate fertilizers. Evidently the use of nitrogen, more especially in the form of ammonia, has a very beneficial effect on the solubility of phosphate in the soil.

“Another area where no gain is secured from very early fertilization, a delay of a month giving better returns, is the Olaa district. Here we have soils that are not deficient in phosphates but are rather low in potash. Experiments at the Olaa Sugar Company have consistently shown that the use of a high grade fertilizer throughout the crop has given a gain of half a ton sugar per acre over the use of a high grade and nitrogen dressings.”

The greatest demand for nitrogen is at the time of the “boom stage,” as it is called by the Hawaiian investigators, or the period when the cane is from two to nine months old.

In *Peru* (20) the fertilizer, largely the native island guano (running about 12½% N., 8-9% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> and 2% K<sub>2</sub>O), is generally applied in two fractions aggregating from 125 to 225 lbs. nitrogen per acre, the first some two or three months after planting or harvesting (according to whether plant or stubble is being treated) and the second at the time of the lay-by (*ultimo aporque*). Quite frequently in the Chicama Valley, shortly after planting in the case of plant cane and just after off-barring the ratoons, about 100 pounds of nitrate of soda are applied in the irrigation water. Occasionally much heavier quantities of nitrate are employed, as in Hawaii, but this is exceptional.

On the *Barbados* sugar estates, according to Saint (31), the standard fertilizing practice with plant cane is to apply two squares of pen manure (1 square is equivalent to about eight tons) per acre just before planting. In the case of ratoons, an application of about 22 lbs. nitrogen (100 lbs. of sulphate of ammonia) and 112 lbs. K<sub>2</sub>O (as sulphate of potash) per acre is given soon after reaping the plant cane, followed by an additional 200 lbs. of ammonium sulphate in July.

Finally, in his very recent studies of the effect of single and divided applications of sodium nitrate to *sugar beets*, Winkler (36) has arrived at the conclusion that nothing is gained, on medium and heavy soils, by fractional doses. He finds that late applications are apt to result in a decreased yield in the absence of timely rains to carry the fertilizer into the soil.

### Experiments in Egypt

In Egypt it is customary to supply the readily available nitrogenous manures in three equal doses, the first when the cane is about a foot high and the other two at intervals of around a month.

*The Mataana Trials.*—At the suggestion of Moufattish Rizk Moussa, at that time in charge of the Ministry of Agriculture farm at Mataana, to whom, as well as his successor, Moufattish Ali Fouad, the writer is much indebted for their active cooperation, it was decided in early 1935 to lay down, in the *Kharaga* section of the farm, a replicated experiment to study the comparative economic value of (1) two and three equal applications, and (2) applying varying quantities in the different "doses" of nitrogenous manures, along the lines of some of the experiments already discussed (12).

Three bags of nitrosulphate of ammonia (26 % nitrogen) were adopted as the invariable total application, the treatments being as follows :—

- A. 2 bags + 1 bag
- B. 1½ " + 1½ bags
- C. 1¼ " + 1¼ " + ½ bag
- D. 1 bag + 1 bag + 1 "

Four replications of 4-qirat plats (¼th acre) were used for each treatment, the experiment being laid out on a symmetrical randomized design. The soil is weak, irregular (chemically and physically), over-compact and well below the average fertility of the tefth. Wheat and maize were the preceding crops and there was no legume in the rotation, nor had the land carried cane for many years. Preparation and cultivation of the plant cane was along almost identical lines to those described for the first-year cane in the *Kharaga* rate of nitrogen experiments in Technical Bulletin 198, *q.c.*, except that four additional waterings—27 in all—were given after the *bougha*, the final light one the middle of January, 1936, less than three weeks before the experiment was harvested, and that but one fassing—instead of three—was necessary, although it should be mentioned that the ridges were plowed the first week in June, at the time of the second fertilizer application. The first manurial dose was given the middle of May and the third, where used, early in July—an excellent distribution.

The first watering of the ratoons was given after burning the trash the middle of March, 1936—a very satisfactory date—and the 21st in mid-December. The ten-week period between the final irrigation and the harvest at the end of February, 1937, is reflected in the splendid sugar contents of all the ratoon plats, as shown in Table V. An average richness above 15 % is very exceptional in any other of the subtropical countries.

The ridges of the ratoons were opened on 19th April, 1936, and the first ration of nitrosulphate applied as per schedule, the second and third applications being made at the end of May and in mid-July, respectively. Fassings were given at the end of May—at the time of the second manuring—and in the first week of July, when the seventh irrigation was made.

In observations throughout the two growing seasons, no consistent differences in colour, height, stand or vigour, between the plats of the various treatments, could be noted and the crop figures given in Tables IV and V bear out these indications.

In all of these experiments harvesting methods were identical to those already described (27) and the same acknowledgements are due for cooperation and assistance. The Mataana experimental cane was ground and analyzed at the Ermant sugar factory and that of Mallawi at Abu Kurgas.

TABLE IV.—EXPERIMENTS ON NUMBER AND RATE OF NITROGEN APPLICATIONS AT MATAANA.

First-Year Cane.			Harvested 2nd February, 1936.			
Method of Application of 3 sacks of Nitrosulphate per Feddan	Plats No.	(4 Qirats)	Cane per Feddan		Richness (Suc. % Cane)	
		Kgs. Cane	Metric Tons	Qantars		
2 + 1... .. .	A— 1 8 11 16	7,760	—	—	14.62	
		6,400	—	—	14.78	
		7,580	—	—	14.14	
		7,860	—	—	14.76	
Average .. .. .		7,400	44.400	988	14.58	
1½ + 1½ ... .. .	B— 2 5 12 15	6,780	—	—	14.52	
		7,500	—	—	13.99	
		6,810	—	—	14.85	
		7,640	—	—	13.94	
Average .. .. .		7,183	43.095	959	14.33	
1¼ + 1¼ + ½ ... .. .	C— 3 6 9 14	8,100	—	—	13.94	
		7,390	—	—	14.40	
		6,940	—	—	15.15	
		7,310	—	—	14.14	
Average .. .. .		7,435	44.610	993	14.48	
1 + 1 + 1 ... .. .	D— 4 7 10 13	7,230	—	—	14.73	
		6,590	—	—	14.63	
		7,530	—	—	14.21	
		9,650	—	—	15.05	
Average .. .. .		7,075	42.450	945	14.66	
Two applications Average... ..		7,292	43.748	974	14.46	
Three applications Average .. .. .		7,255	43.530	969	14.57	

TABLE V.—EXPERIMENTS ON NUMBER AND RATE OF NITROGEN APPLICATIONS AT MATAANA.

*Second-Year Cane Harvested 28th February, 1937.*  
*Averages of 1st and 2nd-Year Cane.*

Method of Application of 3 Sacks of Nitro-Sulphate per Fed.	Cane per Feddan		Richness	Cane per Feddan		Richness
	Metric Tons	Qantars		Metric Tons	Qantars	
A. 2 + 1...	37.785	841	14.93	41.093	915	14.76
B. 1½ + 1½	41.130	916	15.34	42.113	937	14.84
C. 1¼ + 1¼ + ½	37.305	830	15.33	40.956	912	14.91
D. 1 + 1 + 1	39.210	873	15.49	40.830	909	15.08
Av. of 2 Applications.	39.458	878	15.14	41.603	926	14.80
Av. of 3 Applications.	38.258	852	15.41	40.894	910	14.99

Neither of the Mataana crops has shown any statistically significant difference or even a consistent trend between the various treatments either in quantity or quality of cane produced. An examination of the detailed plant cane figures reveals the fact that in each instance the variation between the individual replications of the same treatment is far greater than the average variation between the distinct treatments. In fact, there is a difference of the order of only about two tons of cane per feddan between the lowest yielding treatment and the highest — and both of these series received three applications of nitrogen. In sugar content the extreme range is the insignificant one of just one-third of a point, the highest being from the three equal applications (with the lowest tonnage) and the lowest from the two equal applications. Both as plant and ratoons the plots receiving two applications have yielded a few qantars more cane (averaging 16) per feddan than those supplied in three "doses," but in both cases the sugar content of the two-application plots was slightly lower (less than 2/5ths of a point) than the slightly lower yielding plots receiving three applications.

Summing up, then, there is certainly no indication of any advantage of three applications over two carefully made ones or of using any other division than equal quantities at each application, irrespective of whether the fertilizer is divided into two or three doses. This confirms the results of similar trials made by the manager of the Nag-Hamadi *sucrerie*, Mr. R. Roche, who long ago reached the conclusion that two applications were just as useful as three, providing that they are very evenly distributed. He regards the third application rather as insurance that any unevenness of distribution in the first application will be corrected in the final one, as it is highly improbable that the same stools could be missed or lightly manured three times in succession. In the light of the results set forth in the present paper, the writer is inclined to agree *in toto* with M. Roche.

The *Mallawi Trials* were designed in 1936 as a result of the very interesting outcome of the Mataana experiments. Inasmuch as the latter showed no effect of applying different proportions of the ration early or late in the season, the Mallawi experiment at the suggestion of Moufattish Hassan Khalifa of the Agronomic Section of the Ministry, was simplified by testing out a standard supply of nitrogen (three sacks of 16 % nitrate of lime) applied in one, two and three equal doses. As in all our experiments each plat covered an area of four qirats and each treatment was replicated four times in a randomized arrangement. The land chosen is a fairly light loam of the apparently good homogeneity characteristic of the Ministry Farm and was previously in maize.

Details of preparation, planting, irrigation and cultivation of the plant and ratoon crops were practically identical to those described for the second series of ridging experiments at Mallawi in Technical Bulletin 195, except that no superphosphate was employed and that the plant cane was irrigated only eighteen instead of twenty times, the final watering being given at the end of November, 1936 — ten weeks prior to the harvest the middle of February, 1937. Also, the plant cane received four fassings instead of three and the ratoons two against one for the ratoons in the ridging experiments. The first watering of the ratoons of this experiment was supplied some six weeks earlier than in the ridging trials, enabling a more timely start of cultivation. In the first-year cane the fertilizer applications were made on 6th May and June and 21st June, 1936, while to the ratoons they were supplied on 5th May and 7th and 28th June, 1937. The data for both plant and ratoon crops are set forth in Table VI.

TABLE VI.—EXPERIMENTS ON NUMBER OF NITROGEN APPLICATIONS  
AT MALLAWI

300 kgs. Nitrate of Lime per Feddan.

No. Applications	Plats No.	(4 Qirats)	Cane per Feddan			Richesse (Sucr. % Cane)
			Kgs. Cane	Metric Tons	Quintars	
I.—First-Year Cane.—Harvested 11-17 and 18-37.						
One (3 sacks) ... ..	{	A— 1	8,950	—	—	9.83
		6	9,880	—	—	9.75
		8	9,100	—	—	10.17
		12	9,080	—	—	9.72
Average for one Application ...			9,253	55.515	1,236	9.87
Two (1½ + 1½ sacks) ...	{	B— 2	9,050	—	—	8.69
		4	8,800	—	—	9.67
		9	9,430	—	—	9.32
		10	9,480	—	—	8.86
Averages for two Applications...			9,190	55.140	1,227	9.14
Three (1+1+1 sacks) ...	{	C— 3	8,760	—	—	9.25
		5	9,610	—	—	9.49
		7	9,080	—	—	9.37
		11	9,200	—	—	9.49
Averages for three Applications			9,163	54.975	1,224	9.40
II.—Second-Year Cane.—Harvested IV-16 and 17, 1938.						
Averages for one Application ...			7,458	44.748	996	11.30
Averages for two Applications ...			7,543	45.258	1,007	11.41
Averages for three Applications			7,680	46.080	1,026	11.23
III.—Annual Averages for Two Crops.						
Averages for one Application ...			8,356	50.136	1,116	10.53
Averages for two Applications ...			8,367	50.202	1,117	10.28
Averages for three Applications			8,422	50.532	1,125	10.52

As in the Mataana experiments, there is no statistically significant difference or even a consistent trend established in either crop between the plats receiving their nitrogen in one, two or three applications. The yield and quality figures are remarkably similar for all plats, but examination of the detailed plant cane data in the first section of Table VI shows that in each instance the variation between the individual replications of the same treatment is far greater than the average variation between the distinct treatments. In fact, there is an extreme spread of the utterly insignificant order of only about one-half ton of cane per feddan between the average yields of the treatments and of less than three-fourths of a point in sugar content.

### Conclusions


These results appear to confirm those obtained at Mataana and Nag-Hamadi, as well as in other subtropical countries, indicating that, if each application of nitrogenous manure is timely and very evenly spread, there will be little effect, with our short growing season of varying standard practice either in number of doses or the proportions in which the fractional applications are made. Taking the short period of luxuriant growth into consideration, as well as the advantage of getting all nitrogenous manures applied by the end of June, it is probable that two equal and very carefully distributed applications would be the most economical procedure for the Egyptian planter.

### Bibliography

- (1) BOONERO, G.—Manuring in the Sugar Cane Cultivation of Java. Proc. 3rd Cong. I.S.S.C.T. Sourabaya, 1929.
- (2) BOONERO, G.—Field Experiments for the Sugar Cane in Java and the Results. *Ibid.*
- (3) BORDEN, RALPH J.—Cane and Juice Sampling in Field Experiments. Repts. Anl. Mtg. Assn. Haw. Sug. Technols. Hnl., XII, 1933.
- (4) DEVENTER, W. VAN.—De culture van het suikerriet op Java. Amstn., 1914.
- (5) DEER, NOEL.—Cane Sugar. Ldn., 1921.
- (6) DEMANDT, E.—Optimum Nitrogen Fertilization for P.O.J. 2878. *Archief*, XXXIX, Med. 12, 1931.
- (7) DILLEWJN, VAN & LEVERT.—The Nitrogen Optimum (Trans. Tit.). *Archief*, XLI, 18, 1933.
- (8) FERNANDEZ, GARCIA, R.—Informes Anuales de la Seccion de Quimica. Estn. Exp. Ins. de P. Rico, Infmes. Anles., 1924-28.
- (9) FISHER, G.W.—Methods of Applying Fertilizer to Cane Fields. Proc. Anl. Mtg. Assn. Haw. Sug. Technols., XI, 1932.
- (10) HARRISON & BOVELL.—Sugar Cane Manurial Tests. *Sugar Cane*, XIX, 509, 1887.
- (11) HILGARD, E. W.—Soils. N.Y., 1906.
- (12) LEDERBOER, F.—In van Deventer's "De Cultuur, van het suikerriet op Java. *Archief*, XX, 144, 1912.
- (13) LEE, H. ATHERTON.—Annual Reports of the Director of Research. Proc. Anl. Convs. Philipp. Sug. Assn., 1928-30.
- (14) LOEW & ASO.—On Changes of Availability of Nitrogen in Soils. Tokyo Coll. Agr. Bull. VIII, 1907.
- (15) MOIR, W. W. G.—Response to Form and time of Fertilization. Haw. Sug. Technols. Assn., Anl. Mtg. IX, Hnl., 1930.
- (16) MOIR, W. W. G.—Rapid Chemical Methods of Soil Analyses. *Ibid.*, XV, 1936.
- (17) MORSE, F. W.—Relations between Calcium Carbonate, Certain Fertilizer Chemicals and the Soil Solution. *Soil Sci.*, XV, 1923.
- (18) OSHIMA K.—Discussion on Fertilizer Practice. Proc. 3rd Cong. I.S.S.C.T., 1929.
- (19) PAGE, H. J.—The Relation between the State of Saturation of the Soil and its Hydrogen-Ion Concentration, with special Reference to the Reaction of "Physiologically Acid" Fertilizers. First Intl. Cong. Soil Sci. Wshgtn., 1927.



- (20) ROSENFELD, ARTHUR H.—The Sugar Industry of Peru. Trop. Plt. Research Found., Sci. Cont. 6. Wasghtn. 1926.
- (21) ROSENFELD, ARTHUR H.—Honduras — Another Little Known Sugar Country. I.S.J., XXIX, 1927.
- (22) ROSENFELD, ARTHUR H.—The Fall Application of Mineral Nitrogenous Fertilizers. Facts Abt. Sugar, N.Y., XI-16-29.
- (23) ROSENFELD, ARTHUR H.—A Glimpse of Formosa's Sugar Industry. I.S.J., XXXI, 1929.
- (24) ROSENFELD, ARTHUR H.—Co-operative Fertilizer Experiments. Sug. Bull., VII, 9, 1929, and VIII, 16, 1930.
- (25) ROSENFELD, ARTHUR H.—As to Fertilizer. *Ibid*, VIII, 11, 1930.
- (26) ROSENFELD, ARTHUR H.—La Estacion Experimental de la Industria Azucarera de Java. Bol. Union Panam, LXIV, 1930.
- (27) ROSENFELD, ARTHUR H.—The Optimum Sugar Cane Planting Date in Egypt. Min. Agr. Tech. Bulls. 156 and 195. Cairo, 1935 and 1938.
- (28) ROSENFELD, ARTHUR H.—Manurial Requirements of Sugar Cane in Egypt. I. Optimum Rate of Nitrogen Experiments. II. Phosphate Expts. III. Further Rate of Nitrogen Expts. Bulls. 169, 173 and 198. Cairo, 1936-38.
- (29) ROCE.—Annales Agronomiques, V, 283, 1879.
- (30) RUSSELL, E. J.—Soil Conditions and Plant Growth, 6th Edition, 1932.
- (31) SAINT, S. J.—Reports of the Agricultural Chemist. Repts. Dept. Sci. and Agr. Barbados, 1928-32.
- (32) SAINT, S. J.—Manurial Trial in Barbados, Barb. Agr. Jour., I, 4, 1932.
- (33) SAUNDERS, A. R.—Statistical Methods, with Special Reference to Field Experiments. South Af. Dept. Agr. Sci. Bull. 147. Pretoria, 1935.
- (34) WATTS, FRANCIS.—Manurial Requirements with Cane in the Leeward Islands. Impl. Dept. Agr. W. Indies, Pamph. 30, 1906.
- (35) WILLCOX, O. W.—Principles of Agrobiology. N.Y. 1930.
- (36) WINKLER, G.—Single vs. Divided Applications of Sodium Nitrate (Trans. Tit.). Zuckerruebenbau, XIX, No. 5, pp. 69-76, 1937.



*Frontispiece.*—Even optimum manuring cannot compensate defects in preparation, the cornerstone of profitable yields

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT.

---

Technical and Scientific Service

Sugar Investigation Division

---

BULLETIN No. 219

---

## Variety-Tests on Some Introduced Sugar Cane Varieties

BY

GADALLAH ABOUL ELA

(Dip. H. Agric., B.Sc. A., M.Sc., Phi. Kappa Phi.)

*Government Sugar Cane Technologist.*

(Recommended for publication by the Publications Committee  
of the Ministry of Agriculture, which is not, as a body,  
responsible for the opinions expressed in this Bulletin).

Government Press, Bulâq, Cairo, 1940

GOVERNMENT PUBLICATIONS are on sale at the "Sale Room,"  
Ministry of Finance. Correspondence relating to these Publi-  
cations should be addressed to the "PUBLICATIONS OFFICE,"  
Government Press, Bulâq, Cairo.

Price - - - - - P.T. 2

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT.

**Variety-Tests on Some Introduced  
Sugar Cane Varieties**

**INTRODUCTION**

The cultivated sugar cane of the world originated in Asia and the South Pacific Islands. It is very probable that it was first grown as a crop in the north of India. From India it reached Arabia at the beginning of the Christian Era.

Sugar cane and cotton are among other things that the Arabs are known to have carried with them in their invasions. They invaded Egypt in 641 and introduced sugar cane into it, as they also introduced it into Spain and some of the Mediterranean Islands.

In 1493, Columbus, in his second voyage, took sugar cane to Hispaniola or as it is now called, Santo Domingo, in the West Indies.

This sugar cane that was widely distributed belonged to one variety, which was identified by Mr. Noel Deerr as the "Puri" of India, and which is still sown on limited areas in some localities in the Old and New Worlds. It is the old baladi variety of Egypt which is known as the Pharaon (Creoule) variety. It needed no special name for the first three centuries of its growth in America, since it was the only sugar cane known, but when other varieties were introduced, it came to be known as native cane or more often as "Creole cane."

For one reason or another, and especially for the outbreak of some epidemics, sugar cane varieties were frequently carried from one place to another. At first, these variety movements dealt with varieties originally existing in the different sugar cane

countries, but the outbreak of the "soreh" epidemic, about 1880, in Java, and the "mosaic" epidemic, more than one quarter of a century later, in Porto Rico, led to an extensive study of sugar cane and especially of methods of cane breeding. The outbreak of such epidemics and the failure of the existing varieties to stand them, directed attention to the supreme importance of the variety question and greatly stimulated interest in breeding new seedlings. This new kind of work began in Java and Barbados but was soon practised in practically all of the important cane growing countries.

Hundreds of thousands of these seedlings are produced yearly in India and in other countries, and the resulting strains have shown great value in combating diseases as well as in highly raising up the rate of production in all cane producing countries. The immunity of some canes, including the wild types, was combined with the economic characters of the noble canes in the produced seedlings; and hybrid vigour (heterosis) was made use of in breeding this plant, as in other plants and animals, such as in maize and beef cattle, and thus contributed highly in raising the production of sugar cane in all localities producing it.

The high production of these seedling varieties and their immunity against one or another of the prevailing diseases, very highly increased variety movements and much widened their scopes. The use of the seedlings was, thus, not confined to the countries of their production, but a good number of those of each country was introduced and tested in many other countries including Egypt.

At the time when the late Mohamed Ali Pasha founded Modern Egypt, the sugar industry was in a poor condition in the country. His son, the late Ibrahim Pasha, introduced some cane varieties from America; and about 1850, the late Ismail Pasha restored the Egyptian industry and brought sugar cane from Jamaica. In 1902, H. Henry Naus Bey, of the Egyptian General Sugar Co., introduced, from Java, some sugar cane varieties including Cheribon and P.O.J. 105.

The varieties grown in Egypt, for sometime, under the names of "Red, White and Striped Jamaica," are nothing but Cheribon canes. They, especially the Black Cheribon, are still grown, on limited areas, for chewing and are now known as baladi canes.

The presence of mosaic gave P.O.J. 105 a good privilege over the Cheribon canes, and thus it became the standard cane of the country.

Since that year (1902), the Sugar Company has introduced about 200 varieties including M 1030, which was introduced, in 1909, from the Island of Mauritius in the Indian Ocean, and which is known in Egypt as "Khad El Gameel," the popular chewing cane of the country.

The Ministry of Agriculture, too, has introduced in the last 10 years about 50 varieties.

Nine of the important strains of these introduced varieties were tested with the standard cane of the country, P.O.J. 105, in a variety field trial carried out, 1934, on the Ministry of Agriculture's farm in Mataana. This same experiment was carried, the following year, on the farm of the Ministry in Mallawi. Governing from the first results of this experiment in Mataana, the four highest P.O.J. varieties: 36, 36(M), 979 and 105 were put in another variety field trial on the "Haraga" section of the Mataana farm.

Each of the first and second experiments remained in Mataana for two years, and the former remained in Mallawi for three years. The 1st year results of the first experiment in Mataana were discussed by Dr. A. H. Rosenfeld, the ex-sugar cane technologist, in Tech. Bul. No. 168 and those of the 2nd year in Mataana and the 1st and 2nd years in Mallawi of the same experiment together with the results of the 1st year of the second experiment were discussed by the same writer in Tech. Bul. No. 196.

When the results of the 3rd year of the first experiment in Mallawi and those of the 2nd year of the second experiment in Mataana, which are the last results of these two experiments, were obtained, this year- the present writer found it advisable to discuss and analyse the whole results of the two experiments in the present paper.

It should be mentioned here that both experiments were planned and carried out by Dr. A. H. Rosenfeld in his period of work as sugar cane technologist for the Egyptian Ministry of Agriculture.

## The First Experiment

This experiment was planned to test nine of the important introduced varieties in comparison with the standard cane of the country, P.O.J. 105.

The ten tested varieties are (1) :-

P.O.J. 105

" 36

" 36 (M)

" 234

" 979

" 2714

" 2725

Co. 281

H. 109

B.H. 10 (12)

These varieties were sown in a variety field trial, on each of the two farms of the Ministry of Agriculture in Mataana and Malhawi. Each variety was sown on three plots, three kirats each.

## THE FIRST EXPERIMENT IN MATAANA

This experiment was sown on the 9th of April 1934 on a fairly light fertile loam of an apparently quite uniform texture in the Ministry of Agriculture farm, and lasted for two years.

(1) P.O.J. (Proofstation Ost Java) Expt. St. East Java.

Co. Cuddalore Cane Breeding Station, India.

H. Hawaii.

B.H. Barbados Hybrid.

(M) Signifies the Japanese word "Minka" meaning "striped."

The results of the first and second year crops together with the averages for both years are mentioned in Table I.

TABLE I.—RESULTS OF THE FIRST EXPERIMENT IN MATAANA.

Variety	Cane per Feddan		Richesse (Sugar % Cane)	Kgs. Sugar per Feddan
	Metric Tons	Qantars		

(a) First Year Cane.—Harvested February 24, 25, 1935.

P.O.J. 105...	50·800	1,131	13·67	5,537
" 36 (M)...	45·945	1,023	14·18	5,192
" 36...	43·094	959	14·37	4,956
" 979...	40·667	905	14·73	4,799
Co. 281...	37·894	844	13·97	4,244
P.O.J. 234...	35·360	787	14·35	4,066
H. 109...	35·254	785	13·31	3,737
P.O.J. 2714...	29·520	657	14·17	3,366
B.H. 10 (12)...	22·680	505	13·88	2,517
P.O.J. 2725...	20·320	452	16·04	2,601

(b) Second Year Cane.—Harvested February 1, 1936.

P.O.J. 105...	43·466	968	15·36	5,346
" 36 (M)...	41·680	928	13·98	4,668
" 36...	40·440	900	15·31	4,934
" 979...	39·160	872	14·81	4,621
Co. 281...	41·706	928	14·89	4,967
P.O.J. 234...	32·640	727	15·41	4,015
H. 109...	25·546	569	13·73	2,810
P.O.J. 2714...	13·814	307	14·50	1,602
B.H. 10 (12)...	17·226	383	15·41	2,119
P.O.J. 2725...	13·784	307	16·17	1,778

(c) Averages for 1st and 2nd Year Cane.

P.O.J. 105...	47·133	1,049	14·52	5,112
" 36 (M)...	43·813	975	14·06	4,930
" 36...	41·767	929	14·84	4,945
" 979...	39·914	888	14·77	4,710
Co. 281...	39·800	886	14·43	4,604
P.O.J. 234...	34·000	757	14·88	4,041
H. 109...	30·400	677	13·52	3,274
P.O.J. 2714...	21·667	482	14·34	2,484
B.H. 10 (12)...	19·953	445	14·65	2,318
P.O.J. 2725...	17·052	389	16·11	2,130

The analyses of the crops were kindly carried out by Ernest Sastrie.

In the first year (Table I, section A), P.O.J. 105 has clearly exceeded all other varieties in both cane and sugar production. Its nearest competitor was P.O.J. 36 (M). The yields of the rest of the varieties gradually decreased in the order mentioned in the table. The outstandingly high richness of P.O.J. 2725 indicates the early maturity of this variety.

In the second year (Table I, section B), P.O.J. 105 has again outdistanced all other varieties; and although, in cane, it was not much higher than P.O.J. 36 (M) and Co. 281, yet its sugar production was obviously higher because of its higher richness. The range of differences, in both cane and sugar production, between P.O.J. 105, 36 (M), 36, 979, and Co. 281 is narrower in the ratoon than in the plant cane. As in first year cane, the first five varieties, as mentioned in the table, form a class of themselves, which is distinctly higher in cane and sugar production than the other five varieties, which are clearly poor yielders. P.O.J. 2725 maintained its distinguished high richness in ratoon as in plant cane.

The averages of plant and ratoon canes (Table I, section C) very clearly show the superiority of the variety already established in Egypt, P.O.J. 105, in both cane and sugar yields. It has surpassed the next highest variety, P.O.J. 36, with 120 Qantars of cane and about 500 kilograms of sugar per feddan. There is no statistical difference between the yields of P.O.J. 36 and its mutant P.O.J. 36 (M). While the richness of P.O.J. 2725 was highest, there was no much difference between the average of the sugar contents in the rest of the varieties with the exception of H. 109, which was the lowest, in this respect, all the way through.

No one of the varieties tested, on the fertile soil of Matama, is qualified to replace P.O.J. 105, neither in cane nor in sugar production.

#### THE FIRST EXPERIMENT IN MALLAWI

This experiment was duplicated in Mallawi, on a fertile uniform field in the Ministry of the Agriculture's farm, a year later than in Matama, that is in 1935. Three crops were obtained: plant, 1st ratoon and 2nd ratoon.

Table II contains the results of the three crops, of this experiment in Mallawi, together with their averages for the first two years as well as for the whole three years.

TABLE II.—RESULTS OF THE FIRST EXPERIMENT IN MALLAWI.

Variety	Cane per Feddan		Richesse (Sugar % Cane)	Kgs. Sugar per Feddan
	Metric Tons	Qantars		

(a) 1st Year Cane.—Harvested March 18, 1936.

P.O.J. 105...	54.368	1,210	12.28	5,328
" 36 (M)...	51.173	1,139	14.04	5,731
" 36...	48.827	1,086	13.69	5,371
" 979...	46.720	1,040	12.28	4,579
Co. 281...	51.608	1,149	12.46	5,161
P.O.J. 234...	39.547	880	14.92	4,706
H. 109...	34.760	774	12.08	3,372
P.O.J. 2714...	32.240	718	13.72	3,546
B.H. 10 (12)...	36.000	801	12.22	3,528
P.O.J. 2725...	47.120	1,049	14.22	5,372

(b) 2nd Year Cane.—Harvested February 16, 1937.

P.O.J. 105...	41.746	996	11.87	4,251
" 36 (M)...	44.054	981	11.62	4,097
" 36...	41.414	922	12.09	4,071
" 979...	38.614	860	12.67	3,900
Co. 281...	48.586	1,082	13.53	5,217
P.O.J. 234...	37.040	825	13.49	4,000
H. 109...	33.720	751	12.02	3,237
P.O.J. 2714...	16.534	368	12.31	1,620
B.H. 10 (12)...	29.400	654	11.40	2,675
P.O.J. 2725...	37.280	830	11.61	3,167

(c) 3rd Year Cane.—Harvested April 11, 1938.

P.O.J. 105...	46.600	1,037	12.46	4,660
" 36 (M)...	44.760	996	12.22	4,386
" 36...	44.200	981	11.45	4,066
" 979...	42.960	956	12.66	4,339
Co. 281...	46.520	1,036	14.23	5,303
P.O.J. 234...	32.880	732	14.88	3,913

The analyses of the crops were kindly carried in Abu-Kerkas Sucreria

Variety	Cane per Feddan		Richesse (Sugar % Cane)	Kgs. Sugar per Feddan
	Metric Tons	Qantars		

(d) Averages for 1st and 2nd Year Canes.

P.O.J. 105...	49-557	1,103	12-08	4,745
" 36 (M)...	47-614	1,060	12-83	4,914
" 36...	45-121	1,005	12-89	4,694
" 979...	42-667	950	12-48	4,240
Co. 281...	50-097	1,115	13-00	5,204
P.O.J. 234...	38-294	852	14-21	4,353
H. 109...	34-240	762	12-05	3,305
P.O.J. 2714...	24-387	543	13-02	2,583
B.H. 10 (12)...	32-700	727	11-81	3,102
P.O.J. 2725...	42-200	939	12-92	4,420

(e) Averages for 1st, 2nd and 3rd Year Canes.

P.O.J. 105...	48-571	1,081	12-20	4,745
" 36 (M)...	46-662	1,039	12-63	4,738
" 36...	44-814	998	12-41	4,485
" 979...	44-765	952	12-54	4,273
Co. 281...	48-905	1,089	13-41	5,237
P.O.J. 234...	36-189	812	14-43	4,206

The first year results (Table II, section A) show that P.O.J. 36 (M), 36, 2725 and Co. 281 competed more seriously with the standard cane (P.O.J. 105) in Mallawi than in Mataana, and although it was a little better than them in cane production, yet the first three have over-yielded it in sugar production, with a difference of over 400 kilograms of sugar per feddan in behalf of P.O.J. 36 (M).

The results of the 1st ratoon (Table II, section B) show lower sugar contents, in general, than in the plant canes, probably because of the freezes of December 1936 and January 1937. Co. 281 has distinctly distinguished itself over all other varieties, including P.O.J. 105, in both cane and sugar production. It has exceeded the next highest variety, P.O.J. 105, with the magnificent amount of about 1,000 kilograms of sugar per feddan and the statistically significant amount of 86 qantars of cane per feddan. Again there was no statistical difference between the yields of P.O.J. 36 and its mutant P.O.J. 36 (M), and both were somewhat lower, in both cane and sugar production, than

the standard cane. The richness of P.O.J. 2725 seriously dropped down, this year, probably because that this variety felt the freezes more than the rest, and thus its yield dropped down accordingly.

The third year results (Table II, section C) strongly point to the possibility of raising sugar cane as a profitable second ratoon crop, on the good fertile lands of Mallawi and probably all through the northern locality of sugar cane production. In fact P.O.J. 105, 36 (M) and Co. 281 had better yields, especially in sugar production, in the third year than in the second year crop. This might be because of the freezes that happened at the end of 1936 and early in 1937. Once more Co. 281 has obviously surpassed the standard cane with an amount of over 640 kilograms of sugar per feddan, while having about the same yield of cane. H. 109, P.O.J. 2714, B.H. 10 (12) and P.O.J. 2725 — were not able to grow as 2nd ratoons and their plots were filled with P.O.J. 105.

In the averages for the first two years (Table II, section D), Co. 281, again, overyielded P.O.J. 105 with a big amount of about 460 kilograms of sugar and an insignificant amount of 12 qantars of cane per feddan. The average yield of P.O.J. 36 (M), in both cane and sugar production, is better than that of P.O.J. 36, and while it is below P.O.J. 105 in cane production it exceeded it in sugar production. P.O.J. 234 had the highest richness and Co. 281 was second to it.

As there is a possibility for raising sugar cane economically as a second ratoon, in Mallawi, the discussion of the averages of the three year yields of the varieties which could grow as second ratoon (Table II, section E), will not be out of place. The average sugar yield per feddan of Co. 281, is more than that of P.O.J. 105 with an amount of over 490 kilograms while their averages in cane are about the same. The averages for P.O.J. 36 (M) is better than those for P.O.J. 36, and both varieties have lower averages for the whole three years than for the first two years.

Sugar cane is originally a tropical plant and needs about two years to mature in its original habitat. It has to complete its growth, in Egypt, in about half the time it takes in the tropics. The amount of heat (calories) during the growing period of sugar cane in Upper Egypt (Mataana) is doubtless more than that in Middle Egypt (Mallawi). It is clear, then, that Egypt needs early maturing varieties and the northern locality needs them more than the southern one. Co. 281 combined with its heavy production of cane, in Mallawi, an early maturity, as seen in its higher richness than that of P.O.J. 105 all through the three years

of its growth. The difference was more than 2 per cent in the 1st ratoon and about 1 per cent in both averages for the first two years and the whole three years.

There are strong evidences that Co. 281 is a better cane in Malawi than P.O.J. 105. It is liable to increase the returns of the sugar Co. with about 10 per cent and, in the same time, relieve the farmers from the discounts endured over them for immaturity. In fact, it probably puts the northern locality of sugar cane production on equal ranks with that of Upper Egypt in the high quality of the cane produced.

### The Second Experiment

Judging from the results of the 1st year crop of the first experiment in Mataana, a second experiment was planned to test the three varieties having the highest yields, viz. P.O.J. 36, 36(M) and 979 against the standard cane, P.O.J. 105. Every variety was sown on three plots, four kirats each, in 1935, on a compact rather irregular clay soil in the "Haraga" section of the Ministry of Agriculture's farm in Mataana.

Table III contains the results of the 1st and 2nd year crops as well as the averages for both years.

TABLE III.—THE RESULTS OF THE SECOND EXPERIMENT  
IN MATAANA.

Variety	Cane per Feddan		Richesse* (Sugar % Cane)	Kgs. Sugar per Feddan
	Metric Tons	Qantars		
P.O.J. 105...	41·940	934	14·78	—
" 105...	50·340	1,121	13·93	—
" 105...	49·320	1,098	13·98	—
P.O.J. 105 Average...	47·200	1,051	14·23	5,381

(a) First Year Cane.—Harvested March 4, 1937.

Variety	Cane per Feddan		Richesse (Sugar % Cane)	Kgs. Sugar per Feddan
	Metric Tons	Qantars		
P.O.J. 36 (M) ...	50·922	1,134	14·82	—
" 36 (M) ...	40·560	1,036	14·39	—
" 36 (M) ...	51·180	1,139	14·09	—
P.O.J. 36 (M) Average...	49·554	1,103	14·43	5,699
P.O.J. 36 ...	47·400	1,055	14·79	—
" 36 ...	57·060	1,270	14·06	—
" 36 ...	49·740	1,107	14·62	—
P.O.J. 36 Average ...	51·400	1,144	14·49	5,962
P.O.J. 979...	31·500	701	15·22	—
" 979...	50·520	1,125	12·77	—
" 979...	47·160	1,050	14·41	—
P.O.J. 979 Average...	43·060	959	14·13	4,866

(b) Second Year Cane.—Harvested March 20, 1938.

P.O.J. 105...	45·240	1,007	13·62	—
P.O.J. 105...	43·440	967	14·53	—
P.O.J. 105 Average...	44·340	987	14·08	5,010
P.O.J. 36 (M) ...	43·800	975	14·50	—
P.O.J. 36 (M) ...	42·720	951	15·41	—
P.O.J. 36 (M) Average...	43·260	963	14·96	5,191
P.O.J. 36 ...	45·660	1,016	14·22	—
P.O.J. 36 ...	49·380	1,099	14·43	—
P.O.J. 36 Average ...	47·520	1,058	14·63	5,506
P.O.J. 979...	30·660	682	16·23	—
P.O.J. 979...	45·960	1,023	13·53	—
P.O.J. 979 Average...	38·310	853	14·88	4,559

\* These results were obtained from the analyses of the crops kindly carried at the Erment Snereria.



Variety	Cane per Feddan		Richesse (Sugar % Cane)	Kgs. Sugar per Feddan
	Metric Tons	Qantars		

(c) Averages for 1st and 2nd Year Canes.

P.O.J. 105...	45.770	1,019	14.46	5,196
" 36 (M)...	46.407	1,033	14.70	5,445
" 36... ..	49.460	1,102	14.56	5,761
" 979... ..	40.685	906	14.51	4,713

In the first year (Table III, section A), the differences between the plots of each variety, in both cane yields and sugar contents, are very high, and much higher than those between the averages of the varieties. This wide variability, mostly due to soil heterogeneity, denotes a big amount of experimental error, strongly affecting the statistical significance of the differences between the average results of those varieties. When there is a plot far below the other two ones, in a variety, in cane production, it has the highest sugar contents, as can be seen in P.O.J. 105 and 979. For the first time, in these experiments, P.O.J. 36 overyielded its mutant P.O.J. 36 (M) in both cane and sugar production. It also exceeded P.O.J. 105 with over 580 kilograms of sugar and 90 qantars of cane per feddan. P.O.J. 36 (M) also gave better results than the standard cane, but to a less extent than its sister cane, P.O.J. 36. The much wider range of variability in P.O.J. 979, indicates a higher sensitiveness in this variety to such unfavourable soil conditions.

In the second year (Table III, section B), the cane of a stripe of land, at one side of the experiment field containing one plot of each variety, was kept for seed. The area without this stripe seems to be relatively more homogeneous, and thus the differences between the results of the two plots left for each variety are much narrower. The results of this year strongly confirm those of the first year in pretty nearly all respects.

The averages for the two years (Table III, section C) put P.O.J. 36 before P.O.J. 105 in both cane and sugar production. The former overyielded the latter with 565 kilograms of sugar and more than 80 qantars of cane per feddan. It was also better in both sugar and cane than its mutant P.O.J. 36 (M), which exceeded the standard cane with about 250 kilograms of sugar and the insignificant amount of 14 qantars of cane per feddan.

It seems that P.O.J. 36 and its mutant P.O.J. 36 (M) are hardy canes and, especially the former, are probably more suited to unfavourable soil conditions than P.O.J. 105.

Table IV contains the average results of the best four varieties for the four crops of the first and second experiments in Mataana.

TABLE IV.—RESULTS OF THE FOUR CROPS OF THE FIRST AND SECOND EXPERIMENTS IN MATAANA.

Variety	Cane per Feddan		Richesse (Sugar % Cane)	Kgs. Sugar per Feddan
	Metric Tons	Qantars		
P.O.J. 105... ..	46.452	1,034	14.34	5,319
" 36 (M)...	45.110	1,004	14.39	5,188
P.O.J. 36... ..	45.614	1,015	14.70	5,353
P.O.J. 979... ..	40.299	897	14.64	4,712

The results in table IV show that P.O.J. 36 is practically equal to P.O.J. 105 as a general cane for the poor and good soils of Upper Egypt.

### General Conclusions

From all the previous discussions the following deductions can be made:—

(1) *There are strong evidences that Co. 281 is a better cane in Malawi than P.O.J. 105.* It is liable to increase the returns of The Sugar Co. with about 10% and, in the same time, relieve the farmers from the discounts endured over them for immaturity.

(2) It seems that both P.O.J. 36 and its mutant P.O.J. 36 (M) are hardy canes and that they are probably more suited to unfavourable soil conditions than P.O.J. 105, especially in Upper Egypt.

Moreover, as a country should not rely on one cane variety, in order to avoid the complete destruction of its sugar industry in case of an outbreak of a certain epidemic, these three promising canes are given further trials with the standard cane of the country P.O.J. 105.

Their propagation should be gradually increased, in order to find enough seed of the ones, that the new experiments will show to be of a decided benefit.

— 14 —

**References**

- (1) Noel Deerr ..... Cane Sugar, London, 1921.
- (2) Earle, F. S. .... Sugar Cane, N.Y., 1928.
- (3) " " " ..... Sugar Cane Varieties of Porto Rico—Porto Rico Jour. of Agric., Vol. III, 2, 1909.
- (4) A. H. Rosenfeld ... A Monograph of Sugar Cane Varieties—Porto Rico Jour. of Agric., Vol. XI (complete), 1927.
- (5) " " ..... Tonnage Tests of Some Important Sugar Cane Varieties. Tech. Bult. No. 186, Egyptian Ministry of Agriculture, 1936.
- (6) " " ..... Some more Tonnages Tests of some Important Sugar Cane Variet. Tech. Bult. No. 196, Egyptian Ministry of Agriculture. In press.

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT.

---

Technical and Scientific Service.  
Bulletin No. 26. (Entomological Section.)

---

## THE OUTBREAK OF PSEUDOCOCCUS SACCHARI, Ckll. ON THE SUGAR CANE OF EGYPT.

By W. J. HALL, A.R.C.S., F.E.S.,

ENTOMOLOGIST, MINISTRY OF AGRICULTURE.

(Edited by the Publication Committee of the Ministry of Agriculture which  
is not, as a body, responsible for the opinions expressed in this Bulletin)  
(May 10, 1922.)

**Government Press, Cairo, 1922.**

To be obtained either directly from the Government Press or from  
the GOVERNMENT PUBLICATIONS OFFICE, MINISTRY OF FINANCE,  
Boulevard de l'Égypte, Cairo.

Price - - - - P.T. 3.

---

**Government Press**

1912-1922-150 ex.

---

AREA UNDER CROP IN FEDDÂNS.

PROVINCES.	AREA UNDER CROP IN FEDDÂNS.										
	1910-11	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21
BOHEIRA ..	841	401	399	310	466	777	782	873	701	895	589
GHARBIYA ..	780	414	355	113	499	716	788	1,022	751	499	417
DAKHILIYA ..	593	316	294	507	533	784	683	704	524	213	359
SHARQIYA ..	474	406	380	339	528	616	808	634	658	559	571
MINIYA ..	636	444	423	387	533	640	906	820	835	609	823
QALINBIYA ..	487	426	376	334	403	686	914	767	591	462	696
LOWER EGYPT ..	3,811	2,407	2,227	2,290	2,967	4,219	4,881	4,820	4,060	3,237	3,455
GIZA ..	775	983	957	560	930	1,422	2,183	1,763	1,076	873	1,698
Beni Suef ..	342	416	388	176	355	548	347	354	286	168	142
Fayûm ..	411	347	528	508	492	726	528	455	627	518	512
Minya ..	7,329	7,118	7,778	8,396	9,543	9,306	7,757	8,444	7,764	5,184	8,816
MIDDLE EGYPT ..	8,857	8,866	9,651	9,641	11,329	12,002	10,815	11,016	9,753	6,743	11,168
Asyût ..	8,892	11,036	11,352	9,470	11,759	11,810	10,574	11,202	10,401	9,285	14,585
Girga ..	2,416	2,334	1,384	1,203	1,190	1,507	1,837	1,891	1,815	983	1,175
Qena ..	18,242	20,739	19,634	21,189	2,2101	23,410	27,630	28,502	25,164	24,310	26,818
Aswân ..	3,381	4,647	4,320	4,416	2,844	6,276	6,482	6,144	5,946	6,959	6,791
UPPER EGYPT ..	32,031	38,756	36,590	36,278	37,894	43,093	46,533	47,739	43,326	41,537	49,369
ALL EGYPT ..	45,599	50,029	48,468	48,209	52,181	59,224	62,229	63,575	57,139	51,517	63,992

MINISTRY OF AGRICULTURE, EGYPT.

Bulletin No. 26.

THE OUTBREAK OF  
PSEUDOCOCCUS SACCHARI, Ckll.,  
ON THE SUGAR CANE OF EGYPT.

The sugar cane cultivation of Egypt dates back to 1848, in which year Ibrahim Pasha introduced a red variety from Jamaica: the variety now known as "Baladi." The experiment met with such success that a factory was built at Roda in 1855 to extract the sugar from the cane, and so profitable did it prove that the area under sugar cane increased yearly. Sugar cane is now one of the major crops of Egypt and the old Roda factory has long since been replaced by six or seven others of more modern type situated at intervals throughout Upper Egypt. The sugar production of Egypt at the present time is practically a monopoly of the Société Générale des Sucreries et Raffinerie d'Egypte and all the factories with one exception belong to them.

In 1903, owing to the low market price of sugar, the low production of "Baladi" cane, and the high prices obtained by other crops, it was realized that unless a higher producing cane was found the future of sugar production in Egypt was doomed. Accordingly M. Henri Naus Bey of the Sugar Company visited Java, Borneo, Hawaii, etc., and brought back 128 selected varieties of sugar cane. Amongst these was found a variety called "Java 105" which possessed the necessary characteristics for revitalizing the industry.

It might be as well here to compare "Baladi" and "105," the two varieties almost exclusively grown in Egypt to-day.

Although "105" cane contains a slightly lower sugar percentage—12.5 to 13 as against 13.5 to 14—and a slightly lower degree of purity, it has the characteristic of giving a much higher yield of cane per feddân than the "Baladi." In the first year it produces about 200 qantârs per feddân\* more cane and whereas in the second year the yield per feddân only falls off by 100-150 qantârs, in the case of "Baladi"

\* 1 qantâr = 41.928 kilos, = 92.05 lbs.

1 feddân = 4,200-833 square metres = 5,024.17 square yards = 1.038 acres.

it falls off from 150-200 qantârs, so that over a period of two years a field will produce 400 qantârs per feddân more cane or an increased yield of over 80 per cent. On well cultivated good land "105" will give in the neighbourhood of 900 qantârs, and it has an additional advantage in that it will produce a remunerative crop on poor land.

This increase in production of the "105" variety over the "Baladi" is due to the fact that the former grows much more slowly than the latter in the early stages and some of the lower eyes grow out giving a greater number of canes per set planted. On the other hand "Baladi" cane is stouter and finer in appearance.

The "105" cane, however, possesses one serious drawback, once the cane is cut inversion of the sugars rapidly sets in. Consequently it has to be passed to the factory after cutting with the utmost despatch, a delay of more than twenty-four hours being sufficient to reduce the available crystallizable sugar content.

Sugar cane is grown in Egypt for three purposes:—

- (1) Human consumption (chewing).
- (2) "Honey" manufactured in the villages for local consumption.
- (3) Sugar production.

By far the most important of these is the sugar production and it is chiefly with sugar cane grown for this purpose that the present paper deals.

The attached table shows the areas under sugar cane cultivation for the last ten years, and it will be seen that the Provinces of Minya, Asyût, Qena, and Aswân claim by far the greatest areas. These are the provinces served by the factories of the Sugar Company; the other provinces, with the exception of Girga, only produce cane for human consumption (chewing).

The chief localities under sugar cane in the various provinces and the factories by which they are served are as follows:—

PROVINCE.	LOCALITY.	FACTORY SERVED BY.
Minya ... ..	{ Sheikh Fa'âl ... .. Maghagha ... .. Beni Mazar ... ..	{ Sheikh Fa'âl.
Asyût ... ..	Mallawi ... ..	Abu Qurqas.
Girga ... ..	Balyâna ... ..	Balyâna.
Qena ... ..	Nag Hamâdi ... ..	Nag Hamâdi.
Aswân ... ..	{ Armant ... .. Mataama ... .. Kôm Ombo ... ..	{ Armant. Kôm Ombo.

The only factory not belonging to the Sugar Company is a small one at Balyâna. This belongs to a certain family of big land-owners at Balyâna who supply it with sugar cane of their cultivation.

Reference to the table will show that the total average acreage under cultivation is in the neighbourhood of 57,000 feddâns producing about 40,000,000 qantârs of cane yearly. The average yield per feddân is about 650 qantârs, but that depends on the variety of cane grown, and as our statistics of the average yield per feddân are compiled irrespective of the variety and the percentage of first, second, and third year growth, they are misleading for the purposes of the present paper and have been omitted.

The Sugar Company absorb more than two-thirds of the total crop, although with the exception of a few thousand feddâns at Nag Hamâdi they cultivate practically no land themselves. The cane is bought from the cultivators under contract at a fixed price of P.T. 9½ per qantâr for 1921-1922 and P.T. 6 for the coming season of 1922-1923.

It is not so much the cultivation of sugar cane as the manufacture of sugar from the cane that has received such a severe set-back from the ravages of the Sugar Cane Mealy Bug — *Pseudococcus sacchari* CKLL.— indeed such a setback that the whole future of the industry hangs in the balance.

*Pseudococcus sacchari* CKLL. is a mealy-bug of world wide distribution and was known in Egypt as far back as 1912. It was not, however, until the end of the war that it came into prominence, and from 1918 to the present time it has increased to such an extent that the whole sugar cane crop of Egypt is infected to a greater or lesser degree. Unfortunately by far the worst attack is at Nag Hamâdi, the biggest area under sugar cane cultivation. The other areas are already bad, and they will become considerably worse if measures are not taken to arrest the outbreak. Kôm Ombo is probably the most lightly attacked, but the cane there suffers from lack of land drainage which gives rise to very irregular growth.

The two main reasons for the outbreak are:—

- (1) Bad cultivation during the war.
- (2) The introduction of the "105" Java cane.

(1) Prior to 1914 the fuel used in the sugar factories was coal, but during the war the price rose to such heights that its use became economically unsound. Consequently it was replaced by trash, i.e. the leaves and refuse from the fields. This trash, which contains millions of living insects, is conveyed loose either by trucks or other means of transport from all parts of the sugar growing area to the factories. Some of this is unavoidably dropped or blown off and the

whole track becomes strewn with leaves from which the insects crawl on to the adjacent standing cane, thereby steadily distributing and increasing the infection. There is at least four months between the time the first consignment of trash is conveyed to the factory and the last field harvested, so that insects from the first consignment may have up to four months in which to increase the infection on already infected cane.

Further, as the price of sugar rose during the war, the area under cultivation increased and the cultivation became worse and worse: poor quality "sets" were planted and no trouble was taken to remove the leaf sheaths from the "sets" before planting. Cane was ratooned four and five times and cane followed cane on the same land year after year. No attempt was made to clean up the fields after the harvest until quite recently, and this bad cultivation during the war together with the removal of trash from the fields has undoubtedly been largely responsible for the outbreak.

(2) In comparing "Baladi" and "105" cane one characteristic was omitted; the leaf sheaths of the former are not so closely adherent to the parent cane as in the latter and the lower sheaths tend to come away from the parent cane and break off clean at the node. The insect therefore cannot get the same shelter as is afforded by the closely adhering leaf sheaths of the "105" and consequently does not find the "Baladi" cane quite such a congenial breeding ground. For this reason the former variety does not become so heavily infected as the latter.

It has already been pointed out that "105" cane was first introduced in 1903, but it was not until 1909 that the Sugar Company authorized the cultivators to plant out "105" cane. Permission was first granted to introduce 25 per cent and this was later increased to a maximum of 50 per cent. In spite of this limit the cultivators developed the variety to such an extent that, in 1915, 95 per cent of the cane passed to the factories was "105." This gradual replacement of the "Baladi" variety by the "105," whilst admittedly essential to save the industry, has undoubtedly favoured the increase of *Pseudococcus sacchari* CKLL.

The cultivation of "Baladi" cane for human consumption still continues owing to its slightly higher sugar content, and the fact that it is a finer cane. About 500 feddāns per province are cultivated for this purpose and the price obtained for the first year crop is such as to more than counterbalance the lowered yield of the second year.

#### DESCRIPTION AND HABITS OF THE INSECT.

The adult female is large, elongated, ovate, decidedly plump, and delicate pink in colour; it is only very sparsely mealy and the

segmentation of the abdomen is apparent. Marginal filaments are wanting. It is ovo-viviparous and gives rise to a little very loose white fibrous secretory matter and much "honey dew." The female is only active normally in its young stages, but it retains the power of locomotion throughout life.

Length of adult female 6 to 10 millimetres. Breadth 3 to 5 millimetres. The male does occur in small numbers, but is not of any economic importance and may be disregarded.

The adult female produces living young parthenogenetically, i.e. without the intervention of the male. The fact that there is no ovicase or external eggstage is one of considerable importance in connection with the control of the pest.

The position favoured by the insects on the cane is that immediately below the node where they are sheltered by the close adherence of the leaf sheath arising from the node below. Any tendency towards movement is always directed to a higher node where more tender growth is to be found; the young females shortly after birth migrate to the next node or to some higher node where they settle down to feed and normally complete their life-cycle without a further change of position. Migration to the most tender growth near the growing point is prohibited by the extremely close adherence of the leaf sheaths beneath which the insects are unable to penetrate and find shelter. The only insects ever found at a place other than immediately below the node are those young females migrating to a more congenial feeding place in which to complete their life-cycle.

#### NATURE OF DAMAGE.

The insects feed by inserting a long sucking tube into the host-plant and withdrawing the plant juices. The result of thousands of these insects at work is the production of gum on the outer surface of the cane. This sticky secretion is formed partly by the exudations (honey dew) which are invariably associated with large colonies of any mealy bug and partly by the exudations from the cane, a defensive measure induced by the wounds caused by the insertion of the long sucking tubes. This gummy mixture tends to move downwards so that in heavily infected canes all the internodal surface of the cane becomes coated and it collects just above the node where it is held in place by the leaf sheath arising from that node. I may point out here that this gumming makes it very difficult to strip the canes of their leaf sheaths and, as the "105" variety is normally more difficult to strip than the "Baladi," cultivators are obliged to employ more labour for this operation.

I have been struck by the fact that the amount of gum varied in different fields in spite of a similar intensity of attack. I think we may assume that the "honey dew" produced by any given number of healthy insects under similar conditions is approximately the same and the variation must therefore be due to variations in the quantity of the exudations from the cane. It seemed that the healthiest and finest canes produced the most gum, and it may be that as the exudation from the cane, is a defensive weapon, a healthy cane is better equipped for the fight and consequently produces more gum. On the other hand it may be due to variations in the cane induced by chemical differences of the soil on which the cane is grown. This requires further investigation. The relation of sap flow and irrigation to gumming is another line of research that would give interesting results.

Not only does the insect impair the health of the cane but indirectly through the production of gum it has very far reaching results upon the available sugar content. It is found that when infected canes are crushed and passed through the factory, the crystallizable sugar content is much reduced. How far this is actually due to the presence of the gum and how far to subtle changes induced within the cane I am not in a position to state. A very simple experiment proved that the "honey dew" reduced and even inhibited crystallization, and in any case the reduction in sugar output is traceable to the ravages of the insect.

The gravity of the situation from a commercial standpoint is obvious. All the cane passed through the factories is gummy to a greater or lesser degree and not only is such cane far more difficult to work, but the percentage of crystallizable sugar obtained is so reduced as to entail a loss to the Sugar Company of hundreds of thousands of pounds.

#### SUGGESTED CONTROL MEASURES.

The nature of sugar cane is such that it is impossible to carry out any prophylactic measures whilst the cane is growing in the field. It might be possible to remove the gum from the canes, assuming that the gum alone is responsible for the reduced sugar output, but this would be by no means easy and when one realizes that the factory at Nag Hamâdi deals with over a million canes daily it is difficult to see how it could be carried out practically. It is much more sound to deal with the cause than to pay attention to the effect of the attack, and the most effective lines of control are those directed to the "sets" planted and to the methods of cultivation.

I will proceed now to discuss in detail the various control measures suggested.

#### 1. CLEAN "SETS" MUST BE PLANTED.

The method of planting usually adopted in this country is to plant lengths of cane about 18 inches (46 centimetres) long in pairs, the pairs lying end to end and about 6 inches (15 centimetres) below the level of the ground. At the present time it is practically impossible to obtain cane for planting that does not carry living insects, and every field planted is infected from the very start. If it is possible, however, to so treat the "sets" before planting that all the insects are killed without impairing germination then that cane will grow up free from disease and any infection which appears subsequently will have been derived from external sources.

A series of experiments was carried out to find a solution for the treatment of the "sets" which would not be too costly and yet meet the requirements. A number of different liquids were tried and in each case the "sets" were completely immersed.

(a) Hot water at a temperature of 60°C. only killed 10 per cent of the insects and it failed to dissolve the wax or fibroid material.

(b) Cyllin. Solutions of 3, 5, and 10 per cent were tried and the mortality in each case was about 60 per cent. The wax appeared to be partially dissolved, but the fibroid material was untouched. Cyllin made up with hot water was also not fully effective.

(c) Lysol. 3, 5, and 10 per cent gave the same results as in the case of Cyllin.

(d) Clensel gave the same results as Lysol and Cyllin.

(e) Carbon Bisulphide. This was very effective. Immersions for twenty seconds killed every insect, but it is unsatisfactory owing to the fact that it is expensive and extremely inflammable. It would be dangerous to handle in large quantities.

(f) Paraffin emulsion. This gave excellent results. The stock solution was tried at various dilutions and it was found that a dilution of one in thirty killed every insect if the set was immersed for two minutes. This solution dissolves the wax, has a good wetting power, and kills 100 per cent of the insects.

The proportions of the ingredients in the stock solution are as follows:—

Paraffin or petroleum	...	...	...	...	...	2 gallons.
Water...	...	...	...	...	...	1 gallon.
Sunlight soap	...	...	...	...	...	1 lb.

The soap in this solution is double the amount used in the normal solution in order to increase the wetting power.

"Sets" immersed take up a darkish green hue and when on emergence they cease to have this hue it is time the solution should be reinforced. The solution will last for an hour to an hour and a half if it is constantly in use without the addition of further stock solution. At the present price of paraffin the cost of treatment comes to about P.F. 100 per feddân, including the cost of extra labour. This is rather expensive, but as the value of a feddân of sugar cane varies from L.E. 60 to L.E. 80, it is not more than an insurance of  $1\frac{1}{2}$  per cent and the cultivators would get this back, and considerably more, in the increased yield per feddân.

The chief objection to the use of paraffin emulsion is the difficulty of preparing it; unless it is correctly made up it is useless. Suggestions for surmounting this difficulty will be found on a later page. It is hoped that another solution may be found which will remove this obstacle, but for the present no success has been met with.

It is important to remember that immersion is of no avail unless the "sets" are completely stripped of all leaf sheaths. The insects lie hidden beneath the leaf sheaths and no solution will penetrate there and kill the insects. The leaf sheaths, then, must all be removed, and this process must be not carried out on the field to be planted out. The stripping should be done in the field of origin of the cane and the "sets" brought to the field of planting, dipped, and sown. It is needless to point out the danger of stripping the canes of their infected leaf sheaths on the field about to be planted.

I cannot lay too much stress on the importance of the planting of clean "sets." Once we start with clean cane in our fields it should not be so difficult to keep it clean and the remaining suggestions are subsidiary and designed for this purpose. *The crux of the whole problem, however, lies in the sowing of clean "sets."*

## 2. CANE SHOULD ONLY BE GROWN FOR TWO YEARS ON ANY FIELD UNTIL THE PEST IS UNDER CONTROL.

The expense of cultivation makes it a great temptation for the cultivator to leave his cane in and ratoon three or four times, the limiting factor being the reduced yield. In Barbadoes sugar cane is a one-year crop and in the West Indies generally ratooning does not usually take place more than once or twice. It is true there are other reasons for this, but with the severity of our present outbreak it is high time that ratooning should be limited to once and certainly never more than twice. The yield steadily deteriorates as the years proceed and the insect attack steadily increases. How far the reduction in yield is directly attributable to the insect attack it is

difficult to say, but there is no doubt that the insect is largely responsible for it. Until such time as the pest is under control it will be wise only to grow cane on any one field for two years. It may be pointed out that the yield per feddân of third, fourth, and fifth year cane is such that it is hardly profitable and making cane a two-year crop would not be any great hardship to the cultivator.

## 3. THE "TRASH" NOT TO BE USED IN THE FACTORIES AS FUEL.

Attention has already been drawn to this. I would suggest that if it is essential for the Company to use "trash" as a fuel that, instead of transporting it loose, it might be compressed into bales. Portable presses can be bought at a low figure and readily used in the fields. This method would have the additional advantage that a far greater weight of "trash" per truck could be transported. I do not advise this method, but it would be preferable to the existing practice. Now that the price of coal has fallen practically to pre-war rates I see no reason why the use of coal should not be resumed.

Another alternative is to grow Sessaban (*Sesbania aegyptiaca*) around the fields. Sessaban has quite a high calorific value, grows moderately rapidly and requires no attention. At Arment it is grown for use in the factory, and this is a practice that might well be adopted more generally.

## 4. THE LAND SHOULD BE THOROUGHLY CLEANED IMMEDIATELY AFTER THE HARVEST.

The present system is to remove the great majority of the "trash" to the factories and villages and then to burn over the land. No "trash" should be removed from the field; the whole should be thoroughly burnt. This would account for a very high percentage of the insect population and would remove one of the most favourable methods of distribution.

## 5. CANE SHOULD NOT BE GROWN ON CANE.

During the war cane was frequently grown after cane on the same land, and although it is not now so prevalent I have met with many cases. Apart from any agricultural considerations it is a practice which militates against the control of the pest by carrying on the infection. It would be of very little value to plant clean "sets" on land from which cane had only recently been removed, there would always be sufficient infection, however, well the land had been cleaned, to re-infect the new crop.



An experiment was carried out at Nag Hamādi last winter on a large scale by the Sugar Company in which "sets" treated in emulsions of mazoot and paraffin of varying dilutions and for varying times were planted out. The field chosen was planted out at the beginning of October and was land which had borne cane for the previous three years, the last crop having been harvested the previous April. This land was not properly worked over until shortly before planting, thus providing the insects sufficient food to carry on until the new "sets" were planted. When I examined the field early in December 75 per cent of the young shoots were infected. In two small plots the "sets" had been dipped in pure paraffin and mazoot respectively, only one per cent of these had germinated; but even they were found to carry living insects. This is conclusive proof that the insects had reinfected the canes subsequent to planting. It was unfortunate that such a field should have been selected for so elaborate an experiment as any results obtained are not only valueless but actually misleading. I may add that I also found in many cases that the "sets" had not been thoroughly stripped of leaf sheaths, thereby affording the insects shelter during immersion.

The planting of cane in October is unusual and should be discouraged from the outset. Cane thus planted is cut in January or February year, i.e. after a growing period of sixteen months. This is bad for insect control, affording as it does a longer period for the insect in which to breed and work its ravages. Also it does not appear very economical as the land is occupied for the better part of two years to give only one cutting. The normal time for planting out is from March to May and for cutting from December to March.

After the land, then, has been under cane for two years (one ratooning) it should be given a rest for at least one year and may during this time be planted out with any other crop at the discretion of the owner. This enables the land to free itself of all infection before the next crop is planted.

I have not yet found *Pseudococcus sacchari* CKLL. on any other crop or weeds around the field. Halfa grass, which is prevalent everywhere, does not appear to be infected; it would be a very serious stumbling block to the control had it proved susceptible. The only other host plant I have yet found is that known as "Heesh": *Saccharum biflorum* or *egyptiacum*. This plant, which grows along certain canals and on waste spaces, is thought to be the original ancestor of our present cultivated sugar cane, so it is not altogether unexpected that *Pseudococcus sacchari* CKLL. should bestow its attentions upon it. Fortunately "Heesh" is not frequently found in the neighbourhood of the sugar cane fields and so the attack on this grass need hardly be considered in connection with the control of the outbreak on the sugar cane.

6. AS FAR AS POSSIBLE BIG AREAS SHOULD BE PLANTED WITH CANE AND THERE SHOULD NOT BE SMALL AREAS OF CANE OF DIFFERENT YEARS INTERMIXED WITH OTHER CROPS.

Second year cane is naturally more heavily infected than first year cane and the risk of infecting first year cane where the "sets" have been treated is great if that cane is in close proximity to infected second year cane.

First, second, and possibly third year cane in close proximity means that there is an endless chain of infection which it is very difficult to combat by any control measures and thus it would be advisable as far as possible to grow cane in big areas. Every third year the land would then be occupied by some other crop and a break in the sequence of host plants for the insect effected.

Summarizing the foregoing control measures I would suggest that:—

- (1) Clean "sets" be planted.
- (2) Cane should only be grown for two years on any field until the pest is under control.
- (3) The "trash" should not be removed from the fields or used by the factories as fuel.
- (4) The land should be thoroughly cleaned immediately after the harvest.
- (5) Cane should not be grown on cane.
- (6) As far as possible big areas should be planted with cane.

I should have liked also to suggest that the growth of "Baladi" cane be encouraged, but that is hardly practical. The cultivator could not be expected to comply with this owing to its low yield; it would not be worth his while to cultivate "Baladi" cane at the current price per qantār offered by the Sugar Company. This, however, is not at all essential if the suggestions put forward for the control of the outbreak are adopted.

#### SUGGESTED METHOD OF APPLICATION OF THE CONTROL MEASURES.

Early this year an attempt was made to induce cultivators to exercise control measures by propaganda, and they were circularized with a pamphlet pointing out the dangers to the crop and the steps to take. The Government further undertook to supply any cultivator with the necessary paraffin emulsion at cost price. This campaign did not prove a success.

In dealing with a problem of this nature the control measures must be universally adopted to meet with full success, otherwise the cultivator who carries them out is penalized by his neighbour who does not. I estimate that, if the recommendations were adopted generally, the pest would be well under control in three or at the outside four years and that certain of the measures could then be relaxed.

It is not easy to devise a satisfactory practical method for the application of these control measures, and it is impossible unless the Sugar Company co-operates with the Government. The Sugar Company has everything to gain by such co-operation; the cultivator, on the other hand, will not be quite so easily convinced at first, owing to the fact that it costs a little and sugar cane is not such a very profitable crop to him. After the first year, when he realizes that he recovers more than his outlay in the increased yield per feddân, it will be easy.

The chief difficulty is how the cultivator is to obtain clean "sets." No cultivator, with the best intentions in the world could do this for himself without assistance, and I suggest that it should be made possible for him to obtain guaranteed clean "sets" at cost price. The Sugar Company could provide these by growing the necessary cane on their own land and, treating and distributing them from their factories against demand. Indeed I would go further. I suggest that the reduced price paid for the cane by the Company is placing the onus of this outbreak on the cultivators. The cultivator is not altogether responsible for the outbreak and with the low price prevailing it is doubtful if much new cane will be planted, and it will be extremely difficult to convince him of the advisability of paying for the control measures. Therefore I suggest that the Sugar Company might either provide the clean "sets" free of charge or increase the price paid for clean cane. One cannot expect the cultivator to bear the brunt of both the outbreak and the control measures. It would pay the Company a hundredfold to provide clean "sets" free of charge to cultivators; P.T. 6 per quintar is an extremely low figure for the clean cane which they would get back in return and the profit that would accrue on that score would more than counterbalance the expenditure in the provision of clean "sets."

The actual execution of this proposal would not, I think, present any serious difficulties to the Company, and the Government might, I suggest, step in and by law decree that no "sets" other than those bought or obtained from, and certified clean by, the Sugar Company might be planted in the big sugar cane growing areas.

The objection may be raised that not all the cane grown in the big areas finds its way to the factories. That is correct, but it would not cost the Company anything beyond a little extra trouble to provide

"sets" for all and the control of the pest is at stake which means everything to them. "Sets" issued to cultivators not supplying the Company would, of course, have to be paid for.

Another point that may suggest itself is that the planting of any field is dependent on the arrival of the water supply, and the cultivator cannot tell until a few days before when he will plant out. Consequently it may occur that prepared "sets" are held up for a week or two before planting. The inversion of the sugars which takes place so rapidly in the "105" cane does not affect the germinating capacity; the "sets" will survive for considerably longer than two weeks, so that a slight delay in planting out need be no cause for alarm.

Assuming, then, that the Sugar Company provided clean "sets" and the Government laid down by law that only such "sets" were to be planted, the main control measure would be enforced. The other measures, with the exception of No. 6, could also be included in the law and their execution would not prove any hardship to the cultivator except in so far as he would be deprived of the "trash" for fuel.

Recommendation No. 6 would not be easy to enforce, but it might be effected by the judicial arrangement of the contracts entered into by the Company with the cultivators. It would take at least two years to carry out without imposing too great restrictions on the cultivator and would need very careful working out.

#### NATURAL ENEMIES.

Only two natural enemies have been found to be of any assistance in the control: the rat and a fungus.

(1) In every area inspected last winter I noticed that on heavily infected canes a part of the leaf sheath immediately below the node would be torn away and the parent cane revealed. These "windows," so to speak, were always in exactly the same place, just below the node, and no insects were ever found on the surface of the cane thus exposed although obviously insects had been present. Many such "windows" were found on a heavily infected cane, sometimes as many as nine or ten.

Whatever makes these windows must be feeding on the insects because:—

(a) Canes not infected have no such "windows."

(b) The "windows" are always in the same relative position on the cane, i.e. immediately below the node where the insects invariably congregate. If the animal wanted the gum it would make the windows immediately *above* the node.

(c) Canes on which the insects have already been killed by fungus possess only very small peep holes, as if the animal finding the insects dead has gone elsewhere.

(d) Where there is a "window" there are never any insects on the exposed surface of the parent cane, but on lifting back the remainder of the leaf sheath the insects are found on either side of the "window." The animal, therefore, can only get at the insects where it has torn away the leaf sheath.

(e) Scratches are found on the surface of the cane such as might be made by the teeth of an animal in removing the insects.

There is very little doubt that the rat is responsible for these windows as rats are abundant in the fields. Indeed it is difficult to see what else it would be. On one inspection rats were seen high up on the cane, and an examination of the cane showed that the rats had just been disturbed whilst in the act of making the "windows." The stalks of the canes were only found bitten through by rats where they were uninfected or only very slightly infected, and it appears that the rat has a very decided partiality for a diet of this particular insect.

This can never constitute more than a subsidiary control as it does not come into action until the infection is heavy, but it certainly assists in preventing the attack from becoming overwhelming.

(2) There are two distinct fungoid attacks or possibly they may be two stages of the same fungus.

The more prevalent by far is a green fungus. An insect attacked by this appears at first rather more waxy than usual and short filaments bearing sporangia arise from the body of the attacked insect. These sporangia are at first white but rapidly turn yellow green and then grass green. The insect is killed very quickly and becomes a hard dark mass covered with the green fungoid growth. Insects of all sizes were found attacked by this fungus irrespective of whether they were isolated or in large colonies and all stages from one insect to every insect in a colony being attacked were observed. In some cases at least 50 per cent of the insects on a cane had been killed by this fungus.

The other fungus is white and commences by an opaque white film forming on the mother cane underneath the insect. In a colony this white matter increases, filling up the interstices between the individual members and then growing over them so that they become completely enveloped and present a soapy opaque white mass. All the insects have long since been killed and on breaking up the mass it is found to be green within. This fungus was found to attack colonies rather than individuals.

It appears that the green fungus grows directly on the insect, killing it, whilst the white fungus grows around it and death from suffocation ensues.

Mr. Briton-Jones, Mycologist to the Ministry of Agriculture, has very kindly examined the green fungus for me, but up to the present he has got no proof of its being definitely parasitic. He states that the fungus in question is *Aspergillus flavus* and that he found traces of *Aspergillus niger* associated with it. I have observed this latter fungus in small quantities on the cane myself, but as it does not appear to affect the insect I have disregarded it. Mr. Briton-Jones suggests that the medium for these fungi may be the "honey dew" secreted by the insects and that death may be brought about by the blocking of the glands and spiracles. If the "honey dew" were the medium I should expect to find the fungus growing on the gum which contains a high percentage of "honey dew." This, however, is not the case; I have only observed the fungi growing on and immediately around the insects.

Whether the "honey dew" proves to be the medium or not the fact remains that either directly or indirectly the death of an appreciable percentage of the insect population is effected.

This fungoid attack, like the work of the rat, can only be regarded as a subsidiary control because it only comes into action on heavily infected canes. It may assist in preventing the outbreak from getting completely out of hand, but it cannot be relied upon to exercise any effective control of the pest.

*Aspergillus flavus* is well known in the West Indies and elsewhere as exercising a controlling influence on the activities of *Pseudococcus sacchari* CKLL.

No other parasites, either animal or fungoid, were observed, with the exception of fly larvæ of two different species that were found in very small numbers in one field. Unfortunately the attempts to breed these through were unsuccessful, but no doubt a further opportunity will occur later.

Ants were found to be fairly common, searching as usual for the "honey dew" of the mealy bug. *Collembola* and *Phyllotromia treitliana* WERNER (BLATTIDÆ) were also observed, but it is improbable that these are of any economic importance in the control of the pest.

Arrangements have been made to import *Cryptolaemus montivieri* MULS.—a COCCINELLID—from the South of France. This species of *CRYPTOLAEMUS* has proved itself elsewhere a predator of *Pseudococcus sacchari* CKLL. and other species of *Pseudococcus* and has been imported and bred in many countries for this purpose. It does not necessarily follow, however, that it will thrive in this country and, even if it does, it will take years to establish itself and make its presence felt. It is therefore of paramount importance that at present reliance for the control of this pest should not be placed on natural enemies, but that artificial measures should be introduced without delay.

#### CONCLUSION.

Sufficient has been said to indicate the extreme gravity of the outbreak to the cultivators of sugar cane in this country and the lines along which it is suggested that the control might be effected.

Finally, I must express my thanks to Mr. Laing, of the Imperial Bureau of Entomology, for very kindly identifying the insect as *Pseudococcus sacchari* CKILL., and to M. Henri Naus Bey and the managers and staffs of the Sugar Company for their unfailing courtesy and kindness in affording me every possible facility for the study of the problem.

Cairo, July 1922.

وكما كان متوقعا فان عدم تجانس التربة سبب اختلافا كبيرا في غلات مكدرات كل صنف لدرجة تجعل الاختلافات بين متوسطات الأصناف المختلفة لا يعتد بها من الوجهة الاحصائية . إلا أن النتائج بصفة عامة تشير إلى أن الصنفين ٣٦ P.O.J. وزميله ( طفرته ) P.O.J. ٣٦ (M) تحت ظروف هذه التجربة الغير متجانسة التربة ) من الممكن جدا أن يزاها من الوجهة الاقتصادية النصب الأساسى ١٠٥ P.O.J. في محصول أول سنة على الأقل . وكانت الاختلافات الكبيرة بين غلات مكدرات الصنف ٩٧٩ P.O.J. مطابقة كل المطابقة لمظهر هذا الصنف في الحقل . وقد وقف جناب المستر . روش المدير القدير لمصانع السكر بنجع حمادى منذ زمن طويل على ما أعصير هسلما الصنف من الصفات الممتازة وعلى محصوله المناسب في أجود الأراضى وأكثر مدى عدة سنين في مساحات متسعة نوعا . ولكن سرعان ما تبين تأثيره الشديد بالأحوال الغير الملائمة عند ما زرع هذا الصنف في تربات غير متناهية الخصب . فاقطعت زراعته الآن في بنج حمادى . وفى التجارب السابقة التى زرعت في الأراضى الممتازة الخصب في كل من القصب والسكر من الثلاثة الأصناف الأخرى المشتملة عليها التجارب الحالية . كما يتضح من الخطاط مستواه في القسم الثانى من الجدول رقم ٤

وتبين لنا أرقام هذا القسم أيضا فرصة عظيمة لمقارنة هذه الأصناف بعضها ببعض باعتبارها أصناف عامة إذ تشمل متوسطات محاصيلها مدى واسعا من مختلف الأحوال كما تدل على التفوق العام لصنف ١٠٥ P.O.J. وبلا حظ في كل من قسمي الجدول أن أعظم فرق في نسبة السكر بين الأصناف لا يتعدى ١/٢ وهو فرق لا يعتد به من الوجهة الاحصائية بأى حال من الأحوال وبالنظر إلى إيقاف الرى في الوقت المناسب حيث أوقف قبل قطع محصول سنة ١٩٣٧ في المقادعة بمدة سبعة أسابيع فان نسبة السكر في جميع الأصناف كانت عالية حتى في موسم سبب فيه التصنيع هبوطا عاما في مخنويات السكر .

#### الخلاصة

تدل الخبرة مدى الخمس السنوات الأخيرة على أنه من بين التسعة الأصناف المستوردة التى تبينا عنها نتائج كافية يمكننا من استنتاج خلاصة فاطمة عنها — لا يوجد إلا الأصناف ٣٦ (M) P. O. J. و ٣٦ Co ٢٨١١ P. O. J. التى يمكن اعتبارها قريبة من الصنف المتفوق ١٠٥ P. O. J. لدرجة حلقة بإجراء اختبارات أخرى عليها . أما باقى الأصناف المذكورة فقد برهنت بصفة فاطمة على أنها قليلة القيمة من حيث انتاج القصب والسكر في مصر .

### جدول رقم ٤ — تجارب الأصناف المنتجة في المطاعة ( قصب السنة الأولى )

الصنف	محصول القصب في القطعة	محصول القصب في الفدان		نسبة السكر	محصول الد في الفدان بالكيلو
		طن	قنطار		
P.O.J. ١٠٥	٦٩٩٠	—	—	١٤,٧٨	—
" ١٠٥	٨٣٩٠	—	—	١٣,٩٣	—
" ١٠٥	٨٢٢٠	—	—	١٣,٩٨	—
متوسط P.O.J. ١٠٥	٧٨٦٧	٤٧,٢٠٠	١٠٥١	١٤,٢٣	٥٣٨١
P.O.J. ٣٦ (M)	٨٤٨٧	—	—	١٤,٨٢	—
" "	٧٧٦٠	—	—	١٤,٣٩	—
" "	٨٥٣٠	—	—	١٤,٠٩	—
متوسط P.O.J. ٣٦ (M)	٨٢٥٩	٤٩,٥٥٤	١١٠٣	١٤,٤٣	٥٦٩٩
P.O.J. ٣٦	٧٩٠٠	—	—	١٤,٧٩	—
" ٣٦	٩٥١٠	—	—	١٤,٠٦	—
" ٣٦	٨٢٩٠	—	—	١٤,٦٢	—
متوسط P.O.J. ٣٦	٨٥٦٧	٥١,٤٠٠	١١٤٤	١٤,٤٩	٥٩٦٢
P.O.J. ٩٧٩	٥٢٥٠	—	—	١٥,٣٢	—
" ٩٧٩	٨٤٣٠	—	—	١٢,٧٧	—
" ٩٧٩	٧٨٦٠	—	—	١٤,٤١	—
متوسط P.O.J. ٩٧٩	٧١٧٧	٤٣,٠٦٠	٩٥٩	١٤,١٣	٤٨٦٦

### ٢ — متوسطات الخمسة المحاصيل في المطاعة وملوى

P.O.J. ١٠٥	—	٤٨,١١٦	١٠٧١	١٣,٤٩	٥١٥١
P.O.J. ٣٦ (M)	—	٤٦,٤٨٢	١٠٣٥	١٣,٦٥	٥٠٧٧
P.O.J. ٣٦	—	٤٥,٠٢٥	١٠٠٢	١٣,٩٩	٥٠٤٤
P.O.J. ٩٧٩	—	٤١,٦٤٥	٩٢٧	١٣,٧٣	٤٥٥٣